



兽医中药学

中国农业科学院中兽医研究所編

农业出版社





兽 医 中 药 学

中国农业科学院中兽医研究所编

农业出版社

6016812

中科院植物所图书馆



S0019546

組織編审单位

中国农业科学院中兽医研究所

参加編审单位

吉林农业大学

江西省农业科学研究所

江西农学院

四川省双流县畜牧兽医工作站

甘肃省畜牧厅中兽医学校

中国科学院广西植物研究所

編 著 者

郑藻杰 朱永亮 周 正 徐堃生 赵隆锦

曾纪鏞 罗重阳 廖瑞霏 楊宏道

审 查 者

蔣次昇 崔淮僧 田炳煊 孙良臣 孙 賢

陈立卿 鐘树权 肖佩蘅 夏安庆 楊 若

鄒东明

說 明

(一)本書共分为三編。第一編緒論,分为两章,主要是介紹我国藥物的来源和兽医中藥学的发展簡史。第二編总論,分为五章,系根据中兽医的理論体系,扼要地叙述有关中藥的基本知識,并重点地說明中藥的运用規律、方剂及配伍,中藥的制剂、剂量与用法等。第三編各論,分为十八章,載述兽医常用中藥 346 种(包括附藥 20 种)。

(二)本書各論系依藥物的主要功用进行分类,如理气藥、泻下藥等。在每类藥物之前,都概括地說明了每类藥物的共同点和特点,为临診应用指出方向。

(三)藥名:以普通常用的为正名,如有不同的名称时,則仍然选择比較常用的列为别名,以供参考。又在每味藥名之后,用括弧說明了最早記載的本草書名,例如“本草經”,系指最早記載于“神农本草經”,其余可类推。对于某些品种相同或功用相近的藥物,則列为附藥,例如朴硝附元明粉,苦楝子附苦楝根皮等。

(四)主要产地:是指产量較多的地区;产量較少或人工試种的地方,則未列入。

(五)藥用部分:系包括原藥在分类上所隶属的分科及藥用部

分的外观形态。对于比较重要的药物,并附有插图,以资参考。

(六)炮制:是按照我国现在中药店的炮制法和当前中兽医的用药情况,作简要的记述。

(七)性味和归经:是说明每味药的性、味和进入某脏腑经络。为避免某些药物的毒性起见,并注明每味药物的有毒或无毒,以资分辨。

(八)应用:是说明每种药物的主要功用、主治和禁忌症。对比较重要的配伍禁忌,也加以记载。

(九)用量:是根据中兽医习用的分量而拟定的,系说明方剂中的一次剂量。“两”仍指十六两为一斤的原市两而言。

为了照顾全国各地的用药特点和更好地运用辨证施药的原则,有关方剂中的剂量,均未列入。

(十)附歌:是每味药在应用上的简要小结。其目的是为了便初学者便于记诵,由于考虑到每味药的主要应用范围,因此不一定平仄而协调。

(十一)配伍及附方:主要是引用古方来说明每味药的功用和主治。选用时要密切结合病畜的症候,灵活运用。为了表明其出处,大部分以括弧注明其来历,以便查考。凡属于常用的配伍,其来历则概予删简。

(十二)按语:主要是为了补充正文的不足之处,而加以补充和说明,供为参考。

(十三)每类药的归纳简表,是将各药的性味、归经、功用、剂量,加以简单的归纳,以便了解该类药物的主要内容。

前 言

中兽医学术具有悠久的历史,数千年来,在与家畜疾病进行斗争中,积累了丰富的經驗和理論知識。但由于历代反动統治階級的歧視、摧殘,使这一重要学术日趋沒落。解放后,在党的英明領導与十分关怀重視下,才得以蓬勃发展。

为了繼承、发揚祖国兽医学遗产,并搜集、整理广大民間兽医的丰富經驗,我們根据农业科学院指示,决定組織全国人力編写一套中兽医学的書籍,完全按照中兽医的理論体系,比較全面地系統介紹祖国兽医学术,供各研究单位、高等农牧院校研究和教学的参考,以及西兽医学习中兽医和中兽医进修的需要。

这本“兽医中藥学”就是根据这一精神来編写的。

兽医中藥学是祖国兽医学的重要组成部分,具有丰富的內容,也是每一个中兽医工作者必須掌握的基本知識。但由于反动統治者的摧殘,几千年来,沒有一部比較完善的兽医中藥專書。过去中兽医所学习的,除了“元亨疗馬集”等書以外,多閱讀各家本草。由于該类書籍种类繁多,內容广博,同时均屬中医的資料,难以重点掌握。我們希望这本书的出版,对于中兽医、中兽藥的研究工作,以及广大中兽医、西兽医的学习与提高,将会有所帮助,有利于社

会主义畜牧业生产的发展。

本書是在党的领导下,政治挂帅,理論結合实际,分工协作完成的。初稿由吉林农业大学、江西省农业科学研究所、江西农学院等三个单位負責編写;写成之后,于1959年7月开始集中有关单位的人员于兰州中国农业科学院中兽医研究所集体审查。参加审稿的除上述三个单位外,还有甘肃省畜牧厅中兽医学校、四川省双流县畜牧兽医工作站、中国科学院华南植物研究所广西分所和中国农业科学院中兽医研究所等四个单位。在审稿过程中,集中了各方面的意見,进行了多次修改,始克定稿。

由于党的重視、上級領導的大力支持和編审同志的积极努力,使这一艰巨的工作得以在短期內完成。但因限于水平和兽医中药文献資料的不足,同时限于時間条件,不能更为广泛地收集、整理全国中兽医的經驗,缺点、錯誤在所难免,尙希讀者多加指正,以便修訂。

中国农业科学院中兽医研究所

1959年8月

目 录

第一編 緒 論

第一章 中藥的來源.....	25
第二章 中藥發展簡史.....	27

第二編 總 論

第一章 中藥的基本知識概述.....	41
第一节 中藥的命名法.....	41
第二节 中藥的產地及生產情況.....	43
第三节 中藥的採集和調查.....	45
一 中藥的採集.....	45
二 中草藥的調查.....	47
第四节 中藥的貯藏.....	48
第五节 中藥的分類.....	51
第二章 中藥的炮制.....	53
第三章 中獸醫的基本理論與中藥的運用規律.....	58
第一节 陰陽五行與藥物的關係.....	58
一 陰陽.....	58
二 五行.....	60

三 阴阳和五行的关系	63
四 阴阳五行学说与药性的关系	64
第二节 四诊八证与药物的关系	67
第三节 中药与辨证施治的关系	70
第四节 中药的性能与归经	72
一 中药的性能	72
二 药物的归经	79
第四章 中药的方剂及配伍	85
第一节 方剂的组成及种类	85
一 方剂的组成	85
二 方剂的种类	90
第二节 方剂的配伍	93
一 七情合和	94
二 配伍禁忌	95
第五章 中药的剂型、剂量和用法	99
第一节 中药的剂型	99
第二节 中药的剂量	107
第三节 中药的用法	111

第三編 各 論

第一章 清热药	117
第一节 清热降火药	117
知母	117
玄参	119
栀子	121
石膏	123

夏枯草	124
蘼根	125
茶叶	126
第二节 清热燥湿药	127
黄连	127
黄芩	129
黄柏	131
龙胆草	132
茵陈蒿	134
胡黄连	136
苦参	137
第三节 清热解毒药	137
山豆根	137
蚯蚓	139
山慈姑	140
黄药子	141
白药子	142
金银花(附忍冬藤)	143
连翘	145
蒲公英	147
漏芦	148
胡桐泪	149
半边莲	150
青黛	150
板蓝根	151
紫参	152
菥豆	153

白薇	154
八角莲	155
第四节 清热凉血药	156
犀角	156
生地黄(附干地黄)	157
牡丹皮	158
地骨皮	159
白头翁	160
紫草	161
槐花	162
槐角	162
白茅根(附白茅花)	163
食盐	164
第二章 解表药	168
第一节 辛温解表药	169
麻黄	169
荆芥	170
防风	172
紫苏	174
桂枝	176
细辛	177
辛夷	178
葱白	179
白芷	180
生姜	181
葛根	182
第二节 寒凉解表药	184

升麻.....	184
蔓荆子.....	186
薄荷.....	186
牛蒡子.....	187
柴胡.....	188
豆豉.....	189
菊花(附野菊花).....	190
桑叶.....	191
蝉蜕.....	192
第三章 瀉下藥和逐水藥	194
第一节 攻下藥	195
大黄.....	195
朴硝(附元明粉).....	197
巴豆.....	198
番泻叶.....	199
芦荟.....	199
第二节 潤下藥	200
火麻仁.....	200
郁李仁.....	201
麻油.....	202
酥油.....	202
猪胆.....	203
蜂蜜.....	203
第三节 逐水藥	204
大戟.....	204
甘遂.....	205
芫花.....	207

牵牛子.....	209
續随子.....	210
葶藶子.....	211
商陆.....	212
第四章 渗湿利水药	214
車前子(附車前草).....	214
木通.....	216
茯苓.....	218
澤泻.....	219
猪苓.....	220
防己.....	221
通草.....	223
滑石.....	224
薏苡仁.....	225
地肤子.....	226
薦蓄.....	227
瞿麦.....	227
海金沙.....	228
灯芯草.....	229
淡竹叶.....	230
赤小豆.....	231
第五章 化痰止咳平喘药	233
第一节 止咳平喘药	234
桔梗.....	234
款冬花.....	236
前胡.....	237
百部.....	238

馬兜鈴	240
白前	241
白果	241
曼陀罗	242
旋复花	243
第二节 化痰降气药	243
半夏	243
天南星	245
白芥子	247
苏子	248
萊菔子	249
紫苑	249
桑白皮	250
第三节 潤肺化痰止咳药	251
瓜蒌(附瓜蒌仁)	251
天花粉	253
杏仁	254
貝母	255
天門冬	258
麦門冬	259
第四节 清肺化痰止咳药	260
沙参	260
枇杷叶	262
昆布	263
海藻	263
硼砂	264
第六章 理气药与消食药	267

第一节 理气药.....267

枳壳和枳实.....267

厚朴.....269

砂仁.....270

青皮.....271

陈皮.....272

木香.....273

青木香.....274

沉香.....276

白豆蔻.....276

薤白.....278

烏药.....278

大腹皮.....280

香附.....280

第二节 消食药.....282

山楂.....282

麦芽.....283

谷芽.....284

神曲.....285

鸡内金.....286

酒曲.....286

第七章 理血药.....288

第一节 行血药.....289

荆山稜.....289

莪朮.....290

姜黄.....291

郁金.....293

延胡索	294
川芎	295
丹参	297
赤芍药	299
蒲黄	300
五灵脂	301
没药	302
乳香	303
牛膝	304
红花(附藏红花)	306
桃仁	308
益母草(附茺蔚子)	309
血竭	310
芸苔子	311
泽兰	312
水蛭	313
苏木	314
刘寄奴	314
自然铜	315
穿山甲	316
马鞭草	318
酒	319
醋	320
红麴	320
第二节 止血药	321
参三七	321
仙鹤草	322

白芨	322
侧柏叶	324
茜草	325
地榆	326
烏賊骨	327
血余	328
藕节	329
石灰	330
第八章 芳香开窍药	333
麝香	333
菖蒲	335
牛黄	337
皂角(附皂角刺)	338
蟾酥	339
樟脑(附樟叶)	341
冰片	342
第九章 祛寒药	344
肉桂(附官桂、桂心)	344
附子	347
干姜(附炮姜)	349
吴茱萸	350
丁香	351
藁楞	352
茴香(附八角茴香)	353
艾叶	354
高良姜	355
草豆蔻	356

花椒(附椒目).....	358
葶澄茄.....	359
第十章 祛暑药	361
香薷.....	361
藿香.....	363
白扁豆(附扁豆衣).....	364
木瓜.....	365
青蒿.....	367
第十一章 祛风止痛药	369
羌活.....	370
独活.....	370
五加皮.....	372
白花蛇.....	374
乌蛇.....	375
苍朮.....	376
秦艽.....	378
乌头.....	379
藁本.....	380
威灵仙.....	381
草薺.....	382
海桐皮.....	383
白藓皮.....	384
伸筋草.....	385
大血藤.....	386
苍耳子.....	387
第十二章 安神镇惊药	389
第一节 安神定心药.....	389

柏子仁	389
酸枣仁	390
远志	391
天竹黄	393
茯神	393
龙齿	394
硃砂	395
琥珀	396
第二节 镇惊熄风药	397
天麻	397
钩藤	398
天仙子	399
蜈蚣	400
全蝎	402
白僵蚕	403
蛇蜕	404
第十三章 平肝明目药	406
木贼草	406
谷精草	407
石决明	409
决明子	410
密蒙花	411
蕤仁	412
青葙子	413
秦皮	413
熊胆	415
夜明砂	416

刺蒺藜	416
第十四章 补养药	419
第一节 补气助阳药	420
人参	420
党参	421
黄耆	423
山药	425
白朮	426
甘草	428
大枣	430
肉苁蓉	431
杜仲	432
续断	434
补骨脂	436
益智仁	437
骨碎补	438
巴戟天	439
菟丝子	440
虎骨	441
海馬	442
第二节 补血养阴药	443
当归	443
熟地	445
何首烏	447
阿胶	448
石斛	449
白芍	450

枸杞子.....	452
女貞子.....	453
山茱萸.....	454
胡麻仁.....	455
第十五章 固瀉藥	458
第一节 瀉腸止瀉藥	458
訶子.....	458
烏梅.....	459
石榴皮.....	461
肉豆蔻.....	462
禹余糧.....	463
赤石脂.....	464
伏龙肝.....	465
孩儿茶.....	466
明矾(附枯矾).....	466
百草霜.....	468
五倍子.....	469
百藥煎.....	470
蕎麥.....	471
第二节 欬汗瀉精藥	471
浮小麦.....	471
龙骨.....	472
牡蠣.....	473
麻黃根.....	474
五味子.....	474
桑螵蛸.....	476
金櫻子.....	477

第十六章 驅虫葯和杀虫葯.....479


檳榔.....	479
貫衆.....	481
使君子.....	483
苦楝子(附苦楝根皮).....	484
榧子.....	486
鶴虱.....	487
雷丸.....	488
臭椿皮(附椿根白皮).....	488
蕪荑.....	489
土茯苓.....	490
大蒜.....	491
硫黃.....	492
水銀.....	493
雄黃.....	493
輕粉.....	494
蛇床子.....	495
蘭茹.....	496
馬齒莧.....	496
大风子.....	497
木鼈子.....	498
砒石.....	499
松針叶.....	500

第十七章 涌吐葯.....502

甜瓜蒂.....	502
藜蘆.....	503
胆矾.....	505

第十八章 催情药和催乳药	507
第一节 催情药	508
淫羊藿	508
阳起石	509
胡蘆巴	510
蛤蚧	511
紫河車	512
第二节 催乳药	513
王不留行	513
乳藤	515
鯪	516
药名索引	518
兽医中药学主要参考文献	527
彩图 1	138 頁后
彩图 2	156 頁后
彩图 3	508 頁后
彩图 4	516 頁后

第一編 緒 論



第一章

中藥的來源

在人类开始和自然作斗争时,不免有疾病和伤亡事故发生,从患病和偶然中毒而发生的异常现象中,使人们逐渐发现和认识了許多能够治疗疾病的野生药材。所以说,中药治病的由来,是劳动人民从劳动生产和日常生活中逐渐发现和認識而发展起来的。

在狩猎时代,人类开始和野兽作斗争,这时所用的药物,以动物类药材为最多。

其后,随着社会的发展,植物性药物的需要逐渐增多,单单依靠野生的药材,已渐渐感到不够,因而把一部分药材变为人工栽培。此外,也开始了矿物性药材如丹砂、硫黄、雄黄等的开采和利用。随着制盐、冶金等手工业的逐渐发展,促进了天然药物加工技术的进步。因此,一些手工业制品,如食盐、黄丹、密陀僧、神麴、紅麴、淡豆豉等,以及不少化学制品,如鉛粉、水銀粉等,在这时也开始作为药用。

自汉代張騫(公元前138年)出使西域以后,由波斯及西域等地区傳入我国的药物逐渐增多,有豆蔻、番木鱉、木香等五十余种。由于我們祖先的共同努力,除少数药物外,大部分很快地就能自己

栽种，变为国产药材。这也说明了祖国劳动人民有着善于不断吸取外来的科学成果为人民服务的优良传统。

总的来说，中药的来源是包括了动物、植物、矿物和手工业加工品等四个方面。由于我们祖国历代劳动人民从实际生活中和疾病斗争中不断发现了中药的医疗功效，并运用了农业和工业的生产技术，不断地增加了中药的品种和数量，反复地通过实践发展了药品的生产技术和使用知识，并且不断地吸收了外来的药品，因而形成了现代中药的丰富内容。这是值得重视的。

第二章

中藥发展簡史

祖国藥物最早是不分人医和兽医的。远在三千多年前（新石器时代），人类开始馴化野生动物为家畜的时候，我們祖先就已开始使用若干兽医中藥了。“淮南子”修务訓有神农氏“嚐百草之滋味，一日而遇七十毒”的記載。認為藥物为神农氏所創造，这虽然是一种傳說，但却說明了中藥治病的知識是从实际应用中創造和发展起来的。

夏、商的时候（公元前 15—11 世紀），由于发明了銅制工具，农业生产大大提高，这时的巫医在神权的掩护下，使用的藥物已經发展到百种之譜。

从东周到战国时代（公元前 11—3 世紀），由于鉄器的发明，不但农工商业有了发展，而且医药卫生行政也已經开始实行分工。例如巫与医分职，設医师掌理医的政令，分医为疾医（内科）、瘍医（外科）、食医（管理飲食）和兽医。这是世界最早的医学分科。在藥物方面，“山海經”虽然不是藥学专書，但已經收載藥物 263 种，其中动物藥占 68%，植物藥占 29%，矿物藥及其他藥物占 3%。以后由于植物性藥物逐漸增多，累积起来，再用文字加以記載，在我国

称为“本草”。

由秦汉时代(公元前3世紀到公元2世紀)到清代(公元17—19世紀),我国的本草書籍及炮制經驗,都有了很大的发展。茲将历代重要本草专著簡介如下:

后汉时代的葯物专著“神农本草經”(公元2世紀左右),是我国第一部葯書,共3卷,記載葯物365种(除去重复18种,共收載347种),按照葯物的功用,分上品、中品、下品三类。其中有很多葯物如朴硝、大黃、甘草、麻黃等,还是近代医学上常用的有效葯物;而水銀、硫黃等葯品的記載,比阿拉伯和印度要早800年左右,比欧洲早了一千多年。其他如柳叶治馬疥癩疮、梓白皮治猪疮、牛扁疗牛病等,也都有了記載。

梁代名医陶弘景,收載魏、晋以来名医所用的葯物重修神农本草經,著有“本草經集註”(公元502年)一書。全書共7卷,記載了730种葯物,不但分类方法有了新的創造,而且在每种葯物之后,注釋了关于葯物品种的形态、采集的季节和处方等資料。可見当时人們已經熟悉葯物品种与葯物疗效之間的关系了。其他如葯物的炮制和辨別真偽,也有重要的成就。

唐代李勣、苏敬等撰的“唐本草”(公元659年),是当时統治王朝主持修訂的本草書,共計53卷,記載了844种葯物。其中也包括了兽医葯物,并且附有葯图。这部本草書可称为世界上第一部葯典。欧洲最早的“牛倫葯典”,直到公元15世紀才出版。

宋代唐慎微著的“經史証类备急本草”(公元1108年),共32卷,不但校正和补充了1,746种葯物,而且增加了多种葯物的采集、产地、炮炙法,还記載了民間常用的单方。

明代祖国偉大的医学家和葯学家李时珍,以27年左右的时



圖1 李時珍象

間，參考了800多種文獻，編成了世界本草書的空前巨著“本草綱目”(公元1578年)，總結了16世紀以前我國勞動人民用藥治病的豐富經驗。他以親身體驗，用比較和觀察所得的實際資料來敘述人畜所用的藥物，糾正了前人的許多錯誤，為現代藥物研究提供了

宝贵的资料。

“本草綱目”共計 52 卷，分为 16 部、60 类，以部为綱，以类为目，共計收載藥物 1,892 种。其中搜集最多的是植物性藥物，共計 1,094 种；連同动物藥和矿物藥等，归納为 5 部、32 类，增方 8,160 个，共 11,896 条，并繪制了 1,160 幅藥物标本图。該書的藥物分类法是当时世界上最进步的。波兰学者卜弥格氏于 1647 年訪問我国后，根据“本草綱目”中植物之部的內容，以拉丁文譯成中国植物志，于 1659 年出版，对于欧洲植物学的进展起了很大的作用。

“本草綱目”于 1606 年傳入日本，并由林道春氏于 1631 年譯成日文。欧洲各国学者也把它譯成各国文字，于 1735 年譯成法文，1857 年譯成俄文，1928 年譯成德文；而英文的譯本則甚多。据我們所知，已有七种文字的版本流行于世界，成为世界有名的巨著。

清代赵学敏著的“本草綱目拾遺”（公元 1765 年），共計 10 卷，收載藥物 716 种。如果加上“本草綱目”所載的藥物，可知当时的藥物已发展到 2,608 种之譜。此外，吳其濬著的“植物名实图考及长篇”（公元 1849 年），汪昂著的“本草备要”，吳仪洛著的“本草从新”等，对于中藥的发展和應用，都有一定的价值。

根据現有資料，祖国兽医藥学专著在秦汉以前多已散佚。祖国最早的名兽医，相傳为黄帝时代的馬师皇，在西汉时的“列仙傳”（公元前 206—209 年）中有馬师皇用藥和針治兽病的記載。

东周时的孙阳，官封为伯乐將軍，亦擅医馬。隋書經籍志有“伯乐治馬杂病經”一卷^[注]。这本书虽散佚不傳，但可知孙阳是祖国有史可考的最早的兽医（包括兽医藥物）学者。又据“周礼”所載，在周代朝廷中已有兽医的分职，这时兽医的职掌是：“掌疗兽病，疗

〔注〕“伯乐治馬杂病經”有人認為是秦汉以后的著作。



图2 孙阳象

兽瘍；凡疗兽病灌而行之，以节之，以动其气，观其所发而养之；凡疗兽瘍灌而刮之，以发其恶，然后药之，养之，食之；凡兽之有病者，有瘍者，使疗之；死则计其数，以道退之。”从这些记载，我们可以知道当时采用药物防治兽病，已经有一定的成就了。

汉代的“流沙坠简”和“居延汉简”所载的兽医方，是现在所能看到的最早的兽医药方。从汉简兽医方的材料看来，可知当时在兽医药物方面，除了应用汤药外，还有外涂的膏药及丸药的应用，并且已知服药有草前草后的分别，足以证明在汉代的兽医药物已经相当发达了。

后魏贾思勰所撰“齐民要术”(公元543—559年)，是一部最古




图 8 汉简图

最完整的农書，其卷六，是最早的比較有系統的畜牧兽医科学文献，其中收載了許多兽医藥物和方剂。在藥物方面，例如用麦蘖（麦芽）治中谷，麻子汁治腹脹，榆白皮治咳嗽，芥子、巴豆治馬脚生附骨等；在方剂方面，列举了治疗馬、駝、牛、羊以及猪的藥方 40 余个。此外，还有湯剂、散剂、膏剂、煎剂、胶剂、酒剂、熏烟剂等等的記載。这足以說明我国在六世紀以前的兽医藥物，已經相当发达了。

唐代李石等著的“司牧安驥集”〔注〕，虽然沒有专篇来記載兽医用的藥物，但从該書的看馬五脏变动形相七十二大病的序言中的記載：“昔神农皇帝，創置藥草八百余种，留傳人間，救疗病馬。”可知当时所采用的兽医藥物，已經相当广泛了。又在日譯“师皇安驥集”第十二卷里，共載有兽医藥物 277 种，其中分为石部及草部，而且每种藥物都詳載有性味、主治及禁忌等，有些藥物还注明产地。

宋代（公元 960—1299 年）王愈撰的“蕃牧纂驗方”，現仅殘存元刻版卷八，分上下两卷，卷上載有驗方 56 个，并詳述其配制法和应用。“安驥藥方”，也是我国治馬駝病的驗方汇编，其編者及編集年代虽未得知（据推测为公元 1130—1137 年的著作），但从所載的 140 余个藥方看来，其內容比“蕃牧纂驗方”更为丰富。这两本書都是有价值的古代兽医驗方汇编。

元代东原卞管著的“痊驥通玄論”一書中所載的注解湯头藥方 74 个，論五疔肿的治疗藥方 38 个，共計 112 方，是值得学习和研究的資料；特別是篇后所載的“痊驥藥性治疗用藥須知”，按疗效記載了藥物 250 种（除重复 5 种，共收載藥物 245 种），可以說是現存較早的“兽医中藥篇”。

楊时乔等著的“馬書”，又称“新刊馬書”，是明朝万历二十二年

〔注〕 有人認為是宋代的著作。

(公元 1594 年)刊行的,内容相当丰富,特别是 16 种蹄病的药方,是很有价值的参考资料。

明代万历年間南直隶廬州府六安州喻本元、喻本亨兄弟合著的“元亨疗马集”(公元 1608 年),又称“牛马经”或“牛马驼经”,总结了我国劳动人民几千年来治疗家畜疾病的经验,是我国古代最完整的兽医典籍。就药物方面说,该书按疗效分类列举了 200 多种兽医药物,如果将疗马集、牛经、驼经等各卷中所列的药名统计在内,共达 400 多种,并且收录了 400 多个验方。这些药方在畜牧业生产上起了很大的作用。

“新编集成马医方牛医方”一书,是明末崇禎六年(公元 1633 年)刊行的一部兽医书籍,其中记载了马医方 161 个、牛医方 51 个,共计 212 个药方。

明代徐光启著的“农政全书”(公元 1639 年)卷之四十一,记载了治疗马、驴、牛、羊、猪、狗、猫、鸡的药方 100 余个。

清代周海蓬编著的“疗马集”(公元 1788 年),载有药方 110 个(百一方),其中有些药方是属于家传的验方。

“养耕集”,是清代嘉庆五年(公元 1800 年)傅述风所著,他着重总结前人和本人八十余年的实际医牛经验。该书不仅载有药方 100 多个,而且在篇后附有药性略载便览,记载了兽医药物 135 种。

清光绪廿六年(公元 1900 年)新刻本“猪经大全”,详载了猪五十种疾病的治疗药方共 63 个。

有关药剂的记载,在“黄帝内经”中(据考证是秦汉时代的著作)有汤、饮、酒、醴、膏、丸等制剂的记载,如半夏汤见于“灵枢”,鸡矢醴见于“素问”,这些史实说明了祖国制剂技术比欧洲的迦伦氏早得多,至于商汤伊尹著“汤液经”,更说明了我国汤剂应用的悠久历史。

我国的制药史是与炼丹术分不开的。炼丹术盛行于两晋、南北朝时代，葛洪(公元 281—340 年)是一个代表人物，他所著的“肘后备急方”，除記載了治牛、馬六畜水谷疫癘諸病方外，还載了不少含汞、含砒藥方。这比欧洲 16 世紀拍氏用汞治病要早一千多年。現在外用中藥的紅升丹、黃丹、白降丹等，都是炼丹术的产物。

“雷公炮炙論”是我国的制药专著。此書是雷斅(公元 420—477 年)^{〔注1〕}所撰，他总结了我国五世紀以前的制药經驗 300 多种。炮炙論所描述制药上的基本操作法共 17 种，大都是利用理学的方法，如高温(炮、炙、煨、炒等)和机械法等，把生药制成一定形态。它对后世的藥物炮制，起了很大作用。現在許多中藥鋪所挂的“遵古法制”，就是表示遵循炮炙論的意思。

自从 1840 年鴉片战争以后，帝国主义者向我国进行了政治上、經濟上和文化上各方面的侵略，加上封建、軍閥統治者盲目地崇拜西方“文明”，以虛无主义的态度对待祖国科学文化遗产，对于具有几千年历史的中医、中兽医和中藥，国民党反动派还采取消灭的政策，使祖国医药受到严重的摧殘。

1949 年以前在解放区及中华人民共和国成立之后，使上述情况有了根本的改变。早在 1944 年，毛主席在“文化工作中的統一战綫”一文中就曾指出：“……不联合边区現有的一千多个旧医和旧式兽医，并帮助他們进步，那就是实际上帮助巫神，……”^{〔注2〕}朱德委員長也于 1947 年面示太行区北方大学农学院师生要学习和研究中兽医学术。在抗日战争中及解放战争中，中兽医的医药力量对于当时的八路軍、新四軍及以后的中国人民解放军的軍馬卫

〔注1〕 据近代考証，此書系作于宋代。

〔注2〕 見“毛澤东选集”第 3 卷，第 1010 頁。

生工作,也起了很大的作用。由此可以知道,我们党对祖国兽医药物遗产和民间兽医中药是一向重视的。

1951年,党和人民政府在中央卫生研究院中成立了中国医药研究所,到1955年该所又扩展为中医研究院,从事中医中药的研究工作。

为了发展中药材,有计划有组织地加强中药的产销工作,在党和人民政府的正确领导下,于1954年成立了中国药材总公司,各省、市也相继成立了省、市药材公司或中药材经营管理处、批发、门市等机构。由于对中药材的产销工作,逐年进行了适当的安排,从而使中药材的产量有了显著的增长。如以1952年的中药材生产总值为100,则1957年为187,1958年为276。兹将1958年几种主要中药材的产量增长百分比(以1957年为100)列举于下:

附子 115 白芷 126 白芍 135 茯苓 140

生地 194 牛膝 294 郁金 400

药材公司自成立后,便大力开展了购销业务,1958年全年药材供应数较1957年扩大了14.72%。虽然中药材的生产有了显著的增加,但仍然不能满足日益增长的需要,这是前进中产生的新问题,需要更进一步努力来发展中药材的生产。

从上述这些事实看来,几年来在党和政府的正确领导下,中药材方面的成就是巨大的。

1956年1月,国务院发布了“关于加强民间兽医工作的指示”,提出对民间兽医“团结、使用、教育、提高”的方针。这个指示对于充分动员和发挥民间兽医的力量和促进兽医中药的发展具有重大的意义。

农业部为了进一步发扬祖国兽医药遗产,使之在建设社会主

义的畜牧业中發揮更大的力量，曾于1956年9月3日至12日召开了全国民間兽医座談会，借以总结民間兽医的經驗。这是一次有十分重大意义的會議。在座談会上，除討論有关中兽医学的理論問題及針灸問題外，还交流驗方共有500多个，会后編印了“中兽医驗方汇編”一書。这些驗方是我国劳动人民在和家畜疾病作斗争中积累的經驗，值得我們重視。


1956年10月，江西省农业厅首先成立了中兽医实验所，专门从事中兽医学术及診療的整理和研究工作。該所几年来收集了500多种民間草藥，发掘了許多有效的驗方和秘方。各省、区、县、公社也編了許多中兽医驗方或民間兽医驗方書、中兽医常用草藥汇編等等。这些都是寶貴的中藥遺產。对于中藥遺產除必須繼續徹底挖掘外，还应进行整理、提高，使之發揚光大。

1958年6月25日，中国农业科学院在兰州召开了第一次全国中兽医研究工作座談会，交流和总结了中兽医的許多經驗，并于7月1日成立中兽医研究所。这是振奋人心的一件喜事，說明了中兽医藥的研究工作在党的领导下已經有了显著的进展，并进入了一个嶄新的阶段。此外，有些省分也成立了中兽医研究室、中兽医学校，举办中兽医訓練班，而在各大专学校中，也开始添授了中兽医学这门課程。

我們偉大的祖国正处在大跃进的新时期，工农业建設事业正在万馬奔騰地向前飞跃发展，技术革命和文化革命在全国範圍內已掀起了高潮。全国的畜牧兽医工作者，在偉大的中国共产党的英明领导下，大家下定决心，积极响应党的号召，坚决貫徹党的政策，團結一致，互相督促，互相学习，打破陈規，鼓足干劲，积极展开对兽医中藥的学习和研究，尽最大的努力把我国社会主义畜牧兽

医事业建立在现代最先进的科学技术的基础上。这是光荣的任务，
讓我們奋勇前进吧！

第二編 總論



第一章

中藥的基本知識概述

本章概述中藥的命名法，中藥的產地及生產情況，中藥的採集、調查、貯藏以及分類等問題。

第一節 中藥的命名法

中藥的名稱常根據藥物的產地、形態、顏色、氣味、藥用部分、效用、生長特性、最初使用人或沿用外來譯名等而來，現分別簡述如下。

(一)因產地而命名 中藥以植物性藥材占多數，由於生長或栽培的土壤和各地區的气候的不同，往往會影響它的療效和功用，因此有些藥名就根據產地而命名，例如川貝母、川芎、川軍、川黃連、巴豆、蜀椒等，都是因生長在四川而得名；廣陳皮、廣木香、廣郁金等，都是因生長在廣東或從廣東方面進口而得名。

(二)依形態而命名 是根據原植物或生藥的形態而命名的，如烏頭的塊根形態因類似烏鴉的頭而得名；牛膝的莖節膨大部因類似牛的膝關節而得名；其他如鉤藤、木鱉子、鶴虱、馬兜鈴、狗脊等，都是依其形態而命名的。

(三)因颜色而命名 是根据原料生药的天然颜色而命名的,例如红花的花是红色的,黑牵牛的种子是黑色的,黄连的根茎是黄色的。其他如白芷、青蒿、青黛、青皮、赤芍、紫草、大黄、黄芩等的名称,都是因颜色而得名。

(四)因特殊气味而命名 是根据某些中药的特殊香气和滋味而命名的,例如麝香、木香、沉香、乳香、藿香、丁香、茴香等,都是因为它们有特殊的香气;至于苦参、细辛、酸枣仁、甘草等,都是因其味道而得名的。

(五)因药用部分而命名 是根据使用原植物或动物的入药部分而命名的,如葛根、白茅根、桂枝、金银花、菊花、桑叶、枇杷叶、车前子、枳实、陈皮、地骨皮、木通、虎骨、犀角、蝉蜕、穿山甲、熊胆等等。

(六)因效用而命名 是根据临床上的经验而命名的,如淫羊藿有催情的效用,益母草有治疗母畜子宫疾病的效用,通草有通利小便的效用,防风有治疗或防御风邪的效用等。

(七)因生长特性而命名 是根据某些植物性药物的生长特性而命名的,如款冬花的花至冬季始开花,忍冬在冬季仍然不枯萎,万年青的叶为四季常青,夏枯草于夏至季节后全草就枯萎等。

(八)因纪念某人而命名 是以最先发现或最初使用人的名字作为药名,如使君子、何首乌、刘寄奴、杜仲等。

(九)沿用外来药物的译名 是根据进口药物的译音或冠以番、胡等字样,如曼陀罗、诃黎勒(诃子)、番木鳖、胡椒、胡黄连等。

目前中药的名称尚存在不统一的现象,往往同一种药材,因各地使用习惯,以及采用药材的产季、产地的不同而有很多名称,亦有对科属不同的药材使用同一名称的,这就造成了采集、收购、使用、经验交流和整理研究的困难,因此急须根据各地的具体情

况,拟定統一的中藥名称。

表1 中藥的命名归納簡表

命名由来	藥名举例	命名由来	藥名举例
产地	川芎、川軍	藥用部分	桂枝、葛根
形态	牛膝、烏头	生长特性	忍冬、款冬花
顏色	紅花、黃連	紀念某人	使君子、何首烏
气 味	麝香、苦参	沿用譯名	曼陀罗、訶黎勒
效 用	淫羊藿、益母草	—	—

第二节 中藥的产地及生产情况

中藥的原植物或原动物的出产地方,称为产地。中藥材的原产地,是指中藥的天然产地或原始产地,例如我国特产的麻黄、大黄、半夏、当归、五倍子、茶叶等等,其原产地均为中国;而川芎、川連、川貝母、川椒等,其原产地均为四川省。如将中草藥的原植物自原产地移到其他地区繁殖,該繁殖地称为移植地,例如番泻叶原产于印度和埃及,現移植于我国及其他地区;川黃連原产于四川,現移植(引种)于其他各省。如将天然中草藥变为家种,則称为人工培植(人工栽培)。如将野生动物变为家养則称为人工繁殖。

本書各論中所指的产地,系指中藥的出产的地区,不再詳細分述。

解放前由于国民党反动政府根本不关心人畜的健康,歧視中医中藥,对中藥材的生产橫加破坏,使中藥材的产量逐年减少。

解放后党和人民政府对人畜的保健事业十分重视,因之藥材的生产也随着恢复和发展。

1956—1967 年全国农业发展纲要(修正草案)第十七条规定：“发展药材生产。注意保护野生药材，并且根据可能条件逐步进行部分的人工栽培。”1958年10月31日，国务院发布“关于发展中药材生产问题的指示”中指出：

1. 实行就地生产、就地供应的方针，是发展中药材生产解决中药材供应问题的根本办法。

2. 积极地有步骤地变野生动、植物药材为家养家种，是发展中药材生产和解决中药材供应问题的另一项带有根本性的措施。

3. 在安排中药材生产的同时，各级人民委员会还必须加强对中药材经营工作的领导。

这个指示，对中药材生产是一个很大的鼓舞力量，我们必须坚决贯彻国务院关于发展中药材生产问题的指示，实行就地生产、就地供应的方针，扩大中药材的产地。

在依靠党委，解放思想，订规划、提措施的前提下，1958年各地中药材的生产迅速跃进，不但增加了药材栽培的面积，而且注意到产量及质量，有不少的品种出现了高额丰产，在变野生为家种方面，已试验成功了200余种。湖南邵东县新中社白芍亩产4,375斤，比1957年每亩产量提高2—3倍，该县泉溪社种的三亩玉竹试验田，亩产量达15,000斤；浙江的延胡索、白朮，四川的川芎，湖北的黄连、红花，安徽的茯苓等，都创造了高产丰收纪录。在变野生为家养方面，过去是打獐取麝香，越打越少，现在四川等地不仅饲养成功了，而且可以从活獐身上取出麝香；广东人工养殖了海马，广西人工饲养了白花蛇，东北的细辛，过去认为很难变为家种，现在也种成功了；吉林人参，过去说很难在别处栽成，山西隰县不但种植成功，而且生长良好。这些事实，都说明了国务院发布的“关

于发展中藥材生产問題的指示”的正确性。

我国藥材資源丰富,分布广泛,从喜馬拉亚山到东海岸,从长白山到海南島,从黃土高原到黑土地帶,在各省的深山密林、高山峡谷、肥沃的平原、大小河川的两岸,到处都生长着藥材,估計有 5,000 多种,产量之多,占世界第一位。仅广东一省就有 550 多种,最少的省份也有 100 多种。它不仅对保障人畜的健康和改善人民生活有很大的关系,即对积累資金換取外汇、支援国家工农业及国防建設等方面也起了很大的作用,因此,我們必須很好地加以发展和利用。

第三节 中藥的采集和調查

一 中藥的采集

中藥的藥用部分,往往因生长地区、采集季节和方法的不同而影响其产量及疗效。所以古人非常重視藥材的产地及采藥的时间。現在按植物藥、动物藥、矿物藥三类分述于下:

(一)植物类

1. 地下部分(根类和根莖类) 一般在早春植物开始生长前,或在秋季該植物地上部分开始枯萎之后采集;但甘草和白芨的根莖应在开花前采集,因为这个时期所含的精华最多。

2. 皮类(树皮) 一般应在春季或初夏时采集,因此时树干中所含液汁較多,皮部与木部容易分离,在有雨季的地区可在雨季中采集;但如桑白皮、牡丹皮、合欢皮等,則应在立秋后到冬至时采集。

3. 莖叶类 一般应在生长全盛时期采集,即在花未开或正在

开花而果实和种子尚未成熟时采集;但如茶叶,应在幼嫩时采集,而桑叶应在冬季采集。

4. 花类 一般是在未开放前采集花蕾,例如金银花、丁香、款冬花、芫花、辛夷花等;但是红花、旋复花应在正开花时采集。采集花类时宜擇干燥的晴天,采取后必須松放,防止挤压损坏。

5. 果实类 一般在接近成熟而未完全成熟时采集,例如青皮、枳实、烏梅等;但如茴香、鹤虱、梔子、蒼耳子、連翹等,均应在成熟时采集。

6. 种子和核仁 一般应在完全成熟时采集,例如桃仁、柏子仁、芥子、萊菔子等。

7. 全草类 一般应在开花时采集;但如茵陈蒿,应在未开花前采集其幼嫩的地上部分。

8. 树脂及胶质类 一般应选择干燥季节或在雨季后采集,并須尽力避免泥、砂和植物的細屑污染,如沒药、乳香等。

植物类药材采集后,首先应进行药用部分的整理,如刷洗修切等手續,然后迅速利用阳光晒干,或通风阴干,在必要时,也可用人工干燥法进行烘干,然后妥为保存。其他可参考本章第四节。

(二)动物类

一般潜藏在地下的虫类可在夏秋季捕捉或挖掘,如蚯蚓、蜈蚣、螻蛄、全蠍等;而殭蚕則应在四眠(四齡)之后、当尸体殭硬时收采;桑螵蛸則在冬春两季收采;麝香則常于秋、冬两季采取;鹿茸一般是在清明之后两个月內,在公鹿的幼骨尚未骨化时采取;而鹿角、犀角等,則須待幼角完全骨化而且成熟时采取;馱皮、虎骨一般是在秋后或冬季采取。

(三)矿物类

一般在农閒、秋后庄稼收割后开采,但也可配合开矿时期同时收集。

表2 中藥的采集时期归納簡表

分 类	藥 用 部 分	一 般 采 集 时 期
植 物 类	根 类	初春或深秋
	皮 类	春末或初夏
	莖叶类	生长全盛时
	花 类	含苞或初放时
	果实类	初成熟或未老熟时
	种子、核仁类	完全成熟时
	全草类	开花时
	树脂、胶质类	干燥季节
动 物 类	全尸或部分尸体	按各种动物的特点采取
矿 物 类	成塊或細粉末	农閒或开矿时期

二 中草藥的調查

为了調查和研究各地的民間草藥,以便为畜牧业的增产服务,采集草藥及标本制作是一件重要的工作。

采集草藥标本时,必須登記藥名、俗名、产地、科屬形态、藥用部分、功用、用量、产量等等項目,而且要注意产地的土質、气候、地勢高低、水生或陆生等环境影响及其有关来源、历史情况、产銷数量、藥农或挖藥群众的經驗等。

关于草藥标本的采集,必須注意選擇具有花、叶、果实和种子完整的全株。如开花、发叶、結果不在同一时期,一次又不能同时采齐,則可以分期采集;对于高大植物如楓树、柏树等,可剪一长约1尺4、5寸而有叶和花的枝条即可;如系短小草本植物,則应連

根掘起；若草药寄生在另一株植物上，須連同被寄生的植物一同采集，以說明草药和寄生植物的关系；若一株植物上只长雄花或只长雌花的雌雄异株植物，应将雄花和雌花分別采集；如同一草药上具有两种不同形态的叶片，也应將两种叶片同时采集；遇有肉汁的草药如石斛、石蒜等，一般先用沸水浸片刻，然后按下述方法压制为标本。

草药标本的压制方法：普通是将草药采来后，細心清除泥土，拭刷干淨，并立即用容易吸收水分的紙加以压制。一般的做法是：先将草药鋪置于紙上，小心地将花、叶、果实等分別鋪开其正面和背面，压平，对于药用部分，要特別注意，然后再行复盖一層干燥的草紙；标本过长过大的，可以曲折回摺，使与六至四开报纸的大小相等；如草药不止一株，中間可襯干紙繼續堆集，然后再用两块平整的木板上下夹住，用繩捆紧或在上面再压上 20 到 40 斤重的石头。以后每天要斟酌換干燥的草紙一次，待稍干后，可以每隔 3 至 5 天換干紙一次，一直到标本充分干燥，不致霉烂为止。每一标本上，必須附帶說明，并可按笔划、自然分类系統、形态或效用进行分类，以免过久遺忘，无法查考。这样，才能保持草药标本的完整性，有利于中草药的調查、整理和研究。

第四节 中药的貯藏

一般中草药經過采集、整理后，除供新鮮使用外，都必須进行干燥，以便貯藏。干燥的方法有下列几种：

(一)阳光晒干法 就是利用直射阳光的热力以及流动的空气进行干燥；但容易受日光影响的药材如茯苓、骨碎补等，則不宜用

此法干燥。

(二)加热干燥法(用火烘干法或火力干燥法) 如在雨季,或不能用阳光晒干的药材,如大黃、番紅花、紅花及其他各种花类,用阳光晒干时容易变色,因此必須采用火炕或烘箱(柜)来进行干燥。对于皮类及根类的干燥,可用燙手的温度;全草及花类,可用微温手的温度;含有香味的药材,温度不可燙手;而叶类应采用微火烘干。在加热时,温度須慢慢升高,以免药材的精华受到損害。

对于叶类及細根类药材,用阳光晒干或加热干燥后,应放置室内一夜,使其稍柔軟后,再行包装貯藏。

(三)阴干法(通风阴干法) 就是将药材用繩捆扎成束,悬于室内或置于架上蔭凉处,在室温下任其通风,使水分自然蒸发的一种方法。一般适用于含有香味的药材,如植物的叶、花以及全草等的干燥。

(四)石灰干燥法 就是把药材放入盛有生石灰的密闭容器内,然后放置于蔭凉而干燥的地方。这种方法适用于人参、鹿茸、枸杞、动物脏器以及虫类等的貯存。对于多肉性的根莖类如半夏、貝母等,可混放一些石灰粉使其干燥,能保持它們的白色。

药材干燥后貯藏时,还須注意貯存地方是否适当,以及外界条件如潮湿、日光、温度、空气、害虫和药材本身的耐貯年限等問題。

为了防止潮湿、日光、温度的影响,药材必須保存于通风、干燥、蔭凉的倉庫内;对于遇空气变質的药材,应密闭于磁瓶、瓦器或錫罐中,必要时可装于玻璃瓶中蜡封。此外,也可采取紙匣装、箱装、袋装的办法。

防止害虫的蛀蝕,是一种特別重要的工作,一般可采取下述的措施:

(一)貯藏的处所必須打扫清洁与消毒,而且應該沒有裂縫。

(二)要有通风設備,并且要經常晾晒和定期檢查。

(三)对于不同的葯材或非同时存入的葯材,須留有相当的間隔,以免虫害迅速蔓延。

(四)对于在雨季中容易霉蛀的葯材,可置于烘房中或火炕上干燥;至于少量的葯材,也可放在灶房的爐台上(用鉄皿装)干燥,但須注意温度不可过高,以免將葯材炕焦。

(五)对于比較貴重的葯材可采用冷藏法,例如人参、枸杞子、杭菊花、党参等。

(六)除有特殊香味的葯材外,可用硫黄在密閉的室內燃燒熏之,以防治虫。

(七)对抗性的防蛀方法,如牡丹皮与澤泻同貯,白花蛇中放花椒,三七內放樟腦,柏子仁內放明矾,土鼈虫、蜈蚣、蚯蚓內放大蒜头,当归、瓜蒌內放酒等,都可以防止虫蛀。

总之,对不同的葯材,应采取不同的貯藏方法,才能避免葯材发霉、虫蛀、变色、变味、变质,才能保持它的疗效,防止不应有的損失。此外、对于毒葯剧葯,应按国家的規定和保存于上鎖的柜中,注意保管。

表 3 中葯的貯藏归納簡表

干 燥 法	防 虫 防 蛀 法
1. 阳光晒干	1. 庫房須打扫清洁, 沒有裂縫
2. 加热干燥	2. 要有通风設備, 每种葯材須留間隔
3. 阴 干	3. 要有烘干及冷藏設備, 要定期檢查
4. 石灰干燥	4. 用硫黄熏烟, 对抗性的貯藏法

第五節 中藥的分類

中藥的分類，其目的是为了便于研究和应用。由于中藥的種類，历代有所增加，所以分類的方法，也就有了发展和改进。一般來說，中藥的分類方法，約有下列几种。

(一)按藥物的功用來分類 例如“神農本草經”，將365種藥物分為上、中、下三類，其中，上品120種，是當時認為無毒而可以久服的藥物；中品120種，是防治一般疾病和補養的藥物；下品125種，大都是有毒的藥物。這種按功效來分類的方法，是我國最早的藥物分類法。

(二)按藥物的來源而分類 例如梁代陶弘景著的“名醫別錄”、“唐本草”、宋代“嘉祐補註神農本草”以及明代李時珍著的“本草綱目”等書，均以藥物的來源，分為草、木、果、菜、谷、人、禽、獸、虫、魚、水、金、玉、石、火、土、服器、鱗、介等。這對於中藥的研究，頗為適宜。

(三)按藥物的作用而分類 例如“珍珠囊補遺藥性總賦”，以寒、熱、溫、平等四性來分類；北齊徐之才著的“雷公藥對”，則分為宣、通、補、瀉、輕、重、濡、滑、燥、濕等十劑；元代卞氏著的“痊癰通玄論”與明代喻本元等著的“元亨療馬集”中所記載的藥性須知，都按療心、療肝明目、溫脾和中、療肺啞喘、腰腎小腸、大腸草結，諸風解表、五勞七傷、導熱涼三焦、導積滯氣、療血和血、杀虫治疥、癰疽疫氣、和藥解毒等而分為十四劑。這對臨床應用方面，是古代比較進步的一種分類法。

近代的本草書，也有按藥用部分來分類的，例如分為根、莖、

皮、叶、花、果实、种子等部分；也有按动、植、矿、加工制品等来分类的；也有按药物的科属来分类的。

在中兽医“采风”的现阶段，我们认为按科属来分类是比较适宜的，因为这种分类法不仅可以表明动、植物药材的亲缘关系，同时也便于实用。

科属，就是将许多有共同之处的动、植物药材相近的种，归纳成为属；再把互相接近的，归纳成为科。这在中草药的采集、整理、研究和应用上，比较方便。

第二章

中藥的炮制

中藥在粉碎、配制成藥或切成飲片的前后，大部分需要經過種種不同的方法來加工處理，這種加工處理就稱為“炮制”或“炮炙”。

炮制的目的在於除去雜質，減少某些藥物的異味和毒性，以便充分發揮藥物的藥性和便於粉碎、運輸、貯藏和應用。

應該特別注意的是：①某些毒藥如生半夏、生南星等，須經炮制後方能內用；②某些藥物雖然毒性不大，但生用和經過炮制後的功用和主治並不完全相同，例如：黃連生用治心火，醋炒治虛火，豬胆炒治肝胆火，酒炒治上焦火，姜汁炒治中焦火，鹽水炒或童便炒治下焦火，黃土炒治食積火，吳茱萸湯炒治濕熱在氣分者，牛膝水炒治濕熱在血分者，用井泉水泡則外用點眼，這就充分說明了炮制的重要性。

明代陳嘉謨說：“酒制升提，姜制發散，入鹽走腎而軟堅。用醋注肝而止痛。童便制除劣性而下降。米泔制去燥性而和中。乳制潤枯生血。蜜制甘緩益元。陳壁土制，竊真氣，驟補中焦。麥麩皮制，抑醋性勿傷上膈，……羊酥油、豬脂油塗燒，咸滲骨容易炮斷。

去瓢者免脹，抽心者除煩……”等，不但說明了炮制的意義和目的，而且說明了藥物炮制的重要性。

我國在炮制方面已創造了寶貴的經驗，例如雷斅著的“炮炙論”，早已記載了炮炙十七法。

炮制十七法歸納起來可分為四類，即火制、水制、水火制和非水火制，其中有些方法經過歷代的不斷修改和補充而更加充實，但有些方法已經少用了，茲將較為常用的一般炮制法，簡介於下，對於每種藥物的炮制法，則記載於各論中。

(一)火制法(加熱處理法) 可分為烘、焙、煨、炒、炮、炙、燂等七種。關於火力的大小，古代有文火和武火的分別，文火就是沒有火焰的火，加熱的溫度較低；武火就是有火焰的火，加熱的溫度較高。火制的目的是要使藥物達到乾燥、松脆、焦黃、炭化，而便於應用和保存。

1. 烘 就是將藥物放在近火的地方，使它所含的水分慢慢蒸發乾燥，以便粉碎和保存，例如菊花、金銀花等。

2. 焙 就是把藥物放在鋪上紙的鐵絲網上，用弱火加熱，使其乾燥，例如蟲蟲、水蛭等。

3. 煨 一般採用兩種方法，第一種方法是將藥物的表面裹些面糊或濕紙，放在弱火中烤烘或鋪在鐵絲網上用火烤，使面糊或紙的表面焦黑後去火，冷後剝除，如煨木香、甘遂等；另一種是把藥料埋在火灰里煨熟，如煨肉豆蔻，但須注意火力，以免將藥物燒毀。

4. 炒 就是把藥物放在鐵鍋或砂鍋里炒，一般分為炒黃、炒焦、炒黑等三種，這主要是根據藥性的不同來決定。例如白殭蚕、白朮、刺蒺藜、麥芽等可炒黃；山楂、神麴等可炒焦；地榆、側柏葉等可炒成黑色，但不可使其全部炭化。此外，尚有砂土炒，如骨碎補；

麸皮炒，如山藥；蛤粉或滑石粉炒，如阿膠；酒炒，如何首烏；醋炒，如香附子；鹽水炒，如益智仁；米泔水炒，如蒼朮；糯米炒，如斑蝥等等。

5. 炮 就是把藥物的大塊或切成小塊後，放置在高熱的鉄鍋中急炒片刻，直到表面變黑冒煙即迅速取出，例如炮姜、炮附子等。

6. 炙 炙和炒在意義上和操作上相似，但往往把藥物切成片或切成小塊，拌上蜂蜜或酒、或姜汁、或酥油等，然後放在鍋中加熱炒至微焦黃為止。例如炙甘草、炙黃耆，多拌以蜂蜜；厚朴多同生姜同煮而後風干（姜汁炙厚朴）；五靈脂多用黃酒或醋炒；蛤蚧、鼈甲多用油炙黃或入熱油熬炸（酥炙）等。

7. 煨 就是高溫度的加熱處理，一般是將藥物直接放在火內燒紅，或先將藥物放在耐火的器皿中，然後放在燒紅的火中煨燒。例如煨龍骨、龍齒、爐甘石、牡蠣、石決明等。

（二）水制法 一般分為洗、漂、漬、泡、水飛等五種。其目的為使藥物清潔、柔軟，便於切片或減低藥物的烈性和毒性。

1. 洗 就是洗去藥物的泥土和其他附著物。

2. 漂 就是將藥物用水浸洗，以除去鹹味或腥臭。如鹽附子、鹽肉蓯蓉等，臨用時須用清水漂去鹹味；海藻、人中白等，臨用時須漂去腥臭。

3. 漬 就是用水將藥物慢慢滲透而使之柔軟的方法。例如栝榔，須用水浸漬七天左右，使其浸透後切成薄片；桂枝須浸漬二天左右，待其中心部分潤透，然後切片；木通須浸漬一天左右，然後切片陰干。

4. 泡 就是把藥物放在清水或沸湯內浸泡的方法。例如杏仁、

桃仁，須用开水泡浸后捻去皮尖；麦門冬須用开水泡一小时左右，然后抽心晒干用。

5. 水飞 就是把藥物放在水內，經過一次一次的研磨或攪拌，以取其最細的沉淀物。一般在配制較难研細的藥物，或防止藥物飞揚損失时采用这种方法，如飞硃砂、飞滑石等。

(三)水火制 一般分为煮、蒸、淬、露等四种方法。其目的是使藥物便于研碎、保存和服用。

1. 蒸 就是把藥物放置在蒸籠上或水鍋上隔水蒸熟，如蒸熟地、玉竹、大黃、人參等。

2. 煮 就是把藥物放在清水內或藥汁內煎煮。例如天南星、半夏、烏头等，須放在清水內煎煮約二小时左右（还須加入一些甘草、生姜、皂莢等放于清水內），然后取出阴至半干，置于磁罐或瓦罐內3至5天悶之，再取出切片阴干；又如芫花，須用醋煮后才可应用。

3. 淬(炼) 就是将藥物燒紅后，迅速取出投入醋中或其他液体中，如是反复3至7次的一种方法。例如自然銅，須用火燒透，用醋淬再燒再淬，反复7次，使变成黑色，然后水飞研末用。

4. 露 就是用蒸溜的方法来制造藥液。例如金銀花的蒸溜液就是艮花露。

(四)非水火制 一般包括镑、霜、发酵等三种方法。

1. 镑 就是用刀片装在木柄上，把藥平推成薄片，以便压成細末来应用。

2. 霜 就是将藥物加工处理而产生的白色粉状物。例如巴豆将油脂除掉而成的巴豆霜，則毒性大为减低。

3. 发酵 就是利用发酵的方法来处理藥物，以提高藥物的疗

效。例如神麴、紅麴、淡豆豉等。

此外,把一種藥物加入其他藥物處理,以適當的改變原藥的藥性時,就稱為制。如制半夏、制胆南星等。

總之,炮制的方法相當複雜,例如工具的選擇、加熱的程度、浸漬的時間等,如果不能很好地掌握,就達不到炮制的目的和要求,因此,必須加以重視。

表 4 中藥的炮制歸納簡表

炮制方法	炮 制 種 類	炮制方法	炮 制 種 類
火 制 法	烘、焙、燂、炒、炮、炙、煨	水 火 制	蒸、煮、淬(煉)、露
水 制 法	洗、漂、漬、泡、水飛	非水火制	鎊、霜、發酵

第三章

中兽医的基本理論与中藥的运用規律

本章扼要地叙述有关中兽医的基本理論与中藥运用的基本規律,如阴阳五行、四診八証等与藥物的关系,并对四气五味、升降浮沉、归經等有关藥性的基本問題,加以簡單的討論。

第一节 阴阳五行与藥物的关系

阴阳五行学說是中兽医学的理論基础,这里首先分述阴阳五行的涵义,然后再說明它和藥物的关系。

一 阴 阳

阴阳是代表一切事物矛盾的兩方面,也就是自然界对立統一的根本法則。古人以朴素的唯物主义观点,用它來說明客觀事物矛盾統一的規律。

阴阳的涵义是非常廣泛的。例如“內經素問”阴阳应象大論說:“阴阳者,天地之道也,万物之綱紀,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。”这里所指的阴阳,实际上就是原始的矛

盾对立統一的法則，而它所包括的范围，就是天地万物变化、生杀和治病等等。

一般來說，如溫熱、興奮、旺盛、剛燥、在外、向上、氣體等等，都屬於陽；凡寒涼、抑制、衰弱、沉靜、在內、向下、液體等等，都屬於陰。

表 5 陰陽歸納簡表

屬性	包 括 范 圍							
陽	溫熱	興奮	旺盛	剛燥	在外	向上	氣體	……
陰	寒涼	抑制	衰弱	沉靜	在內	向下	液體	……

就動物體來說，公為陽，母為陰；体表為陽，體內為陰；頭為陽，腳為陰；背部為陽，腹部為陰；六腑為陽，五臟為陰；氣為陽，血為陰；骨為陽，髓為陰；上竅為陽，下竅為陰等等。

陰陽並不是僅着重于对立的一面，而且還有統一的一面。例如“素問”生氣通天論說：“凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春與秋，若冬與夏，因而和之，是為聖度。”這就說明了陰陽還必須統一，互相聯系。如果陰與陽失去了平衡，動物體就要發生疾病，在平衡遭到極度破壞時，甚至發生死亡。因此，經常保持在一定的平衡狀態，是保持動物體健康的重要法則。

關於藥物和陰陽的關係，簡述如下：

(一)就草藥來說，根為陰，皮為陽；內實的根莖屬陰，空心的為陽；枝為陰，葉為陽；果為陰，花為陽；核為陰，殼為陽。

(二)就藥物的氣味和升、降、浮、沉來說，氣為陽，味為陰；味厚者為陰，薄者為陰中之陽；氣厚者為陽，薄者為陽中之陰。四氣中的溫熱為陽，寒涼為陰；六味中的辛、甘、淡為陽，酸、苦、咸為陰。就升、降、浮、沉來說，即升浮為陽，沉降為陰。由此可以知道，藥物和

阴阳学說的关系是非常密切的。

二 五 行

五行学說是古代人們根据日常生活实践中最常接触的五种物質的形态归納出来的，用它作为一切事物的归类和推演事物間相互联系及其变化的一种理論工具。五行就是指木、火、土、金、水等自然界的五大元素，可以說明阴阳的象征。

在医药上，一方面可以运用五行的屬性，将自然界与动物体的一切互相联系起来，以說明生理、病理以及药性的規律；另一方面，可以用五行学說來說明相生、相尅的辯証規律。現在分述于下：

(一)关于互相联系方面 在医药上，五行常与方位、时令、五气、生化过程、脏腑、脉、液、窍、荣、体、容、色、味、声、嗅等相联系起来。茲归納如表 6。

五行配四时，可以理解为在于說明物質运动的客观性，决定于空間和時間。五行配脏腑，說明脏腑不仅是在形态上的一个单位，而且是一个功能的单位。五行配五气、脉、液、窍、荣、体、容、色、味、声、嗅等等，說明生理、病理、药性等各方面的相互关系和相互影响。

(二)关于相生相尅方面 “相生”是含有資生、助长的意义，是具有互相促进、互相依存的关系；“相尅”是含有制、胜的意义，是具有互相制約、互相尅服的关系。

古代对于“相生”的依据是：鑽木則生火而称为木生火；火燃燒物質后变为灰燼而称为火生土；土內蘊藏着金屬矿可以提炼金屬而称为土生金；由于空气接触金屬的寒冷則凝結成水，所以称为金生水 水可以湿润土壤使树木生长茂盛而称为水生木。这就是

表 6 五行归类簡表

五行	木	火	土	金	水
方位(五居)	东	南	中(中央)	西	北
时 令	春	夏	长夏	秋	冬
五 气	风	暑(热)	湿	燥	寒
生化过程	生	长	化	收	藏
五 脏	肝	心	脾	肺	肾
五 腑	胆	小腸	胃	大腸	膀胱
五 脉	弦	洪	代	浮	沉
五 液	泪	汗	涎	涕	唾
五 窍	眼	舌	口(唇)	鼻	耳
五 荣	爪	面(色)	唇	毛	髮
五体(充)	筋	脉(血)	肉(肌)	皮毛	骨(髓)
五容(老)	怒	喜	思	憂(悲)	恐(惊)
五 色	青	赤	黃	白	黑
五 味	酸	苦	甘	辛	咸
五 声	呼	叫	鳴	哼	呻
五 嗅	臊	焦	香	腥	腐

相生的循环推动規律。

“相尅”的依据是：由于树木的根伸入土內吸收养分而称为木尅土；土堤可以堵住流水而称为土尅水；水可澆灭火而称为水尅火；火可熔解金屬而称为火尅金；金屬可以制斧砍伐树木而称为金尅木。这就是表示相尅的自然現象。茲归納示意如图 4、表 7。

古代医学家把上述的自然現象运用到动物体的身上，并把动物比如是一个小天地，來說明动物和外界环境的关系。

所謂“生我者为母，我生者为子”，就是运用上述的自然現象来



图4 五行相生、相克示意图

表7 五行相生、相克表

五行相生			五行相克		
木	生	火	木	克	土
火	生	土	土	克	水
土	生	金	水	克	火
金	生	水	火	克	金
水	生	木	金	克	木

说明五脏生我和我生的母子关系。例如木生火即肝为心之母，心为肝之子；火生土，即心为脾之母，脾为心之子；土生金即脾为肺之母，肺为脾之子；金生水即肺为肾之母，肾为肺之子；水生木即肾为肝之母，肝为肾之子等。这就说明了五脏的相生关系。这种关系，

如果运用在藥物方面，是有很大的帮助。例如“元亨疗馬集”論馬寒症灌熱藥時這樣說：“寒症嚙煖(熱)藥而不效者，心血不足也。心血不足者，養心生血。”這就是說，“心血不足”，用火不能生土，所以就必須採用養心生血的藥物(如當歸、黃耆等)來進行治療。這就是虛則補其母的方法。又如肺氣實時，往往影响到膀胱(金生水)，因此，除採用藥物來瀉肺外，還應該瀉膀胱的水，才能使病恢復正常。這就是實則瀉其子的方法。以上這些可以充分說明母子關係在藥物應用上的重要性。

所謂尅我我尅的關係，在“木”是我尅土，尅我者金；在“火”是我尅金，尅我者為水；在“土”是我尅水，尅我者為木；在“金”是我尅木，尅我者為火；在“水”是我尅火，尅我者為土等等。這就說明了五臟的相尅關係。這種關係同樣可以運用在藥物的應用方面，例如腎寒是由于火不足而不能生土，以致土病(脾病)而土尅水(腎病)，因此如果採用補心養血及補脾胃的藥物去治療，由于火生土而土不會去尅水，則病就可以逐漸恢復正常。這就是克服偏勝偏衰的用藥方法，說明中兽医和中藥是一個整體，不能任意分割。

相生相尅並不是彼此孤立的，它們是互相聯繫的。例如清濁五臟論中曾指出：“肝家有病傳于脾，木來尅土必災生；脾家有病傳于腎，土來掩水行無因；腎家有病傳于心，水來澆火救無門；心家有病傳于肺，金逢火化倒銷形；肺家有病傳于肝，金能尅木病難痊。”這就說明五行生尅制化的學說，與生理、病理和用藥都有聯繫，而且對各臟器之間的互相聯繫也有影響。

三 陰陽和五行的關係

為了容易明了起見，所以上面分別敘述了陰陽和五行。雖然

阴阳学說是說明矛盾統一的規律，而五行是說明生尅制化的規律，但是五行是由阴阳衍化而来的，例如木为阴中之阳，火为阳中之阳，土为阴中之至阴，金为阳中之阴，水为阴中之阴等，就說明了五行不能脫离开阴阳学說的范围。不过五行学說是进一步去說明动物体的內在联系，去补充阴阳学說的不足，例如“脾胃俱虛”的咳嗽，如果单用阴阳学說就不容易解釋，如果用五行学說去解釋就很恰当，因为土不生金（即脾虛而影响了肺的虛弱），所以在应用葯物时，就應該采用补土生金（母子关系）的办法来治疗（如应用厚朴、陈皮等的葯物）。这就充分說明了阴阳和五行学說的关系，特别是对于葯物的关系。

四 阴阳五行学說与葯性的关系

葯物有溫、熱、寒、涼四气（四性）。如果葯物的組成是阳多于阴，服用在动物体内运化之后，就能产生溫熱，所以称为“溫熱葯”；如果是阳少于阴，則服用在体内运化之后，就会引起寒涼，所以称为“寒涼葯”。这种区别的方法，是古人从长期用葯积累的經驗中所形成的。

依据五行、五味、五脏、五体、五荣的相生相尅法則，葯物有酸、苦、甘、辛、咸五味。例如，酸的适应是补其同一行的肝、筋、爪，而补筋就是补心、补血，而补血就是补脾、补肉。这就是按相生的法則（如木生火、火生土）来应用补葯。但是如果酸过多时，則泻其相尅的脾、肉、唇。这是按相尅的法則（如木尅土）来应用泻葯。因此，葯物又可分为补葯和泻葯。茲将补葯及泻葯的关系归納如图 5。

凡能扶助元气、改善衰弱的現象，就称为补。补葯一般分为补阳葯和补阴葯两类，如党参、肉蓯蓉等是补阳葯，天門冬、枸杞子等



图5 补药及泻药示意图

是补阴药。

凡能祛除病邪、抑制亢厉的现象，就称为泻。它包括发汗、呕吐、祛痰、利水、通下等。所以泻药有发汗药、涌吐药、化痰药、利水药、泻下药等。

补与泻是用药的基本法则之一，兹摘录五脏子母补泻法于下，以供参考。

肝虚者，枸杞子、乌梅补之，虚则补其母，肾者肝之母，以熟地、黄柏补之，如无他症熟地主之；实则白芍泻之，实则泻其子，心者肝之子，以甘草、黄连主之。

心虚者，柏子仁补之，虚则补其母，肝者心之母，以五味子补之，如无他症茯神主之；实则甘草泻之，如无他症，实则泻其子，脾者心之子，莱菔子、枳实泻之。

脾虚者，白朮、大枣之类补之，虚则补其母，心乃脾之母，以柏子仁补之；实则泻其子，肺乃脾之子，以桑白皮主之。

肺虚者，党参补之，实则桑白皮泻之，如无他症，阿胶主之；虚则补其母，脾乃肺之母，以白朮、大枣补之，肺者脾之子，肾者肺之子，以泽泻泻肾。

肾虚者，以熟地、黄柏补之，肾无实，不可泻；虚则补其母，肺为肾之母，以黄耆补之；实则泻其子，肝为肾之子，以郁金泻肝。

根据五味的适合，太过或太多虽然可以判定药物的补泻，但是没有纯酸、纯苦、纯甘、纯辛、纯咸的药物，而都是酸、苦、甘、辛、咸当中数种兼备的，所以在实际应用时需要仔细考虑。

最后还必须说明的是由于风、热、湿、寒所引起的病性不同，因而采用治疗的药物也不同，例如：

(一)由发散性而来的病症，可用有凝結性的药物；而对于由凝結性而来的病症，则可用发散性的药物，以使其和解。

(二)在风湿相搏时，若风邪的上升多于湿邪的下降时则脉浮，若风邪的上升少于湿邪的下降时则脉沉。因此，对于由上升而发生的病症，可使用下降性的药物；对于由下降而发生的病症，则可使用有上升性的药物，而使病症和解。

和药可区分为和阳药及和阴药。凡能使由发散、上升、动性而发生的病症和解的药，就称为和阳药；凡能使由下降、静性、凝結性而发生的病症和解的药，就称为和阴药。

药物虽然可分为温热药和寒凉药、补药和泻药、和药等三类，

但是一种藥物不仅只是一个藥性时，則要分別其中的輕重，才能很好地运用藥物来防治疾病。例如桂枝是溫藥(阳性藥)，有发散性(发表)，可以促进发汗(瀉藥)，并且由于发散性又可用以和解寒症的凝結性(和藥)，所以在表可以促进发汗，在里可用以和解阴邪的凝結性。这就是依据上述的理論来应用的。

第二节 四診八証与藥物的关系

四診就是望診、聞診、問診和切診(包括触診)。

八証就是寒証、热証、虛証、实証、表証、里証、邪証和正証。

所謂“証”就是以四診的方法而获得的对患畜全身症候群的認識。所以“診”与“証”有密切的关系，因此合并来叙述。

由于中兽医把各种家畜看作是一个完整而統一的整体，所以在診斷上特別重視全面地檢查病畜。例如“元亨疗馬集”的脉色論說：“察病而有巧者，望、聞、問、切也。凡察兽病，先以色脉为主，再令相其行步，听其喘息，觀其肥瘦，察其虛实，穷飲喂之多寡，究谷料之有无，然后定夺其阴阳之病。”这就概括地叙述和归納了中兽医的診斷特点，不但要考查脉色，而且要注意觀察其行步、喘息、肥瘦、虛实、飲喂、谷料等各方面的情况，以便辨証施治和辨証用藥。所以說，“四診”是辨証施治和辨証用藥的基础。通过四診的綜合，可以推断疾病的本質，以确定适当的治疗。

根据八証的性質和互相演变的情况，可以归納为“阴”和“阳”两大綱。即病之寒者为阴，病之热者为阳；体力虛者为阴，体力实者为阳；病在里者为阴，病在表者为阳。

根据阴和阳两大綱，把証分为寒、热、虛、实、表、里、邪、正等八

証。茲分述其与藥物的关系如下：

(一)寒証 是阴胜阳衰的表现。“元亨疗馬集”論寒証的主要症状是“鼻脉沉迟、按之无力、耳鼻俱冷、口色青黄、前蹄抱地、迴头觀腹、渾身发颤、腹內如雷、不时起臥”等。这时应该采用辛温类的藥物，以葱酒灌之。但寒証若是屬於阴盛时，应以辛甘温热的祛寒藥为主；若是屬於阳虚时，应使用辛甘咸温的助阳藥。

(二)热証 是阳胜阴衰的表现。主要症状是：精神短少，耳搭头低，脉行洪数，唇舌鮮紅，四肢倦怠，行走如痴，忽然起臥等。这时应该用清热苦味藥灌之。但若屬於阳盛时，应以苦寒的清热藥为主；若是屬於阴虚时，則应使用甘苦咸寒的养阴藥。

(三)虚証 就是劳伤之証，或在久病、大病、大泻、大汗、大出血后的虚弱症。其主要症状是：毛焦肱吊，精神不振，把前把后，抽搐难行，鼻流濃涕，咳嗽連声，四肢虚肿，耳搭头低，脉行迟細，口色无光等。这时宜用补养类的藥物来进行治疗；如屬於气虚血虚而有寒时，則应采用甘温的补气、补血藥。

(四)实証 就是結实之証。其一般症状是：脉行有力，舌色紅絳，但以其結实的部位不同，其症状的表现亦不同，例如結在腸胃，則呈現呼吸促迫，痛苦不安，时时呻吟，前肢刨地，左右滾轉，呈仰臥姿勢，口咬胸臆，回头看腹等症状。这时的治疗方法应以除去原因为主，即根据不同的病因而分別治疗，例如先攻其里或先治其外，但一般都采用泻法，所謂“实则泻之”。

(五)表証 就是一身之外或六腑之証。其主要症状是：在头即重，在眼即昏，在鼻即塞，在耳即聾，在喉即閉，在筋即攣，在骨即痛，在肤即生疮疥，在脾胃即脫肛。但一般呈現不食水草、脉浮、口色鮮紅或赤紫、口內流涎、鼻流涕、有汗无汗等症状。此时，如屬於

因感受风寒外邪而引起的表症,应该采用辛温(热)的解表药;如属于因感受风热所引起的表症,就应该采用辛凉的解表药。

(六)里証 就是一身之内或五脏之証。其症状是:精神恍惚,喘粗鼻咋,毛焦眼赤,臥多立少,鼻脉洪数,水草少进,粪便燥結,小便不利,耳及四肢厥冷等。这时应该按病因的不同而分别治疗。对于急病应治其标,对于緩病应治其本,或先攻其里,或先治其外,总之,应该辨証下药。

(七)邪証 邪是不正常,有所偏,太过或不及的意思。是家畜真元散乱,邪疫相侵之証。其主要症状是:精神恍惚,脉行洪数或迟細,出汗,渾身肉顫,头頸歪斜,呼吸促迫,站立痴呆,东西乱撞,眼急惊狂等。这时如属于热邪则休令发汗,应采用和血順气药或安神鎮惊药(安神定心药);如属于湿邪,可以采用发表药来进行治疗。

(八)正証 是邪証的相对表现,也就是生理的健康状态。但有时也可以理解为欲使动物体内部机能求得平衡,必須有合理的飼养管理和防疫的措施。

以上簡述了四診、八証的概念和运用药物的关系。但四診还必须注意到病因,如内因(飢、飽、劳役等)、外因(风、寒、暑、湿、燥、火等)及不内外因(外伤)等各方面的問題,以及阴阳五行学說的关系,否則就不能得出“証的类型”(辨証)的結論,也就不能正确地运用药物(辨証用药)来进行治疗和作出預防措施。这也說明了中医、中藥是一个整体,是不能任意分割的。特别是在辨証和运用药物时,能把周圍环境和条件(如四季的变化,寒暑变异对疾病的影响等等)以及內在的矛盾变化互相結合起来进行分析和归納,所以說,辨証和用药是从整体观点出发的。

第三节 中药与辨证施治的关系

“辨证施治”是中兽医治疗疾病的重要法则。即从诊断中辨别不同性质的症候群,根据症候群的特点,采取不同的治疗方法,以及预防措施。“急则治其标,缓则治其本”,就是辨证施治在具体应用上的原则。

关于“标”和“本”的区别问题,一般是以外为标,内为本;气为标,血为本;阳为标,阴为本;六腑为标,五脏为本;先发病为本,后转变为标。而在用药治疗先后次序上,根据“灵枢”病本的记载是:“先病而后逆者,治其本;先逆而后病者,治其本。先寒而后生病者,治其本;先病而后生寒者,治其本。先热而后生病者,治其本;先热而后生中满者,治其标。先病而后泻者,治其本;先泻而后生他病者,治其本,必且调之,乃治其他病。先病而后生中满者,治其标;先中满而后烦心者,治其本。人有客气,有同气。小大不利,治其标;小大利,治其本。病发而有余,本而标之,先治其本,后治其标。病发而不足,标而本之,先治其标,后治其本。谨详察间甚,以意调之;间者并行,甚者独行。先大小便不利而后生他病者,治其本也。”

上述分辨疾病的标本,就是要找出当时病症中的主要矛盾点和次要矛盾点,并且着重于先解决当时的主要矛盾方面,以便逐步而彻底地把疾病治愈。

在用药治疗的方法上“素问”至真要大论说:“寒者热之,热者寒之,温者清之,清者温之,散者收之,抑者散之,燥者润之,急者缓之,坚者软之,脆者坚之,衰者补之,强者泻之,各安其气,必清必

靜，則病氣衰去，歸其所宗，此治之大體也。”

此外，中兽医在临床上作为用藥治疗手段的八法，茲簡述如下，以供辨証施治的参考：

(一)汗法 就是用发汗的方法作为用藥治疗的手段。临床上常适用于表証的发热无汗者。其禁忌为：

1. 病不在表者不可汗；
2. 身体虛弱或脉微弱者不可汗；
3. 亡津液者(脫水者)不可汗。

根据病症的不同，汗法也可灵活运用，如阳虛者用补中发汗法，阴虛者用养阴发汗法，帶热者用清凉发汗法，帶寒者用溫經发汗法，伤食者用消导发汗法。

(二)和法 含有和解病畜体内毒物的意思。根据病情不同，和法有消而和者，有补而和者，有燥而和者，有潤而和者，有兼表而和者，有兼攻而和者。

(三)泻法(下法) 就是要达到导滯的目的。临床上多用于里实症，如大便燥結。其禁忌为：

1. 病不在里者不可泻；
2. 病在胃而有上逆趋势者不可泻；
3. 病虛者不可泻。

泻法也根据病情的不同而有变异，如潤泻法(即潤便藥)、緩泻法、峻泻法、先补后泻法、先泻后补法及攻补并用法等。

(四)消法 就是开导、消散、去积聚的方法。一般是采取消肿敗毒，以达到消散为目的。消法分初、中、末三法，早期宜先消而后和，中期宜消补并用，末期宜补多而消少，对于热实者宜多消少补，虛寒者应多补少消。

(五)吐法 多用于猪、犬、猫等动物誤食毒物,以便排除病因。但对于虚弱者及病在表者不可用此法。

(六)清法 相当于解热法,临床上常用于热症。其属于实热者则用清热药,属于虚热时则用滋阴药。

(七)温法 就是指兴奋动物体的各部机能而言。临床上常用于虚寒症,对于五劳七伤、虚脱等症,也可应用。

(八)补法 临床上常用于虚症,以补充养分和兴奋动物体的各部机能。根据病症的不同,补法也不同,在一般情况,补法常与温法并用,并且特别重视在健脾开胃方面。

以上汗、和、泻、消、吐、清、温、补等八法的运用,是与辨证施治的原则统一的。我们了解这些方法后,对于药物的应用,是有重要的意义。

第四节 中药的性能与归经

在辨证用药方面,我们古代医药学家在实践中根据阴阳五行学说,总结了四气、五味、升降浮沉以及归经等的基本理论。这些理论是指导辨证用药的基础,所以比较重要,现分为中药的性能和归经两方面来叙述。

一 中药的性能

所谓“药性”,就是研究药物的药理作用;所谓“能”,就是研究药物的功能,它包括药物的功用和主治。

药物的性能,是根据药物作用于动物体所发生的反应而得出的结论,也就是从动物产生疗效上所做出的归纳。它主要是解决

动物体的生理机能和病因的矛盾斗争,使之统一与平衡,这种补偏救弊的作用,主要是辅助正常的生理机能去消灭病因,从而达到平衡和恢复正常。

研究中藥,必須对藥物的性能有所理解,否則在辨証用藥时,对于藥物选择、处方配伍,就无法进行。

中藥的性能和辨証施治有着密切的关系,但有时为了發揮藥的性能而又必須照顧到藥性和証的矛盾,所以又用炮制法来調整藥性,使它能适应治疗的需要。此外,藥的性能和藥物的产地、采集、藥用部分、貯藏等都有关系,所以在研究藥物的性能时,应联系前面各章的内容,才能全面了解。

中藥的性能包括四气、五味、升降浮沉等三方面,現分述于下:

(一)四气

四气又称四性,主要是指寒、热(大温)、温、凉(微寒)等四种不同的藥性。此外尚有平性藥。根据“珍珠囊补遺藥性賦”的記載,常用的寒性藥有 66 种,热性藥有 60 种,温性藥有 54 种,平性藥有 68 种,共計 248 种。

四气主要是根据藥物作用于动物体后所产生的治疗效果而获得的归納。例如能治疗热証的藥物,就称为寒性藥和凉性藥;能治疗寒証的藥物,就称为热性藥和温性藥。寒性和热性是相反的两个方面。凉性比寒性偏于温,即仅次于寒;而温性比热性偏于凉,即仅次于热。此外,还有一些藥物的藥性介乎寒、凉和温、热之間,所以称为平性藥。

平性藥并不是不偏不倚的藥性,實質上仍有略偏于温或略偏于凉的不同,所以一般略去平性藥,仍称为四气。

热性和温性藥是屬於阳性藥,大都有祛寒、助阳的功用,而寒

性药和凉性药是属于阴性药,大都具有清热、泻火的功用。兹列表说明于下:

表 8 四气属性和作用归纳简表

属性	四 气	作 用	药 物 举 例
阴	寒性药 凉性药	清热作用,泻火作用	如黄芩、黄连等 如柴胡、桑叶等
	平性药	有调缓寒、热、温、凉作用	如甘草、大枣等
阳	温性药 热性药	祛寒作用,助阳作用	如防风、独活等 如干姜、肉桂等

按照中兽医的理论来说,动物体有病,主要是由于失去阴阳的平衡,也就是偏胜偏衰的结果。例如“素问”说:“阴胜则阳病,阳胜则阴病,阳胜则热,阴胜则寒。”又说“阴虚生内热,阳虚生外寒。”由于药物有偏胜之气,所以治疗的目的是要利用药物的偏胜之气来纠正或调和病畜的偏胜或偏衰,也就是以偏纠偏,扶正祛邪,使之归于不偏,恢复生理的正常状态。所以“素问”说:“寒者热之,热者寒之”,“调其气使平也”。这种“寒用热药,热用凉药,湿用燥药,燥用润药”的用药方法,可以说明利用药性的偏,来治疗病症的道理。

因此,用药治病,必须了解四气,辨别阴阳,才不致用错了药,造成不应有的损失。

(二)五味

五味就是辛、酸、甘、苦、咸。这是古人在长期生活实践中通过味觉而辨别了药物具有各种的味,并且具有各种不同的性能。例如“素问”说:“辛散,酸收,甘缓,苦坚,咸软。”又说:“辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,咸味涌泄为阴,淡味渗泄为阳,六者或收或散,或缓或急,或燥或润,或软或坚。”“阳为气,阴为味;味厚者为阴,

薄者为阴之阳；气厚者为阳，薄者为阳之阴；味厚则泄，薄则通；气薄则发泄，气厚则发热。”“形不足者温之以气，精不足者补之以味。”“肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸收之。”“风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以辛散之。”这便是对药物的阴阳属性和药性的归纳。以后清代吴仪洛著的“本草从新”又进一步补充说：“凡酸者能澹能收，苦者能泻能燥能坚，甘者能补能和能缓，辛者能散能润能横行，咸者能下能软坚，淡者能利窍能渗泄。”这都说明了五味具有不同的作用；而其中的淡味，因为它的味不显著，本草书中有时与甘味并称，所以仍然称为五味。

根据以上的归纳，说明了辛味的药物有发汗、理气、散结等作用，酸味的药物有收敛、固澹等作用，甘味的药物有缓和、调补等作用，苦味的药物有燥湿、泄降等作用，咸味的药物有软坚、润下等作用。兹归纳如下表：

表9 五味屬性和作用归纳簡表

屬性	五 味	作 用	藥 物 舉 例
阴	酸 味	收敛、固澹作用	如烏梅、酸枣仁等
	苦 味	燥湿、泄降作用	如大黃、黃連等
	咸 味	軟坚、潤下作用	如牡蠣、朴硝等
阳	辛 味	发汗、理气、散結作用	如桂枝、細辛等
	甘 味	緩和、調补作用	如大棗、蜂蜜、甘草等
	淡 味	滲泄、利窍作用	如茯苓、通草等

五味还可以用五行来配合，例如“內經素問”說：“五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，甘入脾，咸入腎。”又說：“木生酸，火生苦，土生甘，金生辛，水生咸。”“酸生肝，苦生心，甘生脾，辛生肺，咸生腎。”“酸味益筋，如辛胜酸，即肺胜肝，为金剋木；苦益血，如咸胜

苦,即肾胜心,为水尅火;甘益肉,为酸胜甘,即肝胜脾,为木尅土;辛益皮毛,如苦胜辛,即心胜肺,为火尅金;咸益骨,如甘胜咸,即脾胜肾,为土尅水。”这就说明了五味与五脏以及与五行相生相尅的关系。此外,五脏与五色也有密切的关系。例如:青属木入肝,赤属火入心,黄属土入脾,白属金入肺,黑属水入肾。这就是五脏与五色的关系,兹说明如下图:



图 6 五味、五脏与五色的关系示意图

从上图可以了解五味相尅对动物体的生理营养和病症用药的关系。如果五味太过或不及,不但对病症会引起不良的后果,而且会损害动物体。例如酸味对筋是有益的,但如辛味太过,那就会引起金(肺)尅木(肝)而伤害了筋;相反,如果辛味不及,就会引起肺部的疾病。这种偏胜偏衰的性能,就可以用来治疗疾病。例如辛味药可以散肺气之郁;甘味药可以补脾胃之虚,就是运用它的味来

治疗疾病的。

(三)升降浮沉

升降浮沉,是指葯物作用的方向來說,升向前上方,降向后下方,浮向上方、向外方,沉向后下方、向內方。因此可以說,升就是提升,降就是降逆,浮就是上行发散,沉就是后行泄利。

如以治疗作用來說,升有涌吐和治疗久泻、脱肛等气虚下陷症的功用,降有平喘、下泻、止嘔等功用,适用于肝阳上逆症,浮有发散、解肌等功用,沉有斂汗、鎮肝等功用。总之,凡屬升浮的葯物,大都有发汗、涌吐、升阳等作用;凡屬於沉降的葯物,大部分有降气、平喘、斂汗、下泻等作用。

升降浮沉和葯物的气味及性状有密切的关系。例如“內經”上說:“阴味出下窍,阳气出上窍;味厚者为阴,薄为阴之阳,气厚者为阳,薄者为阳之阴;味厚則泄,薄則通,气薄則发泄,厚則发热。”又如李东垣說:“气薄者升,味薄者降;气厚者浮,味厚者沉。”又李时珍說:“酸、咸无升,甘、辛无降,寒无浮,热无沉。”这都說明了葯物与气味的关系。

清代吳仪洛著的“本草从新”上說:“凡質之輕者上入心肺,重者下入肝腎,中空者发表,內实者攻里,为枝者达四肢,为皮者达皮肤,为心为干者內行脏腑,枯燥者入气分,潤澤者入血分。”又說:“凡輕虛者浮而升,重实者沉而降。”这都說明了葯物的性状与升降浮沉是有关系的。

其次,葯物的生熟和葯用部分也与升降浮沉有关。例如“生用則主升,熟用則主降,是根則主升,是梢則主降,是花、叶則主浮,是根、果实則主沉。”又如“諸花皆升,旋复独降”等。

最后还必须說明的是葯物的炮制与升降浮沉有关,例如酒制

能升,盐炒能降,姜制发散,姜炒能减药的寒性,童便制除劣性而降下,醋制可以增加药物的敛性。而桔梗能载诸药上浮,牛膝可引诸药下降等。

兹将气味、性状、生熟、炮制等与升降浮沉的关系归纳如下表:

表 10 中药的气味、性状等与升降浮沉的关系归纳表

属性	气 味	性 状	生 熟	炮 制	升降浮沉	作 用
阳	气薄(甘温)	质轻而空心的根茎	生用的根	酒 制	升	发汗、升阳
	气厚(辛热)	质轻的根茎及皮	花、 叶	姜 制	浮	散寒、温里
阴	味薄(酸咸)	质重而内实的根茎	熟用或梢	盐 炒	降	通降、下行
	味厚(苦寒)	质重的根心及茎	根、果实	童便制	沉	清热、泻火

从上表的归纳可以看出,升降浮沉是随药物的气味而变化的,而在辨证用药时,也很重要,因为证有表、里的不同,而运用药物亦有差异。例如实证、结症,就不宜用升浮的药物,而宜用大黄、朴硝等沉降的药物以攻下;如肝经风热上传于眼而引起眼病时,则不宜用升浮的药物,而应运用黄芩、柴胡以降火;如冷肠溲泻或脱肛,则宜用升不宜降,如应用升麻、柴胡等以升阳;又如表证采用沉降药,则势必归里,就会造成不良的后果。因此,在研究中药时,必须掌握升降浮沉的运用规律。

(四)四气、五味与升降浮沉的关系

每一种药物,都有自己的气和味。有的气同而味不同,例如生姜为辛温,厚朴为苦辛温;有的气异而味同,例如石膏为甘辛寒,半夏为辛温;有的气同而有数味,例如生地黄味甘苦而性寒,郁金味苦辛甘而性寒。而气味对于升降浮沉又有主要的影响,例如气薄的黄耆(甘温)主升,气厚的黑附子(辛甘热)则主浮;味薄的乌梅(酸温)主降,味厚的生地黄(甘苦)则主沉,味甘的厚朴(苦辛

温)則可升可降。因此,由于四气五味的綜合变化,而能使藥物有多种多样的作用。各种藥物性能既有相同之处,也有不同之点,这是應該注意的。茲将藥物的阴阳、气味与藥性(指升、降、浮、沉)的关系,列表說明于下:

表 11 中药的阴阳、气味与藥性的关系簡表

阳	祛寒.....	热	气	寒:.....	清热	阴
	助阳.....	温		凉:.....	泻火、养阴	
	发汗、理气、散結:散.....	辛	味	酸.....	收:收斂、固澀	
	緩和、調补.....	緩·甘		苦.....	坚:燥湿、泄降	
	渗泄、利竅.....	渗·淡	性	咸.....	軟:軟坚、潤下	
	发汗、升阳.....	升		降:.....	通降、下行	
	散寒、溫里.....	浮		沉:.....	清热、泻火	

以上仅是叙述了单味藥的性能,而中兽医在辨証应用上,往往是使用复方。因此,藥物的气味和升降浮沉,并不是固定不变的,而是可以互相影响和变化的。例如凉性藥在多数的温性藥中,就可以轉变为温性藥的作用;升浮藥在大多数的沉降藥中,就可以隨着下降。这是應該加以重視的。

二 藥物的归經

在前面第二、第三节中,我們已經初步了解到辨証施治与辨証用藥的一些原則与藥物的关系,而在本节中,又了解到由于藥物的气、味、色与性的不同,其作用也不尽相同。这就說明了各种藥物,都有其主要的应用范围。在同一热証中或同一寒証中,由于病的脏腑不同,所用的藥物也有差异。例如对肝脏的热症,应用石膏、葛根来治疗就不一定有效;而脾胃的热症,采用石膏、葛根来治疗

就比较恰当。

为了进一步说明各药的主要应用范围，古人就根据阴阳五行学说将药物的气、味、色与五脏、六腑、十二经脉的关系结合起来，创造了归经学说，来说明某药对某些脏腑经络的病症，起着主要的作用。这就是药物归经的意义。

由于归经学说与五脏六腑、十二经脉有密切的关系，所以这里首先叙述有关脏腑及经脉的一些内容。

五脏，就是指心、肝、脾、肺、肾；六腑，就是指胃、胆、膀胱、大肠、小肠和三焦。脏是隐藏精神的意思，古人认为是动物体的主宰。例如“司牧安骥集”说：“心为五脏第一尊，血脉皮肤并骨节，关连心脏得安宁，肝能藏魂肺隐魄，心内藏神肾隐精，脾即脏中生血气，五神总不离身形。”腑是收容、堆聚、传送草料的单位，主要起到供应的作用。例如王良先师天地五脏论中说：“心为帝主，肺为丞相，肝为尚书，脾为大夫，肾为烈女。”这是说明五脏的重要性。又说：“胆为清净之腑，大肠为传送之腑，胃为草谷之腑，小肠为受盛之腑，膀胱为津液之腑，三焦为中之腑，”这就说明六腑的主要功能。

此外，另有一个心包络，它是心的外卫，是与五脏相提并论的。其他如脑、髓、骨、脉、胞宫等，属于“奇恒之府”，为具有特殊作用的脏器。

十二经脉就是五脏六腑之外又加上心包络，所以也称为六脏六腑。如果包括任督二脉，就称为十四经。

“经”有“径”的意思，是指直行的经，象径路的无所不通。“络”有“网”的意思，象网罗的错综联系。经脉的脉字，含有支分派别的意义。十二经脉是经络学说的重要部分，它的分类与命名法，可以归纳如下表：

表 12 十二經脉分类与命名法簡表

阴 經			阳 經		
四肢內側	三 阴	脏	腑	三 阳	四肢外側
前 肢	太 阴	肺	大腸	阳 明	前 肢
后 肢		脾	胃		后 肢
前 肢	少 阴	心	小腸	太 阳	前 肢
后 肢		腎	膀胱		后 肢
前 肢	厥 阴	心包絡	三焦	少 阳	前 肢
后 肢		肝	胆		后 肢

从上表可以知道,三阴經为太阴、少阴、厥阴,三阳經为阳明、太阳、少阳,这就說明了前肢和后肢各有三經,再結合脏腑的名称,而成为十二經脉:前肢太阴肺經,前肢少阴心經,前肢厥阴心包經,前肢阳明大腸經,前肢太阳小腸經,前肢少阳三焦經,后肢太阴脾經,后肢少阴腎經,后肢厥阴肝經,后肢阳明胃經,后肢太阳膀胱經,后肢少阳胆經等十二經脉。

任督二脉是阴阳两大綱,統轄着十二經。督脉是“阳脉之海”,統轄三阳脉;任脉是“阴脉之海”,統轄三阴脉。

經絡是动物体自然存在的功能,这种功能,以十二脏腑为领导,将周身各部,通达表里,貫徹上下,建立了各有所屬的系統,并与外界环境相适应,密切联系成为动物体的整体。它的作用不仅說明在正常情况下的生理活动,以及发生病变时所反映出来一系列症状,同时对于診斷与治疗也具有特殊的参考价值。“难經”二十三难說:“經脉者,行血气,通阴阳以榮于身者也。”这就說明了經絡是內脏与体表的连接通路,同时也是气血运行之道。

由于病症与十二經脉的循行部位有直接或間接的关系,由于內服葯物須由經絡的傳导轉輸才能作用于脏腑和体表的病症,所

以在辨証用藥上,必須掌握藥物的归經法則,才能准确地按經选藥来进行治疗。

藥物的归經主要是以五味、五色和五行所屬,来联系五脏六腑的十二經脉,例如“素問”至真要大論說:“酸屬木,苦屬火,甘屬土,辛屬金,咸屬水。”又說:“酸先入肝,苦先入心,甘先入脾,辛先入肺,咸先入腎。”此外,又有五色入五脏的学說,例如:“青屬木入肝,赤屬火入心,黃屬土入脾,白屬金入肺,黑屬水入腎”(参考本节論五味項下)。此外,藥味酸气燥者,皆入于肝与胆;味苦气焦者,皆入于心与小腸;味甘气香者,皆入于脾与胃;味辛气腥者,皆入于肺与大腸;味咸气腐者,皆入于腎与膀胱。其藥之气味入于肝者,并入于心包絡;其藥之气味入于胆者,并入于三焦。

因此,色、味配合五行可以归納如下表:

表 13 中藥的色、味、五行与归經的关系簡表

藥 物 的 色 味	青 酸	木	后肢厥阴——肝	归 經
			后肢少阳——胆	
	赤 苦	火	前肢少阳——三焦	
			前肢厥阴——心包絡	
		君火	前肢少阴——心	
			前肢太阳——小腸	
	黃 甘	土	后肢太阴——脾	
			后肢阳明——胃	
	白 辛	金	前肢太阴——肺	
			前肢阳明——大腸	
	黑 咸	水	后肢少阴——腎	
			后肢太阳——膀胱	

上表的虛綫，是表示前肢厥阴心包絡經是与后肢厥阴肝經相通，前肢少阳三焦，是与后肢少阳胆經相通。同时，由于心包絡、三焦同司相火，所以入后肢厥阴肝經和入前肢少阴心經的葯物，亦可入前肢厥阴心包絡；入后肢少阳胆經和前肢太阳小腸經的葯物，亦可入前肢少阳三焦經。因此，肝、胆、三焦、心包絡、心、小腸等六經的关系比較密切，在应用葯物时必须特別注意。

在具体运用上，首先是辨別病畜是屬於那些証(指八証)，其次是辨別屬於那些經(指經脉)的病，最后是根据經絡所表現的症狀来選擇葯物。例如馬患冷痛时，首先辨別它是屬於寒証，其次是診斷为屬於前肢太阳小腸經的病，最后就可以选用辛温入心、肝、脾、肺、大腸經的这类葯物如川芎、白芷、細辛、陈皮、当归等来进行治疗。因为小腸屬於心而且可以伤肺，而肺和大腸相表里，入心的葯物也可以作用于小腸經，所以就可运用上述的葯物来治疗。“元亨疗馬集”在伤水起臥病中所說的“小腸屬心，通于舌，舌下赤者伤心、小腸，如白者伤肺，肺伤冷，大腸乃不和，故发起臥也”，就是这个意思。

此外，在“元亨疗馬集”中尚有引經和泻火葯的記載，这对运用葯物归經是有帮助的，茲分別簡介于下：

(一)引經葯 引經葯就是說明某些葯物不但可以入某經，而且可以作为其他葯物的引导，因此可以作为用葯时的参考。茲列表說明如下：

表 14 中葯引經归納簡表

脏 腑 經 絡 区 分	引 經 葯
少阴心經、少阴腎經	独活、官桂
太阴肺經	白芷、藜白

(續)

脏 腑 經 絡 区 分	引 經 药
太阴脾經、阳明胃經	竹根、白芷、升麻
少阳三焦經、少阳胆經、厥阴肝經、厥阴心包經	柴胡
太阳小腸經、太阳膀胱經、阳明大腸經	藁本、羌活

(二) 泻火药 泻火药主要是指清热降火的药物，兹列表说明于下：

表 15 泻火药与經絡关系簡表

脏 腑 經 絡 区 分	泻 火 药	备 考
少阴心經、太阳小腸經、厥阴心包經、少阳三焦經	黃連	可包括肝、胆、脾、胃及大腸
少阴腎經	知母	酒炒、降阴火
太阴肺經	山梔子、黃芩	
太阴脾經	白芍	
阳明大腸經	黃芩	
太阳膀胱經	黃柏	酒炒、降阴火
厥阴肝經及少阳胆經	柴胡、黃芩	

第四章

中藥的方劑及配伍

凡能將藥物加以適當的配合，使其起到綜合作用與調和藥物的偏性，以適應臨床應用的需要，就稱為方劑。

凡藥物配合後能达到提高療效、減弱毒性的目的，就稱為配伍。

兽医最早的方劑見于漢代的“流沙墜簡”和“居延漢簡”所載的兽医方，在漢以前的方劑已散佚。

方劑是用藥物治病進一步發展的產物。它是通過辨証而後施治的最好形式，所以是臨床診療上的重要工具之一，應該加以重視。

方劑並不是一病一方，而是遇到病情有了變化，就要隨時把藥方中的組成藥物與劑量加以增刪，以適應患畜的需要，這不僅要考慮到藥物的功用及主治，同時也照顧到配伍禁忌。因此，在運用上是具有一定靈活性的，是合乎整體觀點的。

第一節 方劑的組成及種類

一 方劑的組成

凡屬於兩味藥物以上所組成的藥方，稱為復方；而單味使用

的,称为单方。方剂的組成是有一定的法則的,例如“內經“素問上說:“主病之謂君,佐君之謂臣,应臣之謂使。”李东垣說:“为君者量最多,为臣者次之,佐者又次之。”由此可見,方剂的組成是以君臣佐使为基础的,而且剂量亦有所区别。

所謂君药,就是针对病症起主要作用的主药;所謂臣药,就是能够协助或加强主药功效的药物;至于佐药,就是能够协助主药解除某些次要症状,或者能够对主药起监制作用的药物,所以适用于兼症較多的病症,或者适用于主药有毒或性質太偏的主药;而所謂使药,就是能治疗兼症的某些次要药物,或是能引导药效到达病所的引經药(包括协和药及助溶药)。茲举例說明于下:

例一 半夏散(元亨疗馬集)

半夏散的組成	{	君——半夏(燥湿、化痰、止嘔)
		臣——升麻(散风、升阳)
		佐——防风(祛风、胜湿)
		使——枯矾(斂腸)

上述方剂中的半夏因为起着主要的作用,所以是君药;而升麻因为能够加强君药的功用,所以是臣药;由于防风能够协助君药解除某些次要症状,所以是佐药;又枯矾有斂腸的作用,是治疗兼症的次要药物,所以是使药。至于原方中的蕎麦面、蜂蜜、生姜、酸漿水等,都是引药。

例二 橘皮散(元亨疗馬集)

橘皮散的組成	{	君——青皮、陈皮(理气、温中)
		臣——桂心、茴香、枳椇(除痼冷、破积、下气)
		佐——厚朴、当归(散满、和血)
		使——細辛、白芷(行水气、散寒)

上方說明了君臣佐使藥并不是限于一味藥,而是根据辨証,针对主要病症,可以开写多种多样的藥物。至于原方中的葱、飞盐、苦酒等,都是引藥。

例三 消毒散(元亨疗馬集)

消毒散的組成

{	食盐(炒)	君——涌吐痰涎
		使——引經藥
	白矾(飞)	臣——涌吐痰涎
		佐——燥湿清喉

上方說明了君臣佐使并不限于四味藥物或四味以上的藥物,即是两味藥物,也同样可以具有君臣佐使的意义。

例四 擦疥藥(山西)

擦疥藥的組成

{	硫黃	君——杀虫
		雄黃 {
	雄黃 {	
		猪油

上述方劑說明了虽然是三味藥,但同样具有君臣佐使的意义。

例五 百部散(安驢藥方)

方 名	藥物劑量及功用	組 成					
		君	臣	佐		使	
百部散	藥 物	枇杷叶 去 毛	百 部	青 皮	厚 朴	葱 白	酒
	劑 量	四 兩	三 兩	二 兩	一 兩	一 根	半 盞
	功 用	降气化痰	溫肺止咳	降逆气	破滯气	散 寒	引藥上行

上方說明了君藥的用量較多、臣藥較少、佐藥及使藥最少的君臣佐使的配合形式,但这应根据症狀的不同,随症加減劑量。

总之,凡两味藥以上的方劑,都是按其功用及劑量,而以君臣

佐使的原則来配合的。关于方剂中药味的多少，一般是沒有限制的，但应以病症緩急专杂为轉移。例如对于急症的药味应从簡，对于緩症則可以多些；症状专一的可以从簡，症状較复杂的可以多些。如果采用古方或驗方、秘方，应该在症状完全符合时才可以应用，否則应随症加減其药味或药量，或把数方相合而加減应用，以便切合病情，提高疗效。

关于“元亨疗馬集”記載的“君臣佐使用药須知”、“和血、理气药”及“引药必用”的药物，現在列表說明于下，以供临床上的参考。

表 16 君臣佐使用药須知归納簡表

主 治	君 臣	佐	使	引
治 阴 火	知母、黄柏 (酒炒)	木 香		
退三焦火	黄 耆	茵陈、黄連	柴胡、黄芩	升 麻
煩渴貪水	人 参	白茯苓、蘆根	烏梅、葛根	
調 諸 气	木 香	紫苏子、当归	枳壳、青皮	
緩 腰 腎	茴 香	杜仲、巴戟天、补 骨脂	川棟子、胡蘆巴	官 桂
心 气 黃	砂 砂	黃連、人參、远志	茯神	独 活
腹 痛	陈 皮	厚朴、当归	細辛、白芷、枳殼、枳壳	
腔 嗽	款 冬 花	知母、貝母	馬兜鈴、桑白皮	鷄子清
喘 甚	葶 藶 子	天門冬、麦門冬	山梔子、黄芩	
美 水 草	当 归	黄药子、白药子	陈皮、白芍	
化 谷 草	山 楂	神麴、麦芽	枳壳、陈皮	
通 腸	續 隨 子	酥油、通草	大黃、朴硝	
健 脾 胃	厚 朴	砂仁、白朮	甘草、陈皮	
泻 肝 火	黄 連	黄芩、石膏	青葙子、石决明、草决明	
久泻不止	肉 豆 蔻	猪苓、澤泻	牵牛、防己、陈皮	
胞 轉	茵 陈	知母、黄柏(酒炒)	澤泻、灯芯草、滑石、木通	

(續)

主 治	君 臣	佐	使	引
鼻膿不止	大 黃	秦艽、百合	知母、馬兜鈴、山藥、枇杷叶	
化 痰	半夏(姜制)	南星(火炮)	升麻、桔梗、白朮(飛)	
勞 傷	益智仁、熟地		當歸、白茯苓(兼為臣)	
諸風解表	川烏頭、附子(兼為佐)		羌活、獨活、天麻、全蠍(兼為臣)	
洗肝明目	青 葙 子(兼為佐)		石決明、菊花(兼為臣)	

表 17 和血、理氣用藥歸納簡表

主 治	君 藥	主 治	君 藥	主 治	君 藥
活 血	當 歸	補 血	川 芎	破 滯 氣	枳 壳、青 皮
止 血	當歸首(頭)	調 血	延 胡 索	調 郁 氣	木 香
養 血	當 歸 身	逐 血	紅 花	正 氣	藿 香
行 血	當 歸 尾	化 血	蒲 黃	降 氣	沉 香
和 血	當 歸 全	順 氣	烏 藥		
破 血	桃 仁	補 元 氣	人 參		

表 18 引藥必用歸納簡表

功 用	引 藥	功 用	引 藥	功 用	引 藥
開胃正氣	生薑(連皮溫,去皮熱)	清心滑腸	生 油	逐胎血	百 草 霜
發 汗	青 蔥	止 腹 痛	伏 龍 肝	煨 子 宮	狗 腦
開 胃	棗 肉	瀉 心 火	綠 豆 粉	通 腸	酥 油
止 瀉	白面(炒)	宣 腸	干 柿	止 啞	鷺毛(油烹)
飲 腸	枯 朮	止 瀉	烏 梅	止 啞	人髮(油烹)
清 肝	猪 胆	通 腸	雞 鷄	消 腹 脹	鷓 鴒 糞
清心、養肺	蜜 蜂	通 腸	生 鮓 魚	消 脹	米 醋
引 經	食鹽(飛)	添 腰	猪 肋 肉	止 瀉	蕎 麥 面

(續)

功 用	引 药	功 用	引 药	功 用	引 药
和 血	紅 花	养 肺	砂 糖	排 痛	黄 蜡
清 心	鷄 子 清	明 目	白 羊 肝	消 肚 腹 脹	臭 椿 根
潤 腸	熟 猪 脂	下 瘀 血	紅 花 (炒)	打 痰 (瘦) 虫	陈 倉 麦
潤 肺	生 猪 脂	补 肺	胡 桃 仁	疗 风	生 芎 子 灰 (存性)
通 腸	朴 硝	化 谷	生 蘿 卜	利 小 水	青 苔

二 方剂的种类

关于方剂配合的形式,在“內經素問”上有七方的記載;以后北齐徐之才^[注],則分为十剂,明代張景岳又分为八陣,清代汪昂又进一步分为二十一剂。现在分述如下:

(一)七方 是根据用药的种类多少而分为大方、小方、奇方、偶方和复方,又根据疗效的快慢不同而分为急方和緩方。

1. 大方 一般是以君药一味、臣药二味、佐药九味組成为一方;但剂量較大而頓服的,也可称为大方。适用于邪气强盛而有兼症、且病势剧烈、非大力不能克制的重症。

2. 小方 一般以君药一味、臣药二味組成为一方;但剂量較小而頻頻小服(即緩用)的,也可称为小方。适用于邪气輕淺而无兼症的輕症。

3. 緩方 一般以甘味药、气味俱薄的药、无毒性而有滋补的药或奏效慢的药物組成的方剂,称为緩方。对于虛弱久病、不能急切求效、需要长期調理时用之。

4. 急方 一般称有毒性的、气味濃厚的或以急救为目的的方

[注] 系根据“本草綱目”的記載,但也有人認為是出自唐陈藏器“本草拾遺”的。

劑為急方。對於病勢危急，須用藥力峻烈的藥物來搶救時用之。

5. 奇方 就是藥味合乎單數的方劑；但一般是指病因單純，只用一種主藥來治療的方劑，稱為奇方。

6. 偶方 就是藥味合乎雙數的方劑；但一般是指複雜的病症，須用兩種以上的主藥來治療的方劑，稱為偶方。

7. 復方 就是指由二方或三方、或更多的方劑相合應用的方劑；其中有由兩個方至數個方相合而成的套方，有由一個方劑加味而成的加方，也有將多種藥物并用而分量勻齊的雜方。適用於病症較複雜的疾病。

(二)十劑 是根據藥物的臨床療效和使用目的而作如下的分類：

1. 宣劑 宣可去壅(理氣、健脾之劑)[注]
2. 通劑 通行行滯(利水之劑)
3. 補劑 補可扶弱(補養之劑)
4. 泄劑 泄可啟閉(攻里之劑)
5. 輕劑 輕可去實(發表之劑)
6. 重劑 重可鎮怯(祛風鎮驚之劑)
7. 瀉劑 瀉可固脫(收瀉之劑)
8. 滑劑 滑可去着(消導、利水之劑)
9. 燥劑 燥可勝濕(健脾、利水、除痰之劑)
10. 濕劑 濕可潤燥(潤燥之劑)

(三)八陣 是依據辨證施治的原則來分類的，它與治療上的八法相似，茲簡介如下：

1. 補陣 適用於虛証(補養之劑)

[注] 凡括弧內所指者，系其類似之劑。

2. 和陣 适用于和解动物体的伤气(和解之剂)
3. 攻陣 适用于急症、实証(表里之剂)
4. 散陣 适用于风寒外邪的表証(发表之剂)
5. 寒陣 适用于热証(泻火之剂)
6. 热陣 适用于寒証(祛寒之剂)
7. 固陣 适用于滑泄不禁之証(收瀉之剂)
8. 因陣 即因証立方的意思(辨因之剂)

(四)二十一剂 这种分类法是綜合了“七方”、“十剂”、“八陣”的优点而加以进一步的分类。

1. 补养之剂 就是能滋补动物体阴阳气血的不足,从而消除一切衰弱症状的方剂,如七补散、益气黄耆散等。

2. 发表之剂 就是能疏散外邪、解除表証的方剂,如天麻散、防风散等。

3. 涌吐之剂 就是能引邪上越,或有涌吐功效的方剂,如吹鼻散。

4. 攻里之剂 就是能治疗結症,或能清除胃腸积滯的方剂,如九龙轉江散、續随散等。

5. 表里之剂 就是能解表又能清里、温里,以治疗内外壅实、表里俱急的方剂,如潤肺散、大黃散等。

6. 和解之剂 就是能以和解的方法来达到祛除病邪的方剂,如温脾散。

7. 理气之剂 即能疏理气机、解郁降逆的方剂,如清肺半夏散、八平散。

8. 理血之剂 即能祛除瘀血,或制止出血的方剂,如秦艽散。

9. 祛风之剂 就是能散风、熄风的方剂,如千金散。

10. 祛寒之劑 就是能補益陽氣、祛除寒邪的方劑，如桂心散。
11. 清暑之劑 就是能治療暑病的方劑，如香薷散。
12. 利濕之劑 就是能使濕邪從肌表或二便排泄的方劑，如豬苓散。
13. 潤燥之劑 就是能滋潤和清除燥邪的方劑，如止渴人參散。
14. 瀉火之劑 就是能清熱保津、除煩解渴的方劑，如濟世消黃散、四賢散等。
15. 除痰之劑 就是能促進排痰或化痰的方劑，如半夏散、貝母散等。
16. 消導之劑 就是能散積行氣、健脾和胃的方劑，如消積平胃散、神麴散等。
17. 收瀉之劑 就是能收斂、固瀉精氣及津液的方劑，如龍骨散。
18. 殺蟲之劑 就是能殺死或驅除體內寄生蟲的方劑，如青鹽散。
19. 明目之劑 就是能治療目疾的方劑，如決明散。
20. 癰瘍之劑 就是能治療一切外科病症的方劑，如消黃散。
21. 經產之劑 就是能治療母畜胎產前後病症的方劑，如補益當歸散。〔注〕

上述四種分類法，以二十一劑比較適合於臨床的應用。

第二節 方劑的配伍

要掌握开好一个良好的方剂，除必须正确运用“君臣佐使”的

〔注〕 以上所列举的方剂名称皆出自“元亨疗马集”。

組成原則外,还必須注意到方剂的配伍关系,否則就会成为有药无方,甚至耽誤病机,危害病畜,造成不应有的損失。

以下分七情合和及配伍禁忌两方面来叙述。

一 七情合和

方剂的配伍,主要是神农本草經上所說的“七情合和”。所謂七情,根据“本草經”的記載是:“药有单行者,有相須者,有相使者,有相畏者,有相恶者,有相反者,有相杀者,凡此七情,合和視之,当用相須,相使者良,勿用相恶,相反者,若有毒宜制,可用相畏,相杀者,不尔,勿合用也。”从这些記載上,我們可以知道古人在實踐中早已認識到各种药物的配伍关系了。

关于单行、相須、相使、相畏、相恶、相杀、相反的意义,分述于下:

(一)单行 就是依靠单味药發揮疗效的单方,适用于病情較單純的病症。例如疗牛力乏病的白矾方。

(二)相須 就是用二种以上同类的药物,可以發揮协同作用而互相加强疗效的方剂。例如治阴火时用知母与黃柏(酒炒),以木香为佐,則疗效比单味药更好。

(三)相使 就是用二种以上不同类的药物,其中以一药为主,另一些药为輔,来互相促进疗效的方剂。例如在治疗眼病时,以青葙子为主,而用石决明、菊花为使,以增强疗效。

(四)相畏 就是二种药物合用后,其中一种药物会受到另一种药物的制約,从而减低或消除其毒性或疗效的,称为相畏。例如十九畏。

(五)相恶 就是二种药物合用后,其中一种药物能牵制另一

種藥物而使作用減弱的，稱為相惡。例如半夏惡皂莢。

(六)相殺 就是一種藥物能夠消除另一種藥物的副作用或中毒反應。例如綠豆能殺巴豆毒及棉子毒。

(七)相反 就是二種藥物配合應用後，能夠發生劇烈的副作用，從而產生惡劣的後果。例如十八反。

以上七情，是古人通過長時間的實踐而總結出來的經驗。除單行、相須、相使者外，其中相畏、相惡、相殺、相反等，是指不同程度的相互抑制或對抗作用。其中相反的藥物，原則上是不能配合應用的，但有時也可斟酌情形來應用，例如吹鼻散，就是利用人參與藜蘆相反的作用來對抗藜蘆的猛烈性能，從而達到“相反相成”的目的，但須確實有把握，才可以採用，千萬不可隨便應用。

關於相須、相使，是說明藥物配合應用後有相互促進、相互加強藥效的作用。這些配合原則可以參考上節所述的君臣佐使用藥須知的簡表，確實地根據病情的變化，來靈活運用。

二 配伍禁忌

根據臨床經驗和本草的記載，前人把相反、相畏的藥物和胎前服忌的藥物編成了十八反、十九畏和胎前服忌的歌括，茲摘錄于下，以供開方用藥時的參考。

(一)十八反歌(摘錄自“元亨疔馬集”，以下同)

本草明言十八反，逐日從頭說與君。

人參芍藥與沙參，細辛玄參及紫參；

苦參丹參并前藥，一見藜蘆便殺人。

白芨白朮并半夏，瓜蒌貝母五般真；

莫見烏頭怕烏喙，逢之一反疾如神。

大戟芫花并海藻，甘遂已上反甘草；

若还吐蠱〔注1〕及翻腸，寻常犯之都不好。

蜜蜡〔注2〕莫与葱相覩，石决明休見云母。

藜蘆莫使酒来侵，人若犯之都是死。

另外，还有简单的歌括如下：

本草明言十八反，半萆貝蘇芩攻烏，

藻戟遂芫俱战草，諸參辛芍叛藜蘆。

(二)十九畏

硫黄原是火之精，朴硝一見便相爭。

水銀莫与砒霜見，狼毒最怕密陀僧。

巴豆性烈最为上，更与牵牛不入情。

丁香莫与郁金見，牙硝难合荆山稜。

川烏草烏不可犀，人参又忌五灵脂。

官桂善能調冷气，石脂相見便蹉蹊。

大凡修合看順逆，炮燼〔注3〕炙煨要精微。

現在把十八反、十九畏归納如下表：

表 19 十八反簡表

主 藥	相 反 藥 物
藜 蘆	人参、芍药、沙参、細辛、玄参、苦参、紫参、丹参
烏头、烏喙	白芨、白蘇、半夏、瓜蒌、貝母
甘 草	大戟、芫花、海藻、甘遂
葱	蜂蜜、黄蜡
云 母	石决明
酒	藜蘆

〔注1〕 蠱原文为益。

〔注2〕 蜜蜡：原文为萆硝。

〔注3〕 燼即将药物置鍋中加热，以使之微热为度。

表 20 十九畏簡表

主 藥	相畏藥物	主 藥	相畏藥物	主 藥	相畏藥物
硫 黃	朴 硝	巴 豆	牽 牛	川烏、草烏	犀 角
水 銀	砒 霜	丁 香	郁 金	人 參	五 靈 脂
狼 毒	密陀僧	牙 硝	荆 山 棧	官 桂	赤 石 脂

以上十八反中共指出 24 種藥物，連 19 味相畏的藥物計算在內，共計 43 種。此外，相惡、相畏的藥物還很多，例如“本草綱目”引証本草經 365 種的藥物中，相畏者就有 38 種之多。因此，這裡所指出的不過是其中的一部分，其他藥物的配伍禁忌，將在各論各章中，加以敘述。

(三) 胎娠服忌

蛇斑水蛭及蠱蟲，烏頭附子配天雄，
野葛水銀并巴豆，牛膝薏苡與蜈蚣，
山棧代赭芫花麝，大戟芫蛭黃雌雄，
牙硝芒硝牡丹桂，槐花牽牛皂角同，
半夏南星與通草，瞿麥干姜桃仁通，
礞砂干漆蟹甲爪，地胆茅根都不中。

這首歌包括在胎娠中宜忌的藥物如芫菁^{〔注〕}、斑蝥、水蛭、蠱蟲、烏頭、附子、天雄、野葛、水銀、巴豆、牛膝、薏苡、蜈蚣、荆山棧、代赭石、芫花、麝香、大戟、蟬蛻、雌黃、雄黃、牙硝、芒硝、牡丹皮、肉桂、桂枝、槐花、牽牛、皂角、半夏、南星、通草、瞿麥、干姜、桃仁、礞砂、干漆、蟹甲爪、地胆、茅根等四十種。

從現有的資料看來，有些藥物因藥性猛烈，毒性較強，確有墮胎而能造成流產的後果，例如斑蝥、水蛭、蠱蟲、水銀、巴豆、牛膝、

〔注〕 芫菁：——原文為蛇。

荆山稜、麝香、大戟、芫花、牙硝、芒硝、牵牛等，因此应该禁用。其他如有行血、去瘀、行气破滞以及辛热、滑利的药，如附子、肉桂、半夏、瞿麦、干姜、桃仁等应该慎用。其他如益母草、莢朮、红花、枳实、大黄、冬葵子、川芎、商陆等，以及各論中記載的有胎娠禁忌的药，都应该注意使用。

(四)忌銅、鉄药

1. 銅鉄皆忌的，如地黄、肉豆蔻、玄参、益母草等药。

2. 忌鉄的药，如人参、五味子、山药、石榴皮、硃砂、何首烏、菖蒲、茜草根、龙胆、瓜蒌、芍药、麻黄、牡丹皮、知母、香附子、藜蘆、槐花、商陆、雷丸、皂角、甘遂、猪苓、苦楝子、刺楸、桑寄生、雄黄等。

总之，有关相畏、相恶、相杀、相反、胎娠宜忌，以及忌銅器、忌鉄器的药，尚須进一步整理、补充和証实。

表 21 本章内容归簡表

方剂及配伍	方剂	方剂的組成	君——主病为君
			臣——佐君为臣
	方剂的种类		佐——与君相助(或相反)者为佐
			使——应臣之用者为使
配伍	七情合和		七方、十剂
			八陣、二十一剂
	配伍禁忌		单行、相須、相使
			相畏、相恶、相杀、相反
			十八反、十九畏
			胎娠服忌，忌銅、鉄药

第五章

中藥的劑型、劑量和用法

本章概述了中藥的劑型種類、中藥的劑量，以及使用方法等內容。其目的是為了更好地發揮方劑的療效和減少藥物的毒性反應，現在分為三節來敘述。

第一節 中藥的劑型

劑型是指藥物製劑的形態。

為了提高藥物的療效和便於服用，我國商代伊尹著有“湯液經”；而在“內經”中就有了湯、飲、酒、醴、膏、丸等劑型的記載，又在神農本草經亦記載有：“藥性有宜丸者、宜散者、宜水煮者、宜漬者、宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入湯酒者，並隨藥性不得違越。”這就指出了劑型的種類和它的重要性。

有關獸醫藥物的劑型，最早為“漢簡”所載的湯藥、膏藥及丸藥，其次為“齊民要術”上所載的湯、丸、散、膏、煎、酒和熏煙劑等；而在漢代以前的劑型記載，多已亡佚。茲根據有關中獸醫的資料，分為湯劑（包括炮浸、汁、洗、煎、水等劑型）、丸劑、散劑（包括外塗、

外敷、外貼、外点、擦剂、点眼、吹鼻药等剂型)、膏剂、酒剂、灌腸剂、熏剂、灸剂、麯剂、胶剂等剂型来叙述。

(一)湯剂(湯药) 是将药物切成薄片或杵碎混合后加水煎煮,然后去滓取汁服用的一种剂型。

湯剂的操作法比較简单,药汁容易吸收,药效較快,所以是常用的一种剂型,尤其对于急病和重症,更为常用。

煎药的器具一般是用砂鍋、瓦罐、瓷制器皿或挂錫的銅鍋。把药物放入容器內,先加入适量的水湿润約 15 分鐘,再加入方剂上规定的洁淨水(河水、泉水、井水或自来水),密閉其盖,然后煎煮。如果方剂上没有規定加水量,应以能浸沒全部药物为度;但对于吸水量較多的药物如灯芯草、蓬大海、大腹皮等,則水量可以多些(約为药物体質的 2—3 倍)。

煎药时的火力,对于补养药,一般宜用微火(文火、慢火)緩緩煎透,使药汁濃厚些;对于解表药、攻下药、涌吐药等,宜用盛火(武火、急火、暴火)急煎,煎药时的水分如果有損失,則可用温水补充。

煎药的时间一般为 20 至 30 分鐘,待煎液煎至原加入水量的半量即可,但也应根据药物的性能而加以区别,否則就会影响药效。茲根据药物的性能区别于下:

1. 对于石类、蛭类或坚硬的根、果类,可采用久煎(時間約为 60 分鐘),例如龙骨、石决明、石膏、滑石、赤石脂、穿山甲、龟板、猪苓、栝榔等。

2. 对于一般根莖及果类,可采用平煎(時間約为 50 分鐘),例如黄连、黄芩、黄耆、党参、白芍、桔梗、甘草、厚朴、知母、沙参、玄参、远志、黄柏、大黄、澤泻、牛膝、黄精、菖蒲、大戟、天麻、何首烏、山楂、巴豆、酸枣仁、車前子、牛蒡子等。

3. 对于花类、叶类或气味厚的藥物，可采用少煎(時間約为 10 分鐘)，例如金銀花、紅花、藿香、桂枝、青蒿、茴香、肉豆蔻、細辛、益智仁、香薷等。

4. 对于某些貴重的或加热容易破坏的藥物，例如广木香、肉桂、雷丸、沉香、牛黃、麝香、硃砂、琥珀、鷄內金、犀角等，可先研磨为細末或单煎，然后用煎好去滓的藥液冲服或单服。

5. 对于方剂中包括有芳香而气輕力薄及易溶解的藥物，如紫苏、薄荷、荆芥、陈皮、青皮、砂仁、大黃、朴硝、阿胶等，可采用后下(又称后入，即等待其他藥物煎好后，再加入稍煮即可)的方法；对于难煎透的藥物如龙骨、石膏、葛根、瓜蒌仁、麻黃、梔子、茵陈蒿等，可采用先煎的方法(即先煎一些時間，然后再放入其他藥物)；对于質輕或質重的藥物，如旋复花、枇杷叶、蒲公英、紫苏子、蔓荆子、車前子等質輕的，或飞滑石、赤石脂、石膏、龙骨等質重易散的藥物，应装在紗布袋里，然后再放到容器中去煎(即包煎)。

湯剂一般煎二次(即头汁及二汁)，但在必要时也可以煎三次。如在方剂中指明加酒时，可把酒加入藥汁里直接灌服，不必与其他藥物同煎。

此外，属于湯剂范畴的，尚有下列的剂型。

1. 炮浸剂 就是单用温开水或开水来浸漬藥物(須密盖)，然后絞汁服用的一种剂型。例如用大蒜、生姜等切細或搗碎，然后加入同量或倍量的温开水密閉浸漬約 20—30 分鐘后，再用布絞汁服用；又如“元亨疗馬集”治牛尿血方項下，有“煎茶炮吃”的炮剂。

2. 汁剂 就是用新鮮的藥物压出(或搗出、燒出)藥汁应用的一种剂型。例如用生姜、大蒜压汁，用火燒苦竹(或黃竹)而得的竹瀝汁，用韭菜搗出的韭菜汁，用薄荷叶搗汁等。

3. 洗剂 就是用湯剂来外用洗滌的剂型。例如“元亨疗馬集”中所記載的洗疥方、防风湯、椒湯，以及民間兽医应用金銀花、艾叶和盐的洗口剂，用貫众、艾叶、金銀花、明矾等洗滌子宮脫出或直腸脫出的洗剂。

4. 煎剂 一种是指葯物煎湯去滓后，又用微火重复煎煉的煎剂；另一种是指煎煮時間的長短。例如“元亨疗馬集”所載的平胃散是“開水共調煎一沸”，滑石散是“開水調煎三沸”，七補散是“同煎三、五沸，候溫灌之”等。此外在“安驥葯方”上尚有“以猪脂煎皂角刺”的記載。

5. 水剂 就是把葯物溶化在水內的剂型。例如“元亨疗馬集”治牛口生疮的方剂中，有“蜜水調”；在治牛两眼生尿的方剂中，有“薄荷水調洗”等的記載。

(二) 丸剂(丸葯) 就是将葯物干燥后分別研細，过篩去渣，然后按方称取葯量，混合均匀，加入煉合葯(如水、黃蜡、面糊、蜜、醋、油、酒等)，制成丸塊或条塊，用手或木板(制丸板)搓捻而成所需要大小的一种剂型。

丸剂使用簡便，葯量准确，內用后，在体内作用緩慢而持久，适用于腸內的病症或其他慢性病。

关于丸剂的大小，在“元亨疗馬集”上有“如鷄头大”、“如彈子大”(即如蛋黃大)、“如麦冬大小”等的記載；而在民間治疗鷄病时，有“如梧桐子大”、“如仁丹大”的說法，并有“治上焦病，丸宜極小，中焦病，丸可稍大，治下焦病，丸宜極大”的記載。

丸剂的种类，往往以煉合葯而分为“冷水丸”、“醋糊丸”“大(小)麦面煎糊丸”、“黃蜡丸”、“蜜制丸”、“以黃丹、輕粉和丸”等六种。这些种类，主要是根据葯效来区分的，例如用水、醋等所制的

丸劑，比較容易溶化，所以适用于胃病和急症；用面糊、蜂蜜等制成的則溶解較慢，适用于腸病或慢性虛弱病；而以黃蜡制成的丸劑，因其不易溶化，适用于大腸的疾病，或避免藥物對胃的刺激時用之；至于用黃丹、輕粉所制的丸劑，則多供外用。

关于丸劑的服法，有“醋糊為丸油酒搖灌下”、“每用一丸蜜湯同煎三沸，加生油四兩、童便半盞灌之”、“每一丸，生油半斤、溫酒調灌”、“每用一丸，好酒一升溫熱，搗葱白數莖如泥，化開丸藥灌之”等記載。由此可知，丸劑有用油、酒、蜜湯等化開後灌服的，也有直接用油及溫酒灌服的。

丸劑容易霉爛和虫蛀，一般制作劑量，不可超過 2—3 天；但如果晒干密封，妥為保管，則可以保存較久的時間。

此外，尚有一種錠劑（例如保健錠），一般多按照丸劑來應用。

（三）散劑（藥散）是把各種藥物干燥後，分別碾成粉末，用篩篩過，然後按照方劑上規定的劑量，均勻混合在一起的一種劑型。

由一種藥物制成的散劑稱為單純散劑，由二種以上藥物混合制成的稱為复合散劑；供內用的一般用粗末或細末，供外用的一般用最細的粉末（即用密絹布篩過 2 至 3 次而得的粉末，或用水飛法制之）。

散劑容易配制，干燥品久貯不易變質，容積比原料藥較小，便于包裝、運輸及攜帶，內服後容易吸收，可以避免某些藥物因加熱而被破壞失效，可以防止藥物精華的揮發，所以藥效比較確實。供外用撒布患部的散劑因接觸面大，起作用也快，容易達到治療的目的。所以散劑是用途廣泛的一種劑型，例如“蕃牧纂驗方”、“安驥藥方”、“司牧安驥集”、“元亨疔馬集”等方劑中所記載的劑型，大部分為散劑。

內服散剂一般用清水、温水、漿水、温酒、童便、韭汁、蜂蜜、油等同調灌服；外用散剂一般是用井花水調勻、醋打面糊調勻、醋調勻，而用以外涂、外敷、外点，其次是直接干貼或点眼、吹入（吹鼻、吹耳、吹喉）等；此外，某些散剂，也加水来煎服。因此，按照用法來說，散剂包括的范围是外涂剂、擦剂、外敷剂、外貼剂、外点剂、点眼剂以及吹药等剂型。至于煎服的散剂，实际上是一种湯剂。茲举例說明如下：

1. 根据“元亨疗馬集”經驗良方用法上的記載：“知母散，温水一升，同調”；“济世消黄散，漿水一升，同調”；“蒼朮散，蜜一两，水一升，同調”；“麻黄散，温酒一升，同調”；“人参散，新汲水同調”；“清心散，韭汁一升，同調”；“清肺散，蜜一两，糯米粥一碗，酥油一两，小便半盞，同和灌之”；“雄黄散，井花水調勻，涂于肿处，如干再涂之”；“續断散，醋打面糊調勻药末，涂之立瘥”；“草烏散，洗淨，干貼之”；“乳香散，干瘡，油調涂之”；“麝香散，装竹筒，于两鼻孔中吹之”；“急济方，仍为末，点眼中”；“擦疥方，以生油燒熟調勻搽之，隔日再擦之”；“丹矾散，先以温漿水将疮口洗淨候干，用药末敷之”；“治馬伤蹄方，于蹄上裹之”等。

2. 根据“安驥药方”的記載：“一点散，若口鼻上生疣子，则于上面用药点一、二次”；“治馬伤水方，右研为末，捻在馬两鼻孔內”等。

从上面的一些实例来看，祖国兽医对于散剂的用法是很丰富的，值得重視和研究。

（四）丹剂 由数种药料研末用文武火炼制而成。可分为內服及外用两类，包括升丹、降丹、煨丹、烤丹、煮丹等五种，多为丸剂或散剂的形态。內用的丹剂如迴生丹（由梅片、硃砂、薄冰、甘草等制成），可內用于牛、猪的急症；外用的丹剂如化膿丹（由鉛粉、五倍

子、生石膏、輕粉、冰片、銀硃等制成)，可外用于牲畜的各种疮黄症。

(五)膏剂 有內服及外用两种，外用又分为膏药及药膏两种。

內用的药膏是将药物煎为浓汁后去滓，然后将药汁用微火炼成粘稠状即成；但有时也加入一些蜂蜜調和制之。据“安驥药方”所载的化虫膏，系用猪脂炼成油，然后加入药料拌勻，用一盆器收之，以便餵飼；又在“牛經大全”神聖散項下，系用水一升、猪油四两、灰汁一盞，同熬汁为膏灌之。

外用药膏一般是攤勻于厚紙或布上，貼于患部，有拔膿、消腫、止疼、生肌及保护創口的作用。药膏是由药料和油类、黄蜡等調成糊状的柔軟剂型，多外用于皮肤病、蹄病，例如“蕃牧纂驗方”上記載的胆矾膏，系用油先和葱白一处炒，然后入药同調。“司牧安驥集”中記載的掌胎膏，系加黄蜡于药料中制成，临用时将烙铁消（即溶化）擦之。又如“安驥药方”上記載的生蹄木髓子膏，系将猪脂熬油去滓，次入余药，再熬成膏，入瓷器內盛，于紙上攤貼。这就說明了胆矾膏是一种药膏，而掌胎膏和生蹄木髓子膏是一种膏药。

(六)酒剂(药酒) 一种是将药物浸于酒內，經過一定時間后去滓应用；另一种是把药物溶解于酒中，混合后立即应用，但有时也加热后才服用。

酒剂有祛风活血的功用，密封后可以长期保存，奏效快，常用于风湿痹痛等症。例如“元亨疗馬集”的五灵散，即用温酒五升同調；七补散，即用酒一升同煎三、五沸，候温灌之。又民間兽医常用的大蒜酒也是一种酒剂。这就可以說明临床上常用的酒剂种类了。

此外，尚有一种醋剂(苦酒剂)，是将药物加入醋而服用的一种剂型。例如“元亨疗馬集”中所記載的九龙轉江散，系用苦酒一升、

溫熱同調；乳香散，系用苦酒一升，煎三沸溫灌。這就說明了醋劑的應用方法和酒劑相同，所以和酒劑合稱為“酒醴”。

(七)灌腸劑 就是用肥皂水、生油和溫水灌入大腸里面的一種劑型。多用於結糞瀉不下的病症。例如“元亨疔馬集”中在導糞散的用法中有這樣的記載：“先用生油一兩，和溫水送入肛門，然後用葱白一枝，搗藥，送入谷道大腸里面，擰行百余步，糞即下。”這就說明了灌腸劑的制法和用法，同時也說明了古人早就採用了坐藥（栓劑）的劑型了。此外，民間獸醫也用蜂蜜二兩、葱白一兩、伏龍肝四兩混合搓成條狀，然後納入肛門內以導糞。這也是使用坐藥的一種劑型。

(八)熏劑 有水熏及火熏兩種。水熏的是將藥物煎湯，乘熱使病畜由鼻孔吸入；火熏的是將藥物置於暗火上或瓦上燒煙，然後使病畜吸入。例如“安驥藥方”上所載的治馬黑汗方，就是將藥物放置在新瓦上，用人發蓋之，用火燒，令煙入馬鼻中。又民間也常於端午節用硫黃、蒼朮、白芷、雄黃等各等分混合後，置於厩舍內以陰火（即暗火）燒煙，以達到避瘟、解毒、殺蟲的目的。

(九)灸劑 就是用陳久的艾葉，放在臼內搗成細末，然後篩去殘滓，將細末（即艾絨）取出，以作為藥用的一種劑型。多用於風濕痹痛的病症。

灸劑的用法是將艾絨放在紙筒內，直接放在穴位上用火燃燒，直到皮膚形成水泡（灸瘡）為止。但一般多在艾絨筒下放著一些藥物，例如隔著一層生薑片的就稱為隔姜灸，隔著一層大蒜片的就稱為隔蒜灸。

(十)醪劑 就是將面粉或米粉加入適量的藥物粉末混合後，保持在適當的溫度和濕度里，使之自然發酵，然後干燥，制成粗末

或塊狀，即可供為藥用，例如酒麴、神麴等。

(十一)膠劑 就是用動物的皮(須去毛)、骨、角質等，先用溫水浸，然後加熱溶化，去滓濃縮乾燥，即成為黃褐色透明或半透明的固體物質，就稱為膠劑，例如阿膠。多用為安胎、補血、益氣藥。

表 22 中藥的劑型歸納簡表

劑型名稱	一般配製法	包括範圍
湯劑	將藥物切成薄片或碎，加水煎煮，去滓取汁而成	炮浸劑、汁劑、洗劑、煎劑、水劑
丸劑	將藥物乾燥研為細末，過篩，加入煉合藥而製成	冷水丸、醋糊丸、面糊丸、黃蠟丸、蜜制丸、黃丹、輕粉丸
散劑	將各種乾燥的藥物碾成粉末，過篩混合而成	外塗劑、外敷劑、外貼劑、外點劑、擦劑、點眼劑、吹鼻吹耳劑
丹劑	由數種藥料研末、用文武火煉制而成	升丹、降丹、煨丹、燒丹、煮丹
膏劑	內用者是用藥物加水煎成濃汁後，去滓再煎成粘稠狀而成；外用者是用藥料、油類、黃蠟等調制而成	內服膏劑、外用藥膏、外用膏藥
酒劑	將藥物浸漬或溶解在酒內而成	醱劑
灌腸劑	由肥皂或生油加入溫水製成	坐藥
熏劑	將藥物置於暗火或瓦上燒燻	水熏劑、火熏劑
灸劑	將艾葉放在臼內搗成細末，過篩即成	隔姜灸、隔蒜灸
麴劑	將面粉或米粉與藥粉混合發酵製成	酒麴、神麴
膠劑	將動物的皮、骨、角質等煎熬去滓，再濃縮乾燥而成為半透明的固體	馬、驢、牛、豬皮或骨膠

第二節 中藥的劑量

凡應用藥物來治療疾病時所用整個方劑的藥量，稱為劑量；如果是指方劑中一種藥物的數量，則稱為用量。

用藥剂量的多少，关系到治疗的效果和藥物对动物体的毒性反应，因此必須加以重視。現在分述如下：

(一) 剂量与藥物性質、剂型的關係

1. 凡有毒及具有峻烈性的藥物，藥用剂量不宜过大，例如“本草經”中說：“若用毒藥治病，先起如黍粟，病去即止，不去倍之，不去十之，取去为度。”考古衡制以十黍为一銖，六銖为一分，四分为一两，十六两为一斤。可見黍粟是最小的剂量。这就說明了毒藥及峻烈性藥物的剂量，应小心謹慎地使用，而一般是从小剂量开始。

为了指出那些中藥是有毒或无毒，本書各論中所述的每一种藥物，都說明了有毒、无毒、大毒、小毒、性平等等，可以作为用藥时的参考。但是虽屬於性平或无毒的藥物，如果剂量太大或持久濫用，也能引起中毒，必須注意。

2. 对于質輕或气味芳香的藥物，一般剂量不宜过大，对于質重或气味厚的藥物，剂量可以加重。

3. 对于容易吸收的剂型如湯剂、酒剂等，其剂量可較不容易吸收的剂型如丸剂、散剂等少些；对于单方的剂量，可以比复方的剂量加重些；对于方剂中的君藥，剂量也可以加重。此外，濃汁的藥液剂量应比稀汁的剂量少些，温暖的藥汁应比冷涼的藥汁剂量少些，灌腸的藥液剂量应比灌服的剂量增加些，在藥物吸收困难或排泄增加时，藥物的剂量也可以增加些；又在草飽、草后、草半应用藥物时，剂量可以多些，而在草前、空草时，剂量可以减少些。

(二) 剂量与动物种类、体重、年齡、性別的關係

由于动物种类、体重(大、小)与年齡(老、幼)的不同，藥用剂量是有区别的。本書各論中每味藥項下所指的用量，都是指成年家畜

的用量。

从动物种类來說，牛、馬的劑量比羊、猪为大，而羊、猪的劑量又比兔、鷄为大。从体重來說，虽然都是成年动物，但体重較重的动物，則藥用劑量可以增加些，反之，則应减少。从年齡來說，幼齡及老齡动物的藥用劑量要比成年动物减少些。从性別來說，公畜的劑量一般比母畜大些，特別对于胎娠的母畜，劑量更應該注意。

(三)动物的营养状态及病症輕重緩急与劑量的关系

一般來說，瘦弱的动物对藥物的耐受程度差些，所以劑量应从輕；疲憊的或衰弱的动物比精神飽滿的或強壯的动物对藥物的耐受程度差些，所以藥用劑量也應該从輕。对于急症或重病，劑量可以从重；而对于慢性的、輕症的，劑量可以从輕。

以上說明了中藥的劑量是根据临床治疗上的具体情况而有所增減，并不是一成不变的。因此，我們在确定藥物的劑量时，應該加以全面的考虑。

(四)中藥的衡量制

我国古代的衡量和現代不同。根据目前的考証，認為汉代一两，約为現代市秤的四錢八分强，一升約为現代的二合左右，但尚未作定論。

关于丸剂的重量和大小，古代多以实物来比較而不論斤两，大約如鷄蛋黃大的，約等于現在的五錢，一彈丸大的，約等于現在的四錢，一梧桐子大的，約重一市分。

上述古代衡量和体积大小与現在衡制的比較，仅是一种近似值，在实际应用时，仍須斟酌情况使用。

关于中藥的衡量制度，根据 1959 年 6 月 25 日“国务院发布統一我国計量制度的命令”第一項中規定：“市制原定十六两为一斤

因为折算麻烦,应当改为十两为一斤,……。中医处方用药,为了防止计算差错,可继续使用原有的计量单位,不予改革。”同项中确定公制为我国的基本计量制度,在全国范围内推广使用。兹将原市制列表如下,并将公制等量列入,以作参照。

表 23 原市制与公制衡量对照表

量 别	原市制名称	原市制等量	公制等量
重 量	市 厘	1 市 厘	0.03125 克
	市 分	10 市 厘	0.3125 克
	市 钱	10 市 分	3.125 克
	市 两	10 市 钱	31.25 克
	市 斤	16 市 两	500.0 克

量 别	原市制名称	原市制等量	公制等量
容 量	市 勺	1 市 勺	10 毫升
	市 合	10 市 勺	100 毫升
	市 升	10 市 合	1 升
重 量	市 斗	10 市 升	10 升
	市 石	10 市 斗	100 升

现在家用容器与公制的比较如下:

表 24 家用容器与市制、公制比较表

家用容器名称	原市制等量	公制等量
1 茶 匙	半 市 勺	约 5 毫升(公撮)
1 汤 匙	1 市 勺 半	约 15 毫升
1 茶 杯	1 市 合 半 到 二 市 合	约 150—200 毫升
1 碗	2 市 合	约 200 毫升
1 饭 碗	3—4 市 合	约 300—400 毫升

第三節 中藥的用法

由于中藥主要以湯、散劑內服為主，所以專就湯劑及散劑的用法加以敘述，其他可參考上述的劑型項下。

方劑在配制使用時，須注意下列各點：

(一)在配藥時，必須注意：①藥味的配合是否適當；②劑量是否合適；③方劑中的藥味是否有配伍禁忌；④在衡量藥物時，劑量必須準確；⑤包藥時必須把異物除淨，並應注意每味藥的質量；⑥配完後要復驗，避免遺漏或拿錯。

(二)研藥可採用藥礮或臼搗的方法，一般是將干燥而量少的或易碎的藥味先研，其次再礮粗皮或較硬的根莖或果實類藥物，最後才將各味藥粉混合均勻，過篩應用。需要臨時炮制的藥物，可分研、合研，或先研後合、先合後研，應斟酌情形而行。對於普通的藥物，可將其混合研細。

藥粉以研至不粗不細、適中為度。因為太粗，則藥物難于吸收，奏效慢；而太細，則粘喉難咽。

研藥時要注意清潔，若無篩具時，應詳細檢查藥粉里是否有碎石頭、黑炭塊、鐵片、瓷片、小洋釘、細毛髮等混入，如經發現，應立即取出，以免傷害腸胃。

(三)沖藥時，首先要用白開水將藥沖成稠狀，稍待片刻，使藥粉浸透；其次是加入方劑上的引藥，再添加一些冷水，調成半稀半稠的程度（如稀粥），因為太稀恐誤咽，太稠難以咽下。對於藥液的溫度，一般是在冬天可稍溫，在夏天宜稍冷。

(四)對於三喉症、中風口緊而不能咽藥者，可不必研細，只須

將藥切成薄片或搗碎，即可加水煎熬，然後去滓灌服。熬藥的人員應專心注意熬藥；一般是先用急火熬開，然後用微火再熬三、五沸即成。

(五)關於灌藥的次數，一般是每天灌服 1—2 次，但在急症時，每天可灌 3 次或頻頻灌之。

(六)關於灌藥的時間，“本草經”的序錄上有這樣的記載：“病在胃膈以上者，先食後服藥；病在心腹以下者，先服藥而後食；病在四肢血脈者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜飽滿而在夜。”在“蕃牧纂驗方”、“安驥藥方”及“元亨疔馬集”里，也有“空腸”、“草後”、“草飽”、“空草”、“草前”、“喂飽”、“草半灌之”、“隔日再灌”等的記載，可以作為用藥的參考。

一般來說，在空腸、空草或草前灌藥，則藥物吸收較快，而且可以直接作用於腸胃，所以對於急症或脾胃有病（如積滯、臍結、蟲積等）時，比較適宜；而草後、草飽、草半、喂飽後，則藥物的吸收較慢，所以對於慢性病或灌服刺激性較大的藥物，以及補養藥，比較合適。

(七)灌藥的方法及注意事項，可分為下列幾點：

1. 灌藥的地点，在大动物要选择寬敞平坦地、四周无障礙物的处所，設立粗圓光滑木柱一支，埋的深度約在三尺左右，木柱上要有分叉，或釘一拉环。如临时灌藥，可以樹叉或梁柱代之。對於中小动物，只要選擇平坦的地方即可。

2. 將沖好的藥盆放在安穩的地方，勿使牲口接近，以防踩倒。

3. 臨灌時，對馬騾可先將吊口繩帶在牲畜的頭上，將口吊平；對牛可將繩拴到肩部同高，因為太高傷氣恐錯咽，太低容易流出藥汁。如遇帶有夾板籠頭的家畜，可將吊口繩套在籠頭底下，以免

妨碍张口。对于猪、兔、鷄等，則应妥为保定。

4. 將繩繩从左边活套在木柱上，不可栓紧或打結，否則家畜猛扑或后退时，容易发生危險。

5. 灌藥器(包括牛角、黃銅所制的灌藥器)未到口时，应先輕插之；灌藥器到口內舌中部后，即可將藥灌入。

6. 灌藥时，不要馬虎玩笑，要时刻留神，如遇到呼吸器病的牲畜(如咳嗽、吊鼻和三喉症)和老瘦气虛、出汗或喘息者，要緩一緩再灌。

7. 对于灌藥不咽的家畜，要在藥內临时添水，使其变稀一些，然后以手掌輕拍其头部，或用空灌藥器插入口中使其舌活动，再少灌、慢灌，且应以盆接藥，多灌几下，勿使錯咽或將藥物撒失。

8. 如遇喉症和风症不能灌研藥时，可灌熬成的藥汁，待灌入二、三口后，应緩一緩再灌，尤其是应避免速灌或高灌，以防藥汁錯入气管。

9. 在灌服洗藥盆的稀水时，要将头放低些再灌。

10. 灌完时，要停片刻，再放开家畜。

11. 拉吊口繩的人員，要站在家畜的左前方，灌藥的人員，要站在右前方，千万不可站在正前方，以免病畜的前蹄和头碰伤人，或者发生咬伤。

12. 遇猛扑頑强的家畜，可临时筹划各种妥当的办法，如以繩縛其肢体，或以布掩其眼，或扭其耳唇等。最好是先軟后硬，以平安灌藥为目的，如正在灌藥中間，家畜忽又頑抗急动，这时可暫停，不可强灌。

(八)灌藥后應該注意的事項：这里所指的是一般性的，在特殊情况时，要听兽医的指示。

1. 对于气胀的家畜,服药后,病轻者应拉蹯,病重者则应系于安静通风的厩舍内。

2. 服药后,轻症的至少应休息一天,重症者例外。

3. 服药后,如有同槽合喂的,宜隔槽喂。

4. 服药后,当夜忌喂面和绿豆粉,但可在第二天上午喂。

5. 服药后三日內,忌飲空腸水,亦忌雨淋、馱重或快走。

6. 服药后半小时左右,如有口流清水者,一般是由于胃内有虫,一見药味,在胃内窜动的表现,隔2至3小时后,可复原状;特别是瘦弱的家畜,常見有这样的反应,应予以注意。

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。8

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。9

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。10

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。11

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。12

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。13

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。14

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。15


。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。16

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。17

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。18

。牛飼料中加些鹽和鈣粉,不但能治,且能預防。如牛患此症,可服鹽水或鹽水加糖。如患此症者,可服鹽水或鹽水加糖。19

第三編 各 論



第一章

清 热 药

凡有清热泻火或凉血解毒等功效的药物，就称为清热药。

引起发热的原因很多，因而施治方法亦各有不同。例如外感初起，热在肌表，这时应当用解表药，以发散表邪，使热随汗而散；因里热积滞而发热时，应先用泻药攻其积滞，则热可随泻而散；如因阴虚、血虚而发热时，则应采用补血养阴，则热自可退。本章所述各种清热药，主要是用于表邪已解的发热，积滞已除的里热，以及温病实热、湿热、血热及疮癰热毒等症，应与上述的发热有所区别。

清热药大多为性味辛苦寒凉，多用易伤脾胃，应用时要注意。且本章的药物，除了清热的共同作用外，各药还有它们不同的功能，概括地说，可分为降火、燥湿、解毒、凉血等四类。兹分别叙述。

第一节 清热降火药

知母（本草经）

【别名】肥知母、之母。

【主要产地】河南、河北、四川、辽宁、内蒙、陕西、山西、吉林、宁夏等地。

【药用部分】本品是百合科多年生草本植物，入药用其根茎。其干燥根茎，呈扁圆柱状，微弯曲，长约2寸至4寸，粗约3分至5分，外面为黄褐色或黄白色，被有叶基腐烂后残留的纤维，呈粗毛状，脊有許多不規則的縱皺紋，头部有莖痕，下部有不規則并列的根痕；質柔軟，橫断面呈淡黃色，为粉質。剥去外皮，呈黄白色，称知母肉。




图7 知 母

左、知母原植物； 右、药用部分外形：1.粗毛，2.根痕，3.莖痕。

【炮制】將原藥先行去淨毛，水洗、潤透後，切片曬干，生用、酒炒或鹽水炒用。

【性味和歸經】味苦，性寒無毒。入肺、腎、胃三經。

【應用】本品有清涼降火，滋陰潤燥、止渴、消腫、化痰、定嗽、通便利水等功用。主治肺熱咳嗽、高熱煩渴、大便秘結、小便不利、兩目赤腫、咽喉腫痛等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩 5 錢；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 6 分。

【附歌】知母苦寒，降火止渴，清肺消痰，可潤燥結。

【配伍】配貝母、天花粉、梔子（二母散），治馬卒熱；配沒藥、當歸、百合、葶藶、梔子等，治肺痛、喘粗；配黃柏、滑石、木通等，治小便不通。

【附方】知母散（元亨疔馬集）：治馬肺痛，頭垂向地，喘粗。

知母 沒藥 當歸 百合 葶藶 甘草 梔子 馬兜鈴 玄參 白芍藥 桑白皮

上藥為末，蜜、姜、童便同調，草后灌之。

按：知母味苦性寒，用之在上則能清肺止渴，潤心肺，解虛煩咳嗽，去頭風痛及喉干；在中則能退胃火；在下則能利小便，潤大腸，去膀胱濕熱，腰肢腫痛等症。若佐以黃柏，更能下泄腎水，上行潤心肺，清肺氣，使濕熱清除更快。

玄參（本草經）

【別名】元參、玄武精、黑玄參、四稜麻。

【主要產地】浙江、安徽、陝西、湖南、湖北、江蘇、河北等地。

【藥用部分】本品是玄參科多年生草本植物，入藥用其根。干

燥根为紡錘形，长约3—4寸，粗约7—8分，外面呈灰褐色乃至黑色，有縱皺紋，横皺紋較少；横断面显紫褐色或黑褐色，油潤如烟胶。




图 8 玄 参

左、玄参原植物； 右、药用部分外形及横切面。

【炮制】将原药洗净泥土，先除去蘆头，再切薄片，晒干，生用或焙用。

【性味和归經】味苦咸，性温微寒。入肺、腎二經。

【应用】本品能降火滋阴，清热止渴，解热毒，利咽喉，明眼目，散肿痛，补腎气。主治咽喉肿痛、大便燥結、热病煩渴及肺热气喘等症。对于脾虛泄泻者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1两5錢；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄4分至1錢。

【附歌】玄参咸寒，降火滋阴，目赤咽痛，燥結亦用。

【配伍】配全当归、大黄、柴胡、枇杷叶、茯苓、梔子、黃連、法半夏、桔梗等，治咳嗽气喘；配牛蒡子、山豆根、射干、連翹等，治喉头腫脹、咳嗽。

【附方】(1)治馬气喘方(农政全書)。

玄参 葶藶 升麻 牛蒡 馬兜鈴 黃耆 知母 貝母
同为末，漿水調，草后灌之。

(2)治咽喉腫脹咳嗽方(河南)。

玄参 牛蒡子 山豆根 射干 連翹 金銀花 桔梗 荆芥
防风 貝母 百合 甘草

以上共为末，秋冬加蜂蜜，春夏加鷄蛋清、香油，用水調勻，灌服。

按：玄参为清火退热要藥，功能滋阴降火，明目消腫，主治一切实証。如配合陈皮、杏仁能清火，配合茯苓、澤泻能利水，配合地黃、菊花、刺蒺藜、枸杞子、柴胡能明目，配合貝母，連翹、瓜蒌、薄荷、夏枯草、甘草能治療癰結痛。

梔子(本草經)

【別名】枝子、山梔子、焦枝子。

【主要产地】湖南、江西、湖北、四川、广东、福建、浙江、广西、江苏等地。

【藥用部分】本品是茜草科常綠灌木山梔的果实。干燥的果实为倒卵形或橢圓形，長約6—7分，粗約3—4分，外面呈黃褐色或黃赤色，有六条稜綫，果皮为革質，很薄，呈半透明；果肉为黃紅色，包藏有多数扁平橢圓形的种子。

【炮制】生用，姜汁炒或搗碎炒焦用。



图9 梔子

左、梔子原植物；右、药用部分外形：1. 稜鏡。

【性味和归經】味苦，性寒无毒。入心、肺、三焦三經。

【应用】梔子能清热泻火，利水通淋，消渴止血，明目利胆等。主治发热口渴、三焦郁火、目赤热痛、黄疸、血淋、衄血、血痢、疮黄肿毒等症。如去皮用仁，能去心胸之热，解“羊躑躅”（鬧羊花）毒。研末外用，可治跌打损伤。对于脾胃虚寒，无湿热无郁火者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1两2錢；羊和猪2至4錢；兔和雞5分至1錢。

【附歌】梔子苦寒，清热泻火，利胆止血，跌伤外用。

【配伍】配黄芩、木通、白芷、山药、桔梗、黄柏、天花粉、牛蒡子（清心散），治馬心热、舌上生疮；配滑石、淡竹叶、当归、菖蒲、石菖、瞿麦、藕节、生地黄、甘草（福建），治牛血淋。

按：梔子是清熱瀉火要藥，其味苦性寒，氣薄而味厚。由於氣薄輕清浮上，故能瀉心肺之火；而味厚則下沉，故又能瀉肝腎膀胱之火。由於梔子瀉火解熱的能效較廣，其用法亦不一樣，如瀉火可用生梔子，清內熱則用梔仁。如表熱則用梔子皮，炒黑則能止血，姜汁炒則能止煩熱。如配茯苓、木通、滑石、澤瀉，則可瀉小腸火；配連翹、麥門冬、竹葉、燈芯草、黃連、生甘草，則能瀉心經火。消黃散多用之。

石膏（本草經）

【別名】石羔、冰石、白虎。

【主要產地】山東、山西、湖北、浙江、江蘇等地。

【原藥形態】本品是單斜系的礦石，為天然的石膏。石膏有軟硬兩種，以軟石膏作藥用，其色白而有光澤，具短密的細紋，質松軟易碎。煨之，則成為白色的粉質，稱為熟石膏。

【炮制】將原藥搗碎生用或煨用。

【性味和歸經】味辛甘帶澀，性寒無毒。入肺、胃、三焦三經。

【應用】本品有清熱瀉火、生津止渴、解肌消痰、清胃火等功用。主治胃腸實熱、高熱自汗、狂熱大渴、煩躁不安、頭重、咽喉腫痛等症。對於胃弱無實熱者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 5 錢，兔和雞 5 分至 2 錢。

【附歌】石膏甘寒，清熱瀉火，止渴生津，主瀉胃火。

【配伍】配杏仁、麻黃、甘草（湖北），治馬肺熱、咽喉腫痛；配知母、蘆根、白茅根、金銀花、淡竹葉（湖北），用于牛馬燥熱；配大黃、朴硝、滑石、牽牛子、當歸、番瀉葉、枳殼等，治牛百葉干燥。

【附方】(1)三黄石膏湯(四川):治猪打火印。

石膏 黄芩 黄柏 梔子 知母 青蒿 牡丹皮 厚朴 豆豉 黄连, 生姜为引
上药煎水, 候温灌服。

(2)石膏湯(山西):治牛百叶干燥。

生石膏 大黄 朴硝 滑石 牵牛子 全当归 番泻叶 枳壳 厚朴 苍朮 陈皮 甘草 麻油为引

上药煎水灌之(朴硝、滑石不入煎, 以煎好的药汁混和灌服)。

按: 石膏体重泻胃火, 气轻解肌表, 生津液, 治狂止渴, 除烦热, 所以是清凉解热药, 适用于狂热、烦热大渴或胃肺的实热等症, 如无实热者禁用。

又石膏内服宜生用, 先击碎入煎; 而外用为疮口收斂药时, 多经火煨熟用。

夏枯草 (本草經)

【别名】铁色草、猪屎草、夏枯球、夏枯花。

【主要产地】全国各地都有。

【药用部分】本品是唇形科多年生草本植物, 入药用其全草。其干燥全草, 长约6—7寸, 茎作方形, 叶对生, 呈长椭圆形, 前端尖, 边缘有细锯齿, 叶脉多茸毛, 于茎顶丛生淡紫色或白色唇形花, 集结成密穗状花序。因为到了夏天(农历五月)就枯死, 所以有夏枯草的名称。其花穗称夏枯球。

【炮制】将原药洗净泥土, 切碎, 生用。

【性味和归经】味苦辛, 性寒无毒。入肝、胆二经。

【应用】本品能清肝火, 除内热, 散郁结, 明目, 利尿。主治目赤

肿痛、癰癤、乳癰、骨节疼痛、小便不利、黄肿等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】夏枯草寒，散結清火，癰腫目赤，乳癰癰癰。

【配伍】配白芷、忍冬藤、連翹、菊花、紫花地丁等，治癰疽腫毒。

【附方】治羊走黃方(江西)。

夏枯草 烏藥 葛根 薄荷 野扁豆根 忍冬藤 菖蒲
烏白樹根

上藥煎水，去渣，候溫加燒酒灌服。服藥後三日內，忌下污泥土，或感染各種毒氣。

蘆根（別錄）

【別名】葦根、蘆筒根、蘆葦根。

【主要產地】我國各地淡水河、湖沿岸，或溪流間都有出產。

【藥用部分】本品是禾本科多年生草本植物蘆葦的根莖。新鮮根莖與乾燥的根莖均供藥用。

新鮮根莖為長圓柱形，往往有分叉，粗約 2—3 分，每間隔約 1 寸半至 2 寸處有一節，節處輪生多數細根，根莖外表呈白色或黃白色，有光澤，質脆而中空。乾燥根莖呈黃褐色或淡黃色，有顯著的縱皺，質柔韌，其切斷面呈黃褐色。以採取新鮮肥大而色白者為最好，其乾燥品較次。

【炮制】將原藥去節，切成小段生用。

【性味和歸經】味甘，性寒無毒。入肺、胃、腎三經。

【應用】本品能清熱，除煩渴，止嘔吐，利小便。主治熱病煩渴、小便不利、胃熱及肺癰等症。對於脾、胃虛寒者忌用。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 兩；羊和猪 3 錢至 6 錢。

【附歌】蘆根甘寒，清熱降火，止渴利水，虛寒禁用。

【配伍】配薏苡仁、桃仁、冬瓜子，治肺癰；配茵陳蒿、黃芩、梔子，治黃疸。

【附方】(1)治牛肺火病方(浙江)。

蘆根 梔子 淡竹葉 銀花 半夏 厚朴 枳殼 甘草 蘇子 陳皮 大黃 桑葉 朴硝 柴胡 杏仁 桑白皮
煎水灌服。

(2)牛馬清熱方(湖北)。

鮮蘆根 薏苡仁
煎水灌服。

茶葉 (唐本草)

【別名】茗、茶芽。

【主要產地】福建、四川、安徽、雲南、江蘇、江西、湖南、湖北、浙江等地。

【藥用部分】本品是山茶科常綠灌木茶的葉。乾燥者呈捲曲或破碎狀，完整的葉為長橢圓形，先端尖，邊緣有細鋸齒。因加工方法不同，有紅茶、綠茶之分，紅茶顯赤褐色或黑褐色，綠茶呈綠褐色。二者均有清香氣味。

【炮制】原為加工成品，原藥用或研末用。

【性味和歸經】味苦甘，性微寒無毒。入心、腎、胃三經。

【應用】本品能清熱降火，消食提神，去痰止渴，利水。主治煩渴、精神倦怠、頭重目赤、小便不利。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和猪 3 錢至 5 錢。

【附歌】茶葉微寒，清熱解渴，降火提神，上清頭目。

【配伍】配青蒿、黃芩、黃柏、梔子、知母、五加皮、蒼朮、厚朴、木通、滑石，治濕熱；配木通、白牽牛、黑牽牛、車前，用于利水。

【附方】治小豬瀉奶尿方（四川）。

茶葉 葛根 苦參炒 麥芽炒 山楂 赤芍藥 陳皮 馬齒莧

共煎水內服。

第二節 清熱燥濕藥

黃連（本草經）

【別名】宣黃連、云連、雅連、古勇連、川連、鷄爪連。

【主要產地】四川、雲南、江西、廣西、貴州、陝西、湖南、湖北、浙江、安徽、福建、寧夏等地。

【藥用部分】本品是毛茛科多年生草本植物，入藥用其根莖。干燥根莖呈各種彎曲的圓柱狀，有時分枝，上面有不整齊的凸起，狀如結節，長約1—2寸，粗約1—2分，外面顯棕黃色，頂端常帶有殘余的莖及葉柄，下部有須根的殘基；質堅而脆，折斷面呈暗橙黃色，中心有細小的空洞。以表皮呈棕黃色、內面深黃色而充實的為上品。

【炮制】原藥生用、酒炒或姜汁炒用。

【性味和歸經】味苦，性寒無毒。入心、肝、胆、胃、大腸五經。

【應用】本品能解熱瀉火，燥濕解毒，療痢疾，清肝胆，明目。主治泄瀉痢疾、大便下血、心煩狂燥、目赤腫痛、口舌生瘡、瘡瘍腫毒

等症，亦解巴豆、輕粉的中毒。虛弱者忌服。

【用量】馬和牛3錢至1兩；羊和猪1錢至2錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】黃連苦寒，瀉火燥濕，清肝明目，厚腸止痢。

【配伍】配天門冬、麥門冬、大黃、黃蘗子、知母、貝母、郁金、梔子、黃芩、黃耆(黃連散)，治馬肝黃、四蹄如柱；配郁金、梔子、石決明、決明子、旋復花、青葙子、龍胆草、甘草(瀉肝散)，治馬內障，眼睛先青色，後變綠色。

【附方】治猪打火印方(湖北)。

黃連 黃柏 黃芩 梔子 大黃 牡丹皮 知母 茜草 青蒿

上藥煎水，候溫灌服，每天一次。

按：黃連功用甚多，而其性亦良，凡有濕熱疾患，用之無不相



图 10 黃 連

上、黃連原植物；下、藥用部分外形。

宜，故為清火、除濕、解毒要藥。由於使用較廣，其炮制方法亦多。時珍說：“黃連入心經，為治火之主藥。治心臟火則生用；治肝胆實火，豬胆汁浸炒；治肝胆虛火，醋炒用；治上焦火，酒炒；治中焦火，姜汁炒；治下焦火，鹽水或朴硝炒；治氣分濕熱火，吳萸湯浸炒；治血分塊中伏火，干漆水炒；治食積火，黃土炒。”

黃芩（本草經）

【別名】條芩、子芩、枯芩、片芩。

【主要產地】四川、陝西、河北、山東、湖北、江蘇、山西、內蒙等地。

【藥用部分】本品是唇形科多年生草本植物，入藥用其根。乾燥的根為不整的紡錘形或圓柱形，頂端較粗，下部漸細，中心常作腐骨狀，長約4—5寸，粗約7—8分至寸余，外面綠黃色，有縱皺紋；質堅脆，折斷面呈黃色，中心部髓質則呈黃褐色。老根多中空，稱為枯芩、片芩；幼根內部充實，稱子芩、條芩。以內部堅實、肉厚者為良，內部有空隙而




圖11 黃芩

左、黃芩原植物；右、藥用部分外形及橫切面。

发黑者为次品。

【炮制】将原药置开水内泡浸，取出以湿布或蒲包复盖闷润，待润透后，切片晒干，生用或酒炒、姜汁炒、胆汁炒用。

【性味和归经】本品味苦，性寒无毒。入心、肺、大腸、肝、胆五经。

【应用】本品能解热泻火，清热解毒，安胎利水。主治湿热、黄疸、肺热咳嗽、口渴、泄泻、头重喉痛、目赤肿痛、癰疽疔疮及胎动不安等症。对于脾胃虚寒、无湿热实火者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和鷄 4 分至 8 分。

【附歌】黄芩苦寒，清热燥湿，头重目赤，枯（即枯芩）泻肺火。

【配伍】配黄连、生地黄、龙胆草（黄芩散），治馬碧暈遮睛；配黄连、蒼朮、知母、黄柏、香附子、木香（降气散），治馬郁結而成黄肿。

【附方】黄芩散（元亨疗馬集）：治馬駒喉骨脹，鼻出白膿。

郁金 黄芩 白矾 飞

上药为末，蜜、清水同调，喂饱灌之。

按：黄芩能泻实火，清湿热，治泄痢，疔疮瘍，为清凉退热要药。但黄芩有中空心的，称枯芩（即片芩），而内实的为条芩（即子芩），两者在功能上稍有差别。枯芩体轻主浮，专泻肺、胃上焦之火，条芩体重主降，专泻大腸下焦之火。

黄芩生用，实热皆治，酒炒则上行，得猪胆汁则治肝胆热；而配柴胡，则可退寒热，因柴胡退热，能散火之标，黄芩退热，能拆火之本。由此可知黄芩性寒，故无湿热实火者忌用。李士材说：“黄芩苦寒，轻飘者入肺，坚实者入大腸。主风热湿热痰热骨蒸，火咳下痢，喉间腥气，上部积血，寒热往来，失血癰疽，安胎疗淋，养阴退阳。得

酒上行，得猪胆汁除肝胆火，得柴胡退寒熱，得芍藥治下痢，得桑皮瀉肺火，得白朮安胎。稍挾虛者，切勿輕用。”

黃柏（本草經）

【別名】原名黃蘗、川柏、柏皮。

【主要產地】四川、云南、福建、河北、江西、广西、貴州、辽宁、吉林、内蒙等地。

【藥用部分】本品是芸香科落叶乔木黃柏树的皮。干燥品呈板状，厚約半分至1分許，外面帶黃褐色或黃綠色而粗糙，腹面呈黃色乃至黃褐色而平滑；質柔韌不易折斷，折斷面呈鮮黃色，富有纖維，以水浸潤則帶粘性。

【炮制】將原藥略加浸潤，待變軟后，切成薄絲片晒干；生用，酒炒或鹽水炒用，或研成粉末供外用。



圖 12 黃 柏

左、黃柏原植物；右、藥用部分外形。

【性味和歸經】味苦，性寒無毒。入腎、膀胱二經。

【應用】本品能除濕熱，明目降火，滋陰補腎，止血痢。主治熱痢泄瀉，黃疸，腸胃熱結，大便瀉血，目赤，腎虛勞熱，一切瘡黃。焦黃柏治尿血。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 2 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和雞 2 分至 6 分。

【附歌】黄柏苦寒，降火滋阴，下焦湿热，止痢敷黄。

【配伍】配知母、郁金、贝母、大黄、梔子、黄芩、白芷、天花粉、桔梗(黄柏散)，治马脾黄、外肾棚上出汗及两膝浮肿；配黄连、黄芩、大黄、款冬花、贝母、白药子、郁金、黄药子、秦艽、甘草、梔子(四黄散、蕃牧纂验方)，治马心脏热、草慢，并鼻内出血。

【附方】(1)黄柏散(元亨疗马集)：治马阳毒脊背肥疮。

黄柏 当归 大黄 白芨 白藜 防风

以上各等分研为细末，以醋调匀，涂于疮上，立瘡。

(2)治两眼青渾方(元亨疗马集)。

黄柏皮 黄连 羌活 当归

上药研为细末，白汤煎洗。

按：黄柏的功效甚多，应用亦广。元素说：“黄柏之用有六，泻膀胱心火一也，利小便结二也，除下焦湿肿三也，痢疾先见血四也，脐中痛五也，补肾不足壮骨髓六也。”东垣说：“黄柏苍朮，乃治痿要药，因痿之因亦由下焦湿热也。”由此可知黄柏的功用对于下焦湿热有良好的疗效。

黄柏若配柴胡，则入胆；配黄连、葛根、升麻，则入肠胃与脾经，治湿热滞下；配牛膝、枸杞子、五味子、鳖甲、青蒿，则能除热；配菊花、枸杞子、地黄、刺蒺藜、女贞子，则益精明目；配猪胆汁、轻粉，则可治诸热疮有虫久不合口者；配铅丹，则生肌止痛；配木瓜、茯苓、白朮、苍朮、石斛、地黄，则除湿、健四肢；配芍药、甘草，则主治火热腹痛。

龙胆草(本草经)

【别名】龙胆、胆草、草龙胆、山龙胆。

【主要产地】山东、浙江、江西、湖北、四川、广东、广西、江苏、安徽等地。

【药用部分】本品是龙胆科多年生草本植物，其根莖供药用，（以根为主）。干燥根莖长约寸余，外面呈暗灰棕色，有不规则的环纹，顶端有莖痕或残莖，支根长约4寸至7寸，粗约半分，外面呈淡褐色或灰棕色，有微细的皱纹，并有支根的残基。其质柔韧，晒干后，易折断，折断面显黄褐色或棕色，微有香气。




图 13 龙胆(龙胆草)

左、龙胆原植物；右、药用部分外形：1. 莖痕，2. 支根。

【炮制】将原药剪去芦头，湿润切碎，晒干，生用或酒炒用。

【性味和归經】味苦澀，性寒无毒。入肝、胆、膀胱三經。

【应用】本品能泻肝胆之实热，除下焦之湿热，凉肝明目，健脾，定惊。主治湿热惊癇、目赤胬肉、咽痛、肿毒、肝經风热等症。对于脾胃虛弱及无湿热实火者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1两5錢；羊和猪1錢至2錢；兔和雞5分至1錢。

【附歌】龙胆苦寒，泻肝胆热，明目定惊，健脾除湿。

【配伍】配木通、貫众、胡桐淚、玄参（草龙胆散），治馬鼻出黄白膿及肺毒；配菊花、黄芩、木賊、青葙子、决明子、石决明、蟬蛻（山东），治馬云翳遮睛。

【附方】胃腸活（辽宁）：治猪食滯、生眼屎。

龙胆草 蒼朮 大黃 陈皮 枯礪 桔梗 凝水石

以上共研为末，加水內服。

按：龙胆草性寒味苦澀，气味俱厚而沉降，为泻肝火、清湿热健脾胃要药。元素說：“龙胆味苦性寒，气味俱厚，沉而降……其用有四，除下部风湿一也，湿热二也，臍下至足肿痛三也，寒热脚气四也。下行之功与防己同，酒浸則能上行外行，以柴胡为主，龙胆为使，治眼中疾必用之药。”时珍說：“相火寄在肝胆，有泻无补，故龙胆之益肝胆之气，正以其能泻肝胆之郁热也。”

茵陈蒿（本草經）

【别名】西茵陈、綿茵陈、白蒿。

【主要产地】广东、云南、福建、台湾、湖南、山东、湖北、江西、安徽等地。

【药用部分】本品是菊科多年生草本植物，其幼嫩的莖叶供药

用。干燥的叶細裂成綫狀，柔軟，呈黃綠色或灰白色，全面密被白色細茸毛，类似棉絮狀。商品常被挤压成团塊，以供藥用。

【炮制】生用。

【性味和归經】

味苦，性平微寒無毒。入膀胱經。

【应用】本品能清濕熱，去風淨血，利水發汗。主治濕熱、黃疸、水腫、小便不利等症。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪2錢至5錢；兔和雞3分至6分。



图 14 茵陳蒿

【附歌】茵陳苦寒，退熱去濕，發汗消腫，黃疸宜用。

【配伍】配黃連、防風等，治卒熱、草慢、口眼黃等症；配陳皮、青皮、當歸、白朮子、桔梗、甘草等，治五攢痛。

【附方】(1)茵陳散(安驥藥方)治馬五攢痛，頭低前顧難，鼻濕，哽氣，賺起。

茵陳 陳皮 青皮 當歸 白朮子 桔梗 甘草 柴胡 沒

药 杏仁 紫苑 紅花子

以上十二味，沒药、杏仁为末，温韭水、油同調，草后灌之。

(2)茵陈湯(四川):治牛湿热水脹。

茵陈 梔子 大黃 黃柏 五加皮 蒼朮 知母 檳榔 萊
菔子 郁金 甘草 茯苓 車前草

共为末，开水冲服。

按：茵陈为清湿热、治水湿黄疸要药。如为寒症，茵陈常配附子、干姜；而热症则常配合黄柏、梔子、大黃。随着症的不同，配伍入药也各有寒热的不同。在应用上应予以注意。

胡黃連 (开宝)

【别名】胡連。

【主要产地】产于我国南方各省及西藏等地。

【药用部分】本品是玄参科多年生草本植物，其根莖供药用。干燥的根莖为圆柱形，正直或弯曲，长约1寸至2寸余，粗约1分至2分，表面呈灰棕色，全体有横皱纹，根莖上端稍膨大，常有分枝，下侧有圆形根痕；质地轻松，易折断，断面呈黑褐色，中间有类白色的环层。

【炮制】原药生用或酒炒用。

【性味和归经】味苦，性寒无毒。入心、脾、肝、胆四经。

【应用】本品能清湿除热，解毒止痢，杀虫。主治久痢、黄肿、发热惊风、眼赤、咳嗽、虫积腹胀等症。

【用量】馬和牛4錢至1两；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】胡連苦寒，明目凉肝，清热止痢，解毒杀虫。

【配伍】配黃連、大黃、黃葯子、蕭蓄、滑石、甘草、人參、茯苓、木通(胡黃連散),治馬心經煩燥,風癰搖逆。

苦參(本草經)

【別名】苦骨、地槐、水槐。

【主要產地】江蘇、浙江、江西、四川、甘肅、廣東、廣西等地。

【藥用部分】本品是豆科落葉亞灌木,入藥用其干燥根。根呈圓柱形,頂端略膨大,長可達1尺多,粗約3分至8分,外表呈黃色或紫褐色,有顯著縱皺,質堅硬;橫切面呈黃白色,皮層與木部界限明顯,常裂開。莖葉亦作為藥用(見彩圖1)。

【炮制】採集後,除去細根,洗淨泥土,乘新鮮時橫切成半分厚的片,曬干,生用或酒炒用。

【性味和歸經】味苦,性寒無毒。入心、脾、腎三經。

【應用】本品能清熱燥濕,殺蟲去積,健腸胃。主治腎經風熱、熱痢便後出血、小便黃赤、疥癩、虻蟲等症。外用可治疥癩。對於腎冷、脾胃虛弱者禁服。其全草煎汁,亦能殺蟲。

【用量】馬和牛5錢至2兩;羊和豬2錢至3錢;兔和鷄1分至5分。

【附歌】苦參苦寒,清熱燥濕,去積殺蟲,脾虛禁用。

【配伍】配花椒、苦楝皮等,可治疥癩;配桑白皮、枇杷葉、貝母等,可治發喘;配甘草、大黃(牛經),治牛濕熱症。

第三節 清熱解毒藥

山豆根(開寶)

【別名】黃結、金鎖匙、解毒。

【主要产地】广东、山东、广西、河北、湖北等地。

【药用部分】本品是豆科常绿蔓状亚灌木山豆的根。其干燥根呈圆柱形，长约2—3尺，粗约2—3分，其上端有茎痕，栓皮呈赤褐色或黄褐色，有纵皱及沟纹，且有圆形的根痕及凸起的皮孔，质地坚硬；折断面为纤维性，呈暗黄褐色。



图 15 山豆根

左、山豆根原植物；右、药用部分外形：1. 皮孔，2. 根痕，3. 茎痕。

【炮制】将原药洗净，水浸一日，取出润透后，切片晒干，生用。

【性味和归经】味苦，性寒无毒。入心、肺、大肠三经。

【应用】本品能清热解毒，散结止痛。主治咽喉肿痛、发热咳嗽、乳癰、疮黄疗毒等症。

【用量】马和牛5钱至1两2钱；羊和猪2钱至4钱；兔和鸡2分至6分。

【附歌】山豆根寒，清热解毒，咽喉肿痛，诸黄疮癰。



彩色图版 1 苦参

1. 药用部分外形； 2. 枝和花； 3. 着果的枝； 4. 种子。

【配伍】配桔梗、牛蒡子、黃芩、升麻等，治肺熱咳嗽；配射干、玄參、桔梗、牛蒡子、麥門冬、連翹等，治鎖喉黃。

【附方】(1)治馬、騾咳嗽方(河南)。

山豆根 知母 黃芩 桔梗 牛蒡子 大黃 升麻 朴硝
蜂蜜

上藥煎水，候溫灌服。

(2)治牛鎖喉黃(內喉黃)方(江西)。

山豆根 玄參 桔梗 射干 麥門冬 連翹 牛蒡子 黃柏
酒條芩 大黃 元明粉

上藥共為細末，溫開水調勻，灌服。

(3)治豬清水喉方(湖北)。

山豆根 射干 黃柏 黃連 牛蒡子 連翹 大黃 天門冬
生石膏

上藥煎水，內服。

蚯蚓(本草經)

【別名】地龍、土龍、曲蟾。

【主要產地】處處都有。以廣東、江蘇產者較好。

【藥用部分】本品是蚯蚓科環節蟲類蠕形動物蚯蚓的蟲體。干燥的蟲體，其全體已剖開，呈細長條片狀，扭曲而皺縮，長約4寸至7寸，在頸部常見有白色環，全身有多數環節，兩端厚而硬，中間甚薄。入藥以白頸蚯蚓為佳。

【炮制】挖掘後洗淨泥土，放于罐內，加入白糖使其溶化成水，去沉渣用；或用酒洗晒干，生用或研末用。

【性味和歸經】味咸，性寒無毒。入脾、胃、腎三經。

【应用】本品能清热解毒，止咳鎮惊，利水。主治热病惊狂喘咳、肺毒疮癢、耳内流膿、小便不通等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两 5 錢，鮮者 20 至 30 条；羊和猪 2 錢至 3 錢。

【附歌】蚯蚓咸寒，利水鎮惊，清热解毒，治肺毒疮。

【配伍】配夜明砂、明矾等治肺毒疮。

【附方】蚯蚓射干湯（四川）：治猪清水喉。

蚯蚓 射干 山豆根 黄芩 黄连 梔子 知母 玄参 麦門冬 桔梗 青蒿 大黄 白糖（化蚯蚓用）

上药煎水灌服。

山慈姑（本草經）

【别名】金灯、朱姑。

【主要产地】四川、貴州、江苏鎮江、南京、安徽滁县、广西南宁等地。

【药用部分】本品是百合科多年生草本植物，入药用其鳞莖。干燥品略呈倒圓錐形，皺縮，下端膨大，粗約 3 分至 7 分，外表呈黄白色或赤褐色，上部漸狹小，頂端有莖痕，底部周圍生有数多的須根；質堅实而韌，不易折斷。

【炮制】將原药以明矾水漂淨，蒸熟晒干，打碎用或磨汁用。

【性味和归經】味甘微辛，性寒无毒。入肝、胃二經。

【应用】本品能清热解毒，散結消腫。主治咽喉腫痛、癰癤、癰腫、疮癢、疔毒等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和雞 5 分至 8 分。

【附歌】慈姑甘寒，清熱散結，癰疽疮毒，瘰癧結腫。

【配伍】配當歸、滑石、木通、芫花、沒藥、細辛、朴硝、芥子等，治胞轉；配藿香、香薷、柴胡、厚朴等，治時疫暑症。

【附方】慈菇消毒散（四川）：治牛馬癰疮毒。

山慈菇 黃芩 海藻 昆布 甲珠 荊芥穗 青黛 牡丹皮
全蠍 夏枯草 蒲公英
共研末，溫開水沖服。

黃葯子（升室）

【別名】黃葯、赤葯、紅葯子、木葯子。

【主要產地】河北、廣東、山東、江西及東北各省。

【葯用部分】本品是毛茛科多年生藤本植物，入葯用其根。其干燥根，邊緣帶綠褐色，殘留有許多灰褐色纖維根的殘余物，切斷面呈灰黃色。

【炮制】將新鮮根切成大小不等的片狀，晒干，生用。

【性味和歸經】味苦，性平無毒。入心、肺、脾三經。

【應用】本品能涼血降火，和脾胃，解毒消腫，止血定喘。主治疮黃腫毒、衄血、肺熱氣喘、咽喉腫痛、三喉症、蛇犬咬傷等症。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 5 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】黃葯子平，涼血解毒，平氣定喘，疮黃要葯。

【配伍】配白葯子、石決明、大黃、蕪荑、知母、貝母、秦艽、地黃、龍胆草、決明子（補肝散，師皇安驥集），治馬虫食肝病，初得時兩目如腫，伸頭垂耳，頻頻搖項似驚；配川大黃、白葯子、知母、天花粉、貝母、當歸、芍葯、甘草（黃葯子散），治馬七傷。



图 16 黄药子

左、黄药子原植物：1.着花的枝，2.着果的枝；右、药用部分外形。

白药子（唐本草）

【别名】白药。

【主要产地】江西、广东、河北、甘肃等地。

【药用部分】本品是葫蘆科多年生藤本植物，入药用其根。根的邊緣表皮显污白色或灰白色，切断面呈暗白色。

【炮制】将鮮根洗淨，切成大小不等的圓片狀，晒干，生用。

【性味和归經】味辛，性温无毒。入肺、心、脾三經。

【应用】本品功用同黄药子，能消肿解毒，清热止癰。主治喉

中熱痛、創傷、瘡黃、腫毒等症。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 5 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】白朮辛溫，清肺解熱，止嘔化痰，消腫散毒。

【配伍】配天花粉、桑白皮、白朮、芍藥、當歸、白芷、桔梗（白朮子散），治肺氣、低頭難。

【附方】大白朮子散（蕃牧纂驗方）：治馬脾黃初得時精神短少、頭垂、鼻出冷氣，或起臥、慢草、回頭返者。

當歸 五味子 沒藥 細辛 藁本 厚朴 香白芷 牽牛子
青皮 芍藥 白朮子 陳皮

以上十二味為末，生薑擦細、酒調灌之。

按：黃朮子、白朮子，從歷代文獻記載，及古代治療牲畜的方劑來看，均為獸醫常用解熱要藥，其功用為能涼血降火，解毒消腫，止血定喘。元亨說：“涼脾，黃朮子、白朮子”，“涼肺，黃朮子”，又說：“美水草，用當歸為君，陳皮、白芍藥為使，黃朮子、白朮子為佐。”這就說明了黃、白朮子在應用上的不同點，同時也說明了在方劑（指美水草）中運用黃、白朮子為佐藥的重要性。

金銀花（別錄） 附：忍冬藤

【別名】忍冬花、二寶花、雙花。

【主要產地】主產於江蘇、安徽、河南、山東等地。

【藥用部分】本品是忍冬科藤本植物忍冬的花蕾。藤亦作藥用。乾燥的花蕾呈橢圓形，先端稍膨大，下部漸細，微彎曲，長約 5 分至 9 分，頂端粗約半分余，外表為黃白色或淺黃色，密被短茸毛，質地輕松，有芳香氣味。其中產於河南密縣的稱密銀花，品質較好；

产山东济南者称济银花，品质较次；另有一种山银花，系野生，品质最差，也可供药用。




图 17 金银花

左、金银花原植物：1. 着花的枝，2. 着果的枝；右、药用部分外形：1. 萼毛。

【附】忍冬藤 就是金银花藤，呈细长圆柱形，干燥品的外表为土黄色或淡黄褐色，外皮菲薄而柔韧，常纵裂成条线状；质地坚韧而轻松，其横断面呈黄白色，去皮后即可供为药用。

【炮制】金银花生用或炒炭用。藤：去皮，切片用。

【性味和归经】味甘，性寒无毒。入肺、胃、心、脾四经。

【应用】本品能清热解毒。主治热症初起，热在上焦，痄肿疮疖。炒炭则可治热毒血痢。忍冬藤专治痄肿疮毒，初期服之最良。但对虚寒作泻及气虚而腠清者忌用。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 8 分。

【附歌】金銀花寒，清熱解毒，疔治諸瘡，炒炭止痢。

【配伍】配天花粉、桔梗、山豆根、生地黃、玄參、大黃、甘草、黃葯子、白葯子（河南），治牛馬喉頭腫脹啞嗽；配玄參、黃連、梔子、杏仁、阿膠、貝母等，治肺熱啞嗽。

按：金銀花甘寒，能清熱解毒，治一切瘡黃腫毒，為外科要葯。若配貝母、知母、天花粉、白芨、半夏、穿山甲、皂角刺、乳香，可治無名腫毒，使其內消；配黨參、川芎、白芍、黃耆、當歸、白朮、茯苓、桔梗、皂角刺、白芷、甘草，可治癰疽已成而不得內消者。

連翹（本草經）

【別名】連召、元召、連喬、連翹殼。

【主要產地】河南、四川、山西、浙江、安徽、山東、陝西、湖北、甘肅等地。

【葯用部分】本品系木樨科落葉灌木，其果實供葯用。其乾燥的果實呈卵圓形，多數裂開為二瓣或自頂端開裂，長約 5—6 分，粗約 3—4 分，外表呈黃赤色或黃褐色，有黃白色疣狀突起散布在上半部；果殼中央有縱槽，內表面為黃白色而平滑，由縱隔壁將果殼分隔為二室。其種子為黃褐色，呈扁平長形，有微弱的香氣。

【炮制】晒干使其開裂，去淨梗葉，生用。

【性味和歸經】味苦，性微寒無毒。入心、膽、三焦、大腸四經。

【應用】本品能清熱解毒，散結消腫，排膿止痛。主治熱症初起、熱在上焦、瘡黃腫毒、癰癤等症。據“師皇安驥集”的記載：本品能治大小瘡，經絡熱結，瘤根堅硬，心經客熱，尿瀉，消毒用之。馬



图 18 連 翹

左、連翹原植物；右、药用部分外形：1、2.果实外形，3.疣状突起，4.果壳的縱隔壁。

心热已去，膿血尙多，疮久不愈时忌服。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 6 分。

【附歌】連翹苦寒，清熱解毒，治諸疮黃，排膿止痛。

【配伍】配知母、貝母、杏仁、紫苏、白芷、桔梗、天花粉、山藥、甜瓜子、馬兜鈴（連翹散，師皇安驥集），治馬項脊慄、低头難；配桔梗、川貝母、杏仁、知母等，治馬、驃咳嗽；配金銀花、梔子、黃連、黃芩等，治時疫。

【附方】治猪打火印方（山西）。

連翹 梔子 川黃連 酒大黃 貝母 玄參 生地黄 厚朴 陈皮 甘草
共研末灌之。

按：連翹體輕氣浮，其功能是能散上焦的熱及感冒發熱，為外科瘡瘍的要藥。元素說：“連翹之用有三：瀉心經客熱一也，去上焦諸熱二也，為瘡家聖藥三也。”又連翹配桔梗、射干、玄參、甘草，可治咽喉腫痛；配黃連、黃芩、黃柏、知母，可治各種熱症；配皂角，可治瘡毒未發；配當歸、金銀花、赤芍藥、梔子、皂角刺，可治瘡瘍實証。

蒲公英（唐本草）

【別名】蒲公英、黃花苗、黃花地丁。

【主要產地】我國各地均產。

【藥用部分】本品是菊科多年生草本植物，其全草供藥用。干燥品的葉呈皺縮的條片狀，外表呈綠褐色或黃褐色，葉柄有細縱皺，花呈黃褐色，為頭狀花序，外表有黃白色的長毛，且有絹絲樣的閃光。

【炮制】採取後，去淨雜草，洗淨泥土，切成1至2分的小段，晒干，生用或酒炒用。

【性味和歸經】味苦甘，性寒無毒。入脾、胃二經。

【應用】本品能清熱，解毒，散結，消腫。主治乳癰、金瘡、熱毒、胃火草慢、乳汁減少等症。對陰症及瘡毒已潰者忌用。

【用量】馬和牛8錢至2兩；羊和豬2錢至4錢；兔和雞5分至1錢。

【附歌】蒲公英寒，清熱解毒，散結消腫，乳癰亦治。

【配伍】配金銀花等，治乳汁郁滯、乳癰腫痛；配射干、連翹、金銀花、黃藥子、白藥子，治喉症。

【附方】（1）治牛鎖喉黃方（湖南）。

蒲公英 黄耆 射干 牛蒡子 連翹 天花粉 土茯苓 金銀花 淮木通 茵陈 黄药子 白药子 車前草
研末煎水灌服。

(2)治牛鼻流血方。

蒲公英 白糖

先把蒲公英煎水，再加白糖溶化喂下即可。

漏蘆 (本草經)

【别名】野兰、茨蒿、漏奴。

【主要产地】河北、山西、山东、江苏、安徽等地。

【药用部分】本品是菊科多年生草本植物，入药用其根。干燥根呈圆柱形，长约3—4寸，粗约2—3分，外表呈土黄色或赤褐色，有多数粗细不同的扭转纵皱纹，根上端粗大呈根头状，顶端有莖的残基，其四周包拥着许多棕状毛，质硬而轻松；横断面如木质纤维状，呈黄褐色或灰褐色。

【炮制】采取后，除去苗、须根、棕毛，切片，晒干用。

【性味和归经】味咸，性寒无毒。入胃、大肠二经。

【应用】本品有祛风清热、解毒消肿、通下乳汁的功用。主治癰疽恶疮、瘰癧、乳肿、风湿、乳汁不下等症。孕畜忌服。

【用量】馬和牛5錢至1两2錢；羊和猪2錢至4錢。

【附歌】漏蘆咸寒，泄热祛风，消肿解毒，下乳有功。

【配伍】配当归、芍药、海带，治母畜产仔后腰胯痛；配金银花、連翹、甘草，用于恶疮未溃者。

【附方】补益当归散(畜牧纂驗方)：治母馬产駒后腰胯痛及腰胯无力并恶血連日不止，或蹙閃着腰，兼肉颤負痛。

当归 芍药 海带 漏芦 没药 荷叶 红花 连翘 龟板
虎骨 胡蘆巴 补骨脂 甜瓜子 血竭 自然銅 骨碎补
上药十六味，为末，酒、小便同调灌之。如马产后病，用温酒、小便，应急灌之。

胡桐淚 (唐本草)

【别名】胡桐脂、胡桐硷、胡桐律、胡桐瀝、呀喇菩。

【主要产地】甘肃、蒙古等地，广东亦有栽培。

【药用部分】本品是金絲桃科常綠乔木胡桐树的脂液。因虫食其树，致使树脂渗入土中，久则结成坚实之块，其状类似黄矾，以结块如石片而色如土者为佳。

【炮制】采后去净泥土，生用。

【性味和归经】味咸苦，性大寒无毒。入胃经。

【应用】本品能清热解毒，消胀满，催吐，杀虫。主治牛马急黄、黑汗风、咽喉热痛、心腹胀满等症。无热毒者忌用。



图 19 胡桐淚

【用量】马和牛 1 两至 2 两 5 钱；羊和猪 3 钱至 6 钱。

【附歌】胡桐淚寒，清热解毒，催吐杀虫，并消胀满。

【配伍】配血竭、没药、芸苔子、当归、郁金（一捻金散），治马五攒痛蹙损肺经。

【附方】治牛马风热出汗不止（兽医国药及处方）。

胡桐淚

葱、醋、水研灌服。

半边蓮（綱目）

【別名】急解索。

【主要产地】我国南方各地均有野生。

【药用部分】本品是桔梗科多年生草本植物，其全草供药用。新鲜全草，其莖就地蔓延，随节生根，甚易繁殖；叶互生，呈綫形或披針形。于夏秋之間，自叶腋抽花梗，頂端生单一朵淡紅色或淡紫色的小花，花瓣分裂成为五片，偏向一方，类似一朵花縱剖的一半，且其顏色象蓮花，故名半边蓮。

【炮制】采后去淨泥土，采取新鲜者搗汁內用，或涂患处。

【性味和归經】味辛，性平无毒。入肝、肺二經。

【应用】本品有散瘀消肿，解毒，化痰定喘等功用。主治癰疽疮肿、哮喘、虫蛇咬伤等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】半边蓮平，散瘀消肿，疗疮蛇伤，解毒佳良。

靛藍（开宝）

【別名】靛花、青蛤粉、螺青。

【主要产地】我国各地均有出产。

【药用部分】本品是蓼科〔注〕一年生草本植物蓼藍制得的靛

〔注〕 另有爵床科植物藍靛、豆科植物小青、十字花科植物大青等，亦为制取藍靛的原料，可获得青黛。

花。为无臭无味而輕松的青藍色粉末，置于日光及空气中，亦不起变化，热之則放青紫色的焰而升华。

【炮制】取靛桶中浮起者，晒干用。

【性味和归經】味咸，性寒无毒，入肝經。

【应用】本品能散五脏郁火，凉血解毒，止血杀虫。主治惊癇发热、热癰疮毒、蛇犬咬伤、衄血、血痢。外用治口舌生疮。“师皇安驥集”記載：“疮肿用之良，治駒腹热，瘦弱，又治馬中葯毒，受物惊。”“元亨疗馬集”記載：“导热、凉三焦。”

【用量】馬和牛4錢至6錢；羊和猪1錢至2錢；兔和鷄1分至2分。

【附歌】青黛咸寒，散郁清火，惊悸血痢，外治疮肿。

【配伍】配黄柏、訶子、明矾（青黛散），治馬心毒、舌上生疮；配知母、貝母、薄荷、郁金、川芎、牛蒡子（螺青散），治馬心噬日久不愈；配苏薄荷，共杵成餅，塞入猪口內，治猪喉閉不能作声（猪經大全）；配馬勃、孩兒茶、硃砂、薄荷、甘草、人中白、冰片、硼砂、白僵蚕，共为細末，为猪清水喉吹喉葯，牛的喉火亦用（四川）。

板藍根（別录）

【主要产地】河南、河北、江苏及华南各地。

【葯用部分】本品是十字花科二年生草本植物大青的根（板藍根）。其根呈圓柱形，長約5寸至9寸，外表为黃褐色，有显著的縱皺；橫断面有一棕色环紋，木部有放射狀綫紋。

【炮制】采取后，洗淨晒至半乾，扎成小把理直，再行晒下，切斷用。

【性味和归經】味苦，性寒无毒。入肝、胃二經。




图 20 板藍根

左、板藍根原植物(大青)； 右、药用部分外形：根斜切面及根横切面。

【应用】本品能清热解毒，凉血止血。主治血热、热毒泄痢、黄疸、喉痹等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两。

【附歌】板藍根寒，清热凉血，血热泄痢，喉痹亦治。

【配伍】配吳兰、甘草、大青、郁金、茯苓、黄葯子、人参等，治馬心黄病；配当归、黄芩、防风、荆芥、連翹、金銀花、白芷、知母、黄柏、薄荷、梔子、木通、黄葯子、蟬蛻、天花粉(河北)，治遍身黄。

紫参 (本草經)

【别名】牡蒙、童腸、馬行、五鳶花。

【主要产地】河北、山东、甘肅及东北各省深山湿地均有出产。

【药用部分】本品是蓼科多年生草本植物，入药用其根莖。根

形类似地黄,但稍长,有节状,每节間长约寸余,即有細条連續之,作連珠状,外面呈黑褐色,收藏多年后,外表即显紫黑色,并被有褐色的粉衣;其折断面,肉少而皮厚,带紅白色,状如小紫草。藥用的紫参以青赤色为良。

【炮制】采后晒干,或火炙,使色轉变成紫色用。

【性味和归經】味苦,性寒无毒。入肝經。

【应用】本品能清熱散結,破血消癰,生肌止痛,补虛益氣。主治瘀血积聚、寒熱邪氣、腸胃有熱、癰腫諸瘡、赤白痢等症。对于无瘀滯及脾胃虛寒者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩。

【附歌】紫参苦寒,功端入肝,清熱止痛,破血消癰。

【配伍】配玄参、甘草,治阴戶流血(子宮出血);配苦参、生地黄、牡丹皮,治血熱。

【附方】五参散(元亨疗馬集):治驃馬肺風熱燥。

紫参 苦参 沙参 元参 秦艽 何首烏

共研末,用蜂蜜、酸漿水,皂角搗碎取汁,同調灌之。

菉豆 (开宝)

【别名】綠豆、拔綠、摘綠、青小豆。

【主要产地】我国各地都有出产。

【藥用部分】本品是豆科一年生草本植物綠豆的种子。呈橢圓形,外表光滑,显綠黄色或暗綠色,一側上端有白色的种臍,呈長圓形槽状,种皮薄而韌,剝离后露出淡黄色或黃白色的种仁,肥厚,質堅硬,有子叶二枚。

【炮制】搗碎用,或磨粉用(有的主張去壳用)。

【性味和归經】味甘，性寒无毒。入心、胃二經。

【应用】本品能除热毒，清內热，散风消肿，下气，清暑止渴，利水。主治暑热煩渴、肿脹、泻痢、痛肿热毒、痘毒及中毒等症。

【用量】馬和牛 3 两至 1 斤；羊和猪 1 两至 2 两。

【附歌】菹豆甘寒，清心退热，散风消肿，解毒最良。

【配伍】配甘草，可治棉子餅中毒；配黑豆、青盐，能解砒霜中毒。

【附方】吃砒中毒方（山西）。

綠豆 甘草 明矾 食盐

先将豆面用水作成糊状，然后把其余三种药搗碎混在一起，加适量之水灌之。

按：綠豆味甘性寒，功能清內热，潤燥，滋阴降火，若毒邪內熾，服后解毒效能甚佳。李时診說：“綠豆肉平，皮寒，解金石砒霜草木一切諸毒，宜連皮生研水服。”孟詵說：“补益元气，和調五脏，安精神，行十二經脉，去浮风，潤皮肤，宜常食之，煮汁止消渴。”

白藜（本草經）

【别名】白草、白根、猫兒卵。

【主要产地】湖南、湖北、江西、河北、山东、江苏、安徽、河南、浙江、广东等地。

【药用部分】本品是葡萄科藤本植物，入药用其干燥塊根。一株有 10 多个連結于根莖部，塊根的中部膨大，两头带尖，呈紡錘形，长约 2—3 寸，粗約 6—7 分，外表呈紅褐色或暗褐色，有縱皺和橫裂，內面呈灰白色或灰褐色，質輕松而脆。

【炮制】除去根头和杂质，斜切成片，晒干，生用。

【性味和归經】味苦，性平无毒。入心、肝、脾、胃四經。

【应用】本品能清热解毒，散結聚，消肿止痛。主治肺劳伤、疔疮肿毒、結聚肿痛、火烫伤，并能解狼毒之毒。外涂治疮黄肿毒。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和鷄 2 分至 4 分。

【附歌】白藪苦平，散結消肿，清热解毒，消肿止痛。

【配伍】配黄柏、密陀僧、龙骨、烏賊骨、杜仲，治恶疮；配天南星，治背疮。

【附方】白藪散（蕃牧纂驗方）：治馬背疮。

白藪 天南星

共为細末，盐水洗淨疮口后，涂敷。

八角蓮（綱目拾遺）

【別名】独脚蓮、天車草、独叶一枝花。

【主要产地】江西、广西、台湾等地。

【葯用部分】本品是小蘗科多年生草本植物，入葯用其干燥根莖。长约 2 寸至 3 寸，粗約 6 分至寸余，外層呈灰褐色，形似射干，有多数須根的痕跡；質地坚硬，不易折断，断面不平，呈淡黄色（見彩图 2）。

【炮制】挖取后，洗淨泥土，除去須根，乘新鮮用或晒干生用。

【性味】味辛，性温有毒。

【应用】本品能消肿解毒，疗肿癰，解蛇毒。主治癰疽肿痛、毒蛇咬伤、毒虫刺伤、蠱毒、草木毒等。

【用量】羊 5 分至 1 錢。

【附歌】八角蓮温，主治蛇伤，癰疽肿痛，醋磨汁敷。

【配伍】配醋或口涎磨汁敷，治蛇咬伤；配酒内服，治毒蛇咬伤。

【附方】治牛锁喉黄方(广西)。

八角莲 金狗胆 冰片

共研末吹入喉内。

第四节 清热凉血药

犀角(本草经)

【主要产地】印度、泰国、苏门答腊、爪哇、非洲等地。

【药用部分】本品是犀科动物犀牛的鼻角。其全形略呈圆锥形，稍弯曲，角长约3寸至9寸余。上部呈黑褐色，有纵向的纹理(称为顺纹)，表面光滑，但有时现深裂缝；角的下部渐粗，纹理粗而乱，质地坚实。商品为镑片，呈灰白色，甚菲薄，弯曲不平，间有灰白色的花点(称为蘆花色、芝麻点)，有微弱的香气。

【炮制】水磨及剉末冲服，或镑片用。

【性味和归经】味苦酸咸，性寒无毒。入心、肝、胃三经。

【应用】本品能清心热，凉血，解毒，定惊。主治时疫、惊狂、胃中大热、衄血、下血等症。对于血分无实热者忌用。

【用量】马2钱至3钱。

【附歌】犀角酸寒，清热凉血，解毒定惊，癫狂得宁。


【配伍】配地黄、牡丹皮、芍药、郁金、麦门冬、白檀香(犀角散，师皇安骥集)，治马衄血。配白茅根、大青叶、地榆、槐花、牡丹皮、黄芩、椿白皮、枳壳、大黄、朴硝、天花粉、白芍、蜂蜜(河北)，治马大便下血。

按：犀角为散邪清热之药，但犀角凉血解毒，偏重血分，故多



彩色图版2 八角蓮(独脚蓮)

1. 八角蓮原植物(栽培型); 2. 着花的枝背面(野生型);
3. 花; 4. 雌蕊; 5. 雄蕊的正面及侧面。



用于实証。

生地黃（本草經） 附：干地黃

【別名】生地、大生地、鮮生地。

【主要产地】四川、河南、浙江、江苏等地。

【药用部分】本品是玄参科多年生草本植物地黃的根。新鮮时称生地黃或鮮地黃，干燥后称干地黃。

生地黃：呈圓柱狀紡錘形，長約2寸至5寸，粗約2分至6分，外表呈黃色，稍彎曲，質嫩而脆，橫斷面外層呈淺黃色，中心木部為灰白色。

【附】干地黃：呈紡錘形，外面呈黃褐色、皺縮屈曲，有深縱溝及細皺，質軟而韌，橫斷面呈黑褐色。

【炮制】將鮮生地洗淨，放焙炕上炕干，隨即用手揉圓，即成干地黃，切片生用；鮮生地洗淨切斷用，或搗汁用。

【性味和归經】味甘苦，性寒無毒。入心、肝、腎、小腸、心包五經。

【应用】干地黃能滋陰降火，養血。主治血虛發熱、勞傷咳嗽、衄血、下血、胎動不安等症。

生地黃能清熱涼血。主治肺胃實熱、口燥煩渴、咽喉腫痛、血熱津枯、衄血、舌瘡、下血等症。

【用量】馬和牛5錢至1兩半；羊和豬2錢至4錢；兔和雞3分至6分。

【附歌】生地甘寒，清熱涼血，肺胃實熱，止鼻衄血。

【配伍】配熟地、天門冬、地骨皮、黃連、人參、甘草、黃芩、當歸、枳殼（地黃散，元亨疔馬集），治馬內障，碧暈浸睛，瞳人遮障，不

能顧物；配黃柏、黃芩、當歸、紫檀香、芍藥、梔子、甘草（涼榮散，師皇安驥集），治馬鼻出血。

按：生地黃、干地黃、熟地黃三種均為一物，但在功用上稍有不同。生地黃多用于肺胃實熱、口燥煩渴之症；干地黃多用于滋陰養血或血虛內熱之症；熟地黃則用于補陰生精。元素說：“生地涼血，血熱者須用。熟則微溫，血衰者須用。”

牡丹皮（本草經）

【別名】丹皮、粉丹皮。

【主要產地】湖北、安徽、四川、山東、湖南、陝西、甘肅等地。

【藥用部分】本品是毛茛科落葉灌木牡丹的根皮。其干燥的根皮呈管狀或半管狀。稍彎曲，長約2寸至4寸，粗約4至5分，外表呈赤褐色或淡紅黃色，質堅而脆，斷面呈灰白色，為粉質，有微弱的芳香氣味。

【炮制】原藥濕潤，待變軟後，切片晒干，生用、酒炒用或炒炭用。

【性味和歸經】味辛苦，性微寒無毒。入心、肝、腎、心包四經。

【應用】本品能清熱涼血，消瘀定痛。主治血熱、氣痛、衄血、便血、產後發熱、腰痛、跌打瘀血并治癰疽疔瘡等症。“元亨疔馬集”謂能行血。對於胎妊者忌服。

【用量】馬和牛5錢至1兩2錢；羊和豬2錢至4錢；兔和雞4分至7分。

【附歌】丹皮辛寒，清熱涼血，消瘀止痛，癰腫疔瘡。

【配伍】配馬鞭草、川芎、當歸、地黃、甘草、芍藥（補血散，師皇安驥集），治瘀血；配紫苑、胡黃連、貝母、朴硝、黃芩（河北），治馬鼻

腔受傷，流白膿或流清水。

按：牡丹皮、地骨皮均為清熱要藥，但在功用上各有不同。牡丹皮退無汗之熱較好，地骨皮退有汗之熱為佳。潔古說：“牡丹皮入腎、心包，故治無汗之骨蒸，地骨皮入腎、三焦，故治有汗之骨蒸。要皆二物能涼血之功也。”

地骨皮（本草經）

【別名】全皮。

【主要產地】主產於甘肅、寧夏、陝西、山西等地。其他各省也有出產。

【藥用部分】本品是茄科落葉蔓生灌木枸杞的根皮，以老根皮為佳。乾燥的老根皮，呈半管狀塊片，長約寸余，粗約2至4分，外表呈灰黃色或黃褐色而粗糙，有縱向裂紋及斑塊；橫斷面分為內外兩層，外層呈灰黃色，質松軟；內層為灰色，質硬而脆。

【炮制】生用或炒用。

【性味和歸經】本品味甘，性寒無毒。入肺、肝、腎、三焦四經。

【應用】本品能涼血瀉火，清肺熱，除骨蒸，止煩渴，益精氣。主治陰虛咳嗽衄血、煩熱消渴、血虛骨蒸等症。對於脾胃虛寒及下痢者忌服。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬2錢至5錢；兔和雞2分至6分。

【附歌】地骨皮寒，清熱涼血，骨蒸勞熱，益氣消渴。

【配伍】配桑白皮，治肺熱咳嗽；配瞿麥、滑石、生地炭、玄參、黃芩、黃柏等，治勞傷尿血。

白头翁 (本草經)

【主要产地】安徽、江苏、河南、广东等地。

【药用部分】本品是毛茛科多年生草本植物，入药用其根。干燥的根呈圆柱形，稍弯曲，长约2至6寸，粗约3至4分，外表呈灰褐色，粗糙而有不规则的纵沟槽，上端稍膨大，外面被有白色茸毛，质硬而脆，横断面呈黄白色。此外，南方也使用“翻白草”及“委陵菜”当作白头翁，翻白草与委陵菜均系蔷薇科多年生草本植物。

【炮制】将原药洗净泥土，剥去茸毛，切断晒干，生用或炒用。

【性味和归经】味苦，性寒有小毒。入胃、大肠二经。

【应用】本品能清热、凉血、止痢。主治热毒赤痢、下血腹痛、鼻衄等症。

【用量】马和牛5钱至1两5钱；羊和猪2钱至4钱；兔和鸡5分至1钱。

【附歌】白头翁寒，凉血清热，热毒赤痢，功效颇捷。

【配伍】配黄连、黄柏、秦皮等，治热痢下重；配龙胆草、黄连（白龙散，江西），治小猪痢疾。

【附方】治兔不食草方（兽医国药及处方）：治兔消化不良，食欲



图 21 白头翁

不振。

白头翁 厚朴 枳實 砂仁

以上共研為細末，開水沖，候溫灌服。

紫草（本草經）

【別名】紫丹。

【主要產地】廣西、雲南、貴州、新疆、甘肅、陝西及東北各地。

【藥用部分】本品是紫草科多年生草本植物，入藥用其根。干燥根呈圓錐形或圓柱形，扭曲，下部常生有支根，外表呈紫褐色，有皺紋及溝槽，長約3至4寸，粗約5分至1寸；質堅而脆，易折斷，橫斷面呈紫褐色，但中間的一層顯黃色，有特殊的臭氣。

【炮制】切斷生用。

【性味和歸經】味甘咸，性寒無毒。入肝、心包二經。

【應用】本品能涼血活血，通竅滑腸，利水解毒。主治痘瘡、癰腫、大便燥結等症。對於腸胃虛弱、大便滑瀉者忌用。

【用量】馬和牛3錢至1兩；羊和豬1錢至3錢；兔和雞1分至4分。

【附歌】紫草苦寒，利水滑腸，癰腫痘瘡，解毒尤良。

【配伍】配黨參、當歸、芍藥、白朮、茯苓，治痘瘡氣血不足；配瓜蒌仁，治癰腫；配木通、通草等，治尿血。

【附方】治牛急性尿血方（浙江）。

紫草 木通 通草 牽牛子 羌活 沒藥 牛膝 芍藥 白茅根 柴胡 青蒿 當歸

煎水，加雞蛋內服。

槐花 (本草經)

【别名】槐米、槐花米、槐塵米。

【主要产地】主产于江苏、山东、安徽等省。其他各地也有出

产。

【药用部分】本品是豆科落叶乔木槐树未开放的花蕾（槐米）及花。槐米的药效较好。未开放的花蕾，形状类似米粒，色黄绿，开放后则成为黄白色的蝶形小花朵。干燥的花蕾呈椭圆形，外表呈黄赤色，全长约1至3分，质轻，微有特殊的气味。

【炮制】拣净梗、叶，生用或炒炭用。

【性味和归经】味苦，性平无毒。入肝、大肠二经。

【应用】本品能凉血清热，止血杀虫，凉大肠，润肝燥。主治大便泻血、赤白痢疾、衄血、目赤、腹内生虫及皮肤风热等症（炒研服）。对妊娠及无实火者忌用。

【用量】马和牛5钱至1两；羊和猪2钱至4钱。

【附歌】槐花苦平，清热凉血，赤白痢疾，衄血目赤。

【配伍】配芍药、黄柏、梔子、升麻等，治便血；配车前草、红糖，治尿血。

【附方】槐花散（师皇安骥集）：治马尿血。

槐花 芍药 黄柏 梔子 升麻 黄连 柴胡 厚朴 甘草
上药共为末，用水调匀，根据马的大小，每次灌约6至8合。

槐角 (本草經)

【别名】槐实、槐子、槐角子。

【主要产地】同槐花。

【藥用部分】本品是豆科落叶乔木槐树的成熟而未开裂的莢果。干燥者呈連珠狀，稍彎曲，長約1寸左右，外表呈黃綠色或黃褐色，光滑而無毛，有凹陷及皺縮，質堅實；種子為長圓形或腎臟形，呈黑褐色，平滑而有光澤。

【炮制】采收后，去淨梗、叶及被虫蛀者，捶破蒸用。

【性味和归經】味苦，性寒無毒。入肝經。

【应用】本品功用同于槐花，但性偏于下降，能催生墮胎，明目止泪。主治便血、脫肛、母畜乳結、杀虫等症。对于胎娠及无实热者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】槐角苦寒，功同槐花，大便瀉血，脫肛效佳。

【配伍】配防风、地榆、升麻、黃連、蒼朮、白芍等，治痢疾。

【附方】治痢疾方(江西)：治牛魚腸痢。

槐角 槐花 防风 北秦艽 蒼朮 地榆 升麻 柴胡 大腹皮 白芍 黃連

上藥研為末，用開水沖，稍涼灌服。

白茅根（本草經） 附：白茅花

【別名】茅根、絲茅根、地筋根、黃茅藎。

【主要产地】我国各地均产。

【藥用部分】本品是禾本科多年生草本植物白茅的根。其干燥根莖呈綫形，粗約半分至1分，外面呈黃白色，有多数帶根痕的竹节样結节，节上生有少数細根，質輕，由节上易斷，橫断面呈黃白色。

【附】白茅花 花穗密集，呈圆锥花丛，长约2寸至5—6寸，有白色丝状长绒毛生于小穗的顶端，质轻松，其种子成熟时可随风吹散。

【炮制】一般随采随用其新鲜品，但亦可晒干用。

【性味和归经】根：味甘、性寒。花：味甘、性温。均无毒。入心、脾、胃三经。

【应用】本品能除伏热、解烦渴、消瘀血，止血、利水。主治鼻衄、尿血、内热烦渴、小便不利、热淋、肺热喘急等症。花：有止鼻衄的功效。对于虚寒无实热及不渴者忌用。

【用量】马和牛6钱至1两5钱；羊和猪3钱至5钱。

【附歌】茅根甘寒，利水止血，除热解渴，衄血尿血。

【配伍】配梔子、黄芩、地黄、侧柏叶，治鼻出血；配木通、通草、当归等，治血尿。

【附方】(1)治牛尿血方(浙江)。

白茅根 木通 通草 牵牛子 羌活 没药 牛膝 芍药
柴胡 紫草 当归 青蒿

上药煎水，加鸡蛋内服。

(2)治鼻出血方(陕西)：治鼻孔出血和滴血。

白茅根 生地黄 焦梔子 生柏叶 天门冬 茜草根 甘草
藕节 大蓟 小蓟 白糖

以上共为末，用水调匀，灌服。

食盐 (别录)

【别名】青盐、海盐、井盐。

【主要产地】青盐主产于沿海地区，其中以浙江、江苏、山东等

地產量較多，一般又稱海鹽，四川等地出產者稱為井鹽。

【原藥形態】粗制者為白色或灰白色的結晶，純品為白色的結晶性粉末；井鹽多為塊狀。

【炮制】一般使之化水入藥，亦作炒研用。

【性味】味咸，性寒無毒。入腎、心、胃三經。

【應用】本品能清熱解毒，潤燥涼血，開胃化食，明目固齒，引諸藥下降。主治冷氣痛、糞結、小便不利，并可殺蟲。對於水腫血虛者忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 2 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢。

【附歌】食鹽咸寒，潤燥涼血，破積暖腎，引藥下降。

【配伍】配黃連、牙硝等，治目疾；配寒水石、地黃、滑石、朴硝等，治牛結喉；配竹節灰，治白膜遮眼。

【附方】(1)治白膜遮眼(元亨疔馬集)。

食鹽炒過 竹節灰

上藥相和，撒在白膜上，候膜退即痊。

(2)消毒散(元亨疔馬集)：治馬誤食毒草，口中吐沫，悶絕欲死。

白矾飛 食鹽炒

上藥研末拌勻，塗于舌上，停好久，用甘草末、水煎灌服。

表 25 清热药归纳简表

类别	药名	性 味 及 归 经	功 用	用 量 (錢)		
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄
清 热 降 火 药	知 母	苦寒,入肺、肾、胃	降火止渴,清肺消痰	4—15	2—4	0.2—0.6
	玄 参	苦咸微寒,入肺、肾	降火滋阴,目赤咽痛	5—15	2—4	0.4—1
	梔 子	苦寒,入心、肺、三焦	清热泻火,利胆止血	5—12	2—4	0.5—1
	石 膏	辛甘寒,入肺、胃、三焦	清热降火,止渴生津	5—20	2—5	0.5—2
	夏枯草	苦辛寒,入肝、胆	清火散结,目赤癰肿	5—20	2—4	0.5—1
	蘆 根	甘寒,入肺、胃、肾	清热降火,止渴利水	6—20	3—6	—
清 热 燥 湿 药	茶 叶	苦甘寒,入心、肾、胃	清热降火,利水提神	5—15	3—5	—
	黄 連	苦寒,入心、肝、胆、胃、大腸	泻火燥湿,止痢明目	3—10	1—2	0.2—0.5
	黄 芩	苦寒,入心、肺、大腸、肝、胆	能泻肺火,清热解毒	5—15	2—3	0.4—0.8
	黄 柏	苦寒,入肾、膀胱	泻火除湿,热痢目赤	5—12	2—4	0.2—0.6
	龙胆草	苦寒,入肝、胆、膀胱	泻肝胆火,并除湿热	5—15	1—2	0.5—1
	茵陈蒿	苦平微寒,入膀胱	清热去湿,利水除黄	5—15	2—5	0.3—0.6
清 热 解 毒 药	胡黄連	苦寒,入心、脾、肝、胆	清湿解热,解毒杀虫	4—10	1—3	0.2—0.5
	苦 参	苦寒,入心、脾、肾	清热燥湿,去积杀虫	5—20	2—3	0.1—0.5
	山豆根	苦寒,入心、肺、大腸	清热解毒,咽喉肿痛	5—12	2—4	0.2—0.6
	蚯 蚓	咸寒,入脾、胃、肾	清热镇惊,利水解毒	4—15	2—3	—
	山慈姑	甘微辛寒,入肝、胃	清热解毒,散结消肿	4—10	2—3	0.5—0.8
	黄药子	苦平,入心、肺、脾	凉血定喘,外治疮黄	6—20	2—5	0.4—1
清 热 解 毒 药	白药子	辛温,入肺、心、脾	清肺化痰,消肿散毒	6—20	2—5	0.4—1
	金銀花	甘寒,入肺、胃、心、脾	清热解毒,散黄消肿	6—20	2—4	0.4—0.8
	連 翹	苦微寒,入心、胆、三焦、大腸	清热解毒,散结消肿	5—20	2—4	0.2—0.6

(續)

类别	药名	性味及归經	功 用	用 量 (錢)		
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄
清 熱 解 毒 藥	蒲公英	苦甘寒,入脾、胃	清热解毒,散結化食	8—20	2—4	0.5—1
	漏 蘆	咸寒,入胃、大腸	清熱祛風,解毒消腫	5—12	2—4	—
	胡桐淚	咸苦大寒,入胃經	清熱解毒,去脹杀虫	10—25	3—6	—
	半边蓮	辛平,入肝、肺	解毒定喘,散瘀消腫	5—20	2—4	0.2—0.5
	青 黛	咸寒,入肝	涼血解毒,外治瘡腫	4—6	1—2	0.1—0.2
	板藍根	苦寒,入肝、胃	清熱涼血,止痢解毒	5—10	—	—
	紫 參	苦寒,入肝	清熱破血,散結消腫	5—10	—	—
	菝 豆	甘寒,入心、胃	解毒厚腸,散風消腫	30—160	10—20	—
清 熱 涼 血 藥	白 薇	苦平,入心、肝、脾、胃	散結消腫,清熱解毒	4—10	2—3	0.2—0.4
	八角蓮	辛溫	解毒消腫,蛇傷虫傷	—	0.5—1 (羊)	—
	犀 角	苦酸咸寒,入心、肝、胃	清熱涼血,解毒定驚	2—3 (馬)	—	—
	生地黃	甘苦寒,入心、肝、腎、小腸、心包	清熱涼血,止鼻衄血	5—15	2—4	0.3—0.6
	牡丹皮	辛苦、微寒,入心、肝、腎、心包	清熱涼血,消瘀止痛	5—12	2—4	0.4—0.7
	地骨皮	甘寒,入肺、肝、腎、三焦	泻火涼血,咳嗽止血	5—15	2—5	0.2—0.6
	白頭翁	苦寒,入胃、大腸	清熱涼血,赤白痢疾	5—15	2—4	0.5—1
	紫 草	甘咸寒,入肝、心包	涼血活血,解毒治瘡	3—10	1—3	0.1—0.4
清 熱 涼 血 藥	槐 花	苦平,入肝、大腸	清熱涼血,止血治痢	5—10	2—4	—
	槐 角	苦寒,入肝經	清熱涼血,便血催生	5—10	2—4	0.2—0.5
	白茅根	甘寒,入心、脾、胃	清熱解渴,止血利水	6—15	3—5	—
	食 鹽	咸寒,入腎、心、胃	清熱涼血,開胃利腸	4—20	1—3	—

第二章

解表藥

凡能发散肌表外邪、解除表証的藥物，就称为解表藥。

表証就是动物体由于外感风邪所引起的初期病症，一般表现为行动呆滯，精神萎靡，背拱，毛立而粗乱，食欲不振，恶寒振顫，发热，肌肉或骨节痛，无汗或微汗等症狀。由于辛味藥都有发散肌表外邪和行气的作用，能使病邪通过发汗而从肌表外解；又因辛温解表藥能去风寒，寒凉解表藥能去风热；所以这类的藥物大部分是味辛、性温或性凉的藥物。

味辛性温或热的藥物，适用于因受风寒外邪所引起的表証，例如恶寒重、发热輕、头重、骨节痛、口不渴等表証，以便发散风寒。

味辛或苦而性寒或凉的藥物，适用于因感受风热所引起的表証，例如恶寒輕、发热重、头重、目赤、口渴等，以便发散风热。

凡体質健壯，气血充足，发热无汗，以及在秋冬气候寒凉时，解表藥可用重剂；若发热时仅有微汗，且在春夏气候温暖时，则解表藥宜用輕剂。

对于虛弱、津液不足的病畜，不可应用解表藥，如果必須采用，則应配合补养藥，采取扶正发表并施的方法。

茲將本章藥物分為辛溫解表藥和寒涼解表藥兩類敘述于下。

第一节 辛溫解表藥

麻黃（本草經）

【別名】麻絨。

【主要產地】山西、河南、河北、甘肅、內蒙等地均產，其中以山西大同產者為最好。為我國著名的特產藥材之一。

【藥用部分】本品是麻黃科多年生草本植物，入藥用其地上莖部。干燥的麻黃莖，類似席草，略扁平，微粗糙，呈黃綠色，有節，并有細縱綫紋，質堅而脆，易折斷，中心空，亦有稍充實者。

【炮制】將原藥去淨節根，切成5—6分長的小段，生用或蜜炙用（做煎劑時先以開水泡去沫）。




圖 22 麻黃(木賊麻黃)

【性味和歸經】本品味辛、苦，性溫無毒。入肺、心、大腸、膀胱四經。

【應用】本品(莖)有開腠發汗、止咳平喘、通竅、利水等功用。

主治风寒表証、无汗、恶寒、头重、骨节疼痛、外感咳嗽、气促喘急、水肿等症。病畜肺虚喘咳及多汗者忌用。

【用量】馬和牛4錢至8錢；羊和猪1錢至3錢。

【附歌】麻黄性温，发散表寒，外感咳喘，多汗禁用。

【配伍】配白果、款冬花、桑白皮、杏仁、制半夏、苏子、黄芩、藿香(定喘湯)，治猪喘气病；配天南星、全蝎、白附子、白僵蚕、烏梢蛇、川芎、刺蒺藜、海桐皮、防风、黑附子、甘草、藁本、天麻、桂心(麻黄散、蕃牧纂驗方)，治馬心脏虚热。

【附方】麻黄散(安驥药方)：治馬慢病、把前把后、腰硬膝細、气喘項脊悽。

麻黄去节根 麦芽 百部 紫苑 百合 紫苏子 干地黄

山药 枇杷叶去毛 柴胡 茴香 杏仁去皮尖

上药十二味为末，蕎面、瓜蒌(瓢)为引，草后灌之，隔日再灌。

按：麻黄是解表发汗药，其退热、平喘、利水之功，全賴解表之力。因风寒病始侵畜体，留連肌表，气血凝滯，毛窍閉塞，内热不得外泄，痰水入肺不散，患畜因此表現肌肤寒颤、頸直脊硬、四肢拘急、口内发热、咳逆上气等症狀，此时用麻黄解表发汗，内热随汗而出，风寒得以解散，痰水因此下行，病机因而解除，諸症即恢复正常。但由于麻黄发汗力强，故肺虚喘咳及夏季毛窍疏泄时忌用，否则会造成亡阳、亡血的現象。

麻黄根虽同麻黄为一物，而在功用上則相反，例如麻黄发汗，其根則止汗。

荆芥(本草經)

【别名】江芥、芥穗。

【主要产地】江西吉安、浙江杭州笕桥、湖北广仁、甘肃、四川、湖南、河南、山西等地。

【药用部分】本品系唇形科一年生草本植物，其干燥的全草供药用。莖方形，长约1—2尺，呈紫红色或黄红色，被有短绒毛，叶对生，有柄，为羽状深裂，两面均有绒毛，其花穗着生于枝顶，小花轮生于花轴上，有特异的芳香气味。以莖细色紫穗长者为最好。



图 23 荆 芥

左、荆芥原植物；右、各部名称：1.节上对生枝叶，2.小花，3.花轴。

【炮制】将原药切碎晒干，生用或炒成炭用。芥穗炒焦用。

【性味和归经】味辛苦，性微温无毒。入肺、肝二经。

【应用】本品能发散风寒，退热，祛风，胜湿，散瘀，凉血，解毒，消食滞，利咽喉。主治外感发热、头重、目赤、咽喉肿痛；炒黑止衄血、便血等症。但对于表虚自汗者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和豬 2 錢至 3 錢；兔和雞 5 分至 1 錢。

【附歌】荊芥辛溫，發表祛風，清熱解毒，寒邪堪用。

【配伍】配防風、蒼朮、艾葉、薄荷（荊芥湯），治腎敗垂縷不收；配防風、滑石、黃連、梔子、菊花等，治兩眼赤濁。

按：荊芥辛苦而溫，氣味輕揚芳香而散，故為入血分之藥。凡邪盛寒熱，用荊芥發汗則邪散肌解，寒熱自愈；如熱血有濕生惡瘡時，因其涼血燥濕則瘡自脫；瘀血結聚，因辛溫之力則可散；風寒濕三邪痹痛，因其燥濕散寒則痹痛可除。張山雷說：“荊芥味微辛而帶芳香，其氣甚清，質又輕揚，故治風熱在表在上諸症，能泄肺熱而達皮毛，風熱咳嗽宜之，風熱外感頭重寒熱，亦是主藥。又入血分，清血熱，能治咽喉口舌……諸症。亦治瘡瘍風疥癰癤，衄血下血崩漏，能徹上徹下，散結導瘀，厥功甚多，而亦甚捷。”

防風（本草經）

【別名】屏風、北風、蘇風。

【主要產地】蒙古、河北、河南、山西、雲南、黑龍江等地。

【藥用部分】本品是繖形花科多年生草本植物，入藥用其干燥的根。其根全體為圓柱形，長約 6 寸至 1 尺許，粗約 2—3 分，根頭包擁棕毛狀物并帶切斷的殘莖，表皮呈灰黃色或黃褐色，有顯明的縱皺及皮孔，質頗輕松，其橫斷面有多數裂隙，顯黃白色。以條長枝粗肉厚質軟者為最好；若色灰白，枝短瘦小，質硬者次之。

【炮制】將原藥除淨蘆頭上的棕毛，洗淨濕潤，使體質變軟後，切片曬干，生用或炒用。

【性味和歸經】味辛甘，性溫無毒。入肝、肺、脾、胃、膀胱五經。




图 24 防 风

左、防风原植物；右、药用部分外形及横切面：1. 棕毛，2. 皮孔。

【应用】本品能祛风胜湿，解表发汗，去结止痛。主治外感风寒、发热、头重、肢节疼痛、脊痛项直、两目赤肿、破伤风、产后中风等症。对于无风邪者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】防风甘温，祛风表邪，諸风口噤，骨节痹痛。

【配伍】配黄芩、荆芥穗、大黄、薄荷、麻黄、滑石、桔梗、梔子、石膏、川芎、当归、甘草、芍药、连翘、朴硝（潤肺散）、治馬肺气，把前把后，項脊紧硬，胸膈腰胯疼痛；配独活、连翘、升麻、柴胡、黑附子、

烏药、羌活、当归、甘草、葛根、山药(防风散)，治馬腎风腰硬，把前把后。

【附方】(1)防风散(四川)：治牛、猪风寒感冒，不吃草料，背拱，毛立粗乱，耳、角、鼻、背和四肢冰冷，口腔青白色、流涎，肚脹。

防风 白芷 青皮 陈皮 桂枝 厚朴 枳实 神麴 麦芽
山楂 荆芥 甘草

共研为末，生姜、葱白为引，加水灌服。

(2)止痛散(元亨疗馬集)：治馬閃伤胸膈脊腰，积聚恶血不散，不食水草。

防风 連翹 官桂 水蛭炒出烟 当归 柴胡 羌活 麝香
上药为末，酒为引，候温灌之。

按：防风为风症的主药，时珍说：“防者禦也，其功疗风最要，故名。屏风者，防风隐語也。”凡风药大多性燥，惟防风性潤，故补脾胃时，多以防风引导；如配黄耆、白朮，治风邪久留不散及体虛自汗不止。由于防风善能表散，故又用以解砒毒、烏头毒和芫花毒。

紫苏 (别录)

【名别】香苏、赤苏、苏叶。

【主要产地】多种植于园圃，各地均有出产。

【药用部分】本品是唇形科一年生草本植物，其全草供药用。种子名紫苏子，亦作药用(見化痰止咳平喘药項下)。莖高2—3尺，呈圓角四方形，中空，折断面有白色髓部；其叶对生，作卵圓形或橢圓形，边有鋸齿，呈暗紫色或綠褐色，两面均有茸毛。富有特异的香气。

【炮制】将新鮮者連嫩梗切細，晒干，生用。老莖称苏梗，采集



图 25 紫 苏

左、紫苏原植物； 右、莖横切面外形

后，除去外皮及枝，切成薄斜片，晒干生用。

【性味和归經】味甘辛，性温无毒。入肺、脾二經。

【应用】苏叶有发汗散表、理气寬胸、退热、化痰、利水等功用。苏梗能順气安胎，并无发表之力。主治外感风寒、胸膈疼痛、发热无汗、胎气不安、肺气喘急等症。对于气虛表虛者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和雞 5 分至 1 錢。

【附歌】紫苏辛温，发表风寒，梗順諸气，亦可安胎。

【配伍】配葶藶、茯苓、甘草、貝母、防风、当归、桔梗、木通、牵牛（紫苏散），治肺病、喘粗、胸中痛；配陈皮、砂仁，行气安胎；配藿香、烏药，温中行气；配香附、麻黄，发汗解肌；配川芎、当归，和血散血；

配杏仁、萊服子，消痰定喘；配桔梗、枳殼，利膈寬胸。

【附方】治肺散（牛經）：治牛患肺病。

紫蘇 知母 紫苑 貝母 大黃 甘草 黃芩 桔梗 白朮
白朮

上藥為末，加生姜、蜜為引，水煎，灌之立效。

按：紫蘇莖、葉與子，功用有些不同。蘇葉主發散，蘇梗主順氣表散，蘇子主消痰定喘。汪昂說：“葉發汗散寒，梗順氣安胎，子開郁降氣，消痰定喘。”孟詵說：“蘇子與葉同功，發散風氣宜用葉，清利上下宜用子。”

桂枝（本草經）

【別名】桂支、桂尖、牡桂枝。

【主要產地】四川、福建、雲南、廣東、廣西等地。

【藥用部分】本品是樟科常綠喬木桂樹的乾燥小枝。呈圓柱形，其頂端細枝呈扁稜形，往往分叉或彎曲。外表呈灰褐色或赤褐色，有縱皺及葉柄脫落的痕迹；折斷面不平坦，皮部為暗紅色，木部呈黃白色，氣味芳香。桂枝梢部的一段較細小，稱為桂枝尖，氣味較厚。入藥以桂尖為良，桂枝次之。

【炮制】將原藥浸潤，待中心潤透後，切片置通風處陰干，生用或蜜炙用。

【性味和歸經】本品味辛甘，性大熱而無毒。入肺、心、膀胱三經。

【應用】本品有解肌發汗、溫經通絡、祛風濕、利關節等功用。主治風寒感冒、啞嗽逆氣、風濕痹痛、肢節疼痛等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢；兔和雞 2 分

至5分。

【附歌】桂枝辛熱，通利骨節，發汗溫經，能除風濕。

【配伍】配麻黃、柴胡、荊芥、防風、生薑、葱白等，可用于外感表症；配桑枝、附子、牛膝、威靈仙、茯苓、防己等，可治骨節痹痛；配白芥子、厚朴、杏仁、半夏等，可用于風寒咳嗽。

按：桂枝發汗作用，與麻黃不同，時珍說：“麻黃遍徹皮毛，故專于發汗而邪散，桂枝透達營衛，故能解肌而風邪去。”因此在營衛不和、腠理疎泄時，則用桂枝，而不用麻黃。如若肺氣壅實、皮毛閉塞者，桂枝可與麻黃同用。

細辛（本草經）

【別名】小辛、少辛、玉番絲、北細辛。

【主要產地】遼寧、吉林、陝西、山東等地。

【藥用部分】本品是馬兜鈴科多年生草本植物，其全草供藥用。葉呈心臟形，干燥後多皺縮，質較薄，呈黃綠色；根莖呈竹節狀，纖細而彎曲，其下部抽出多數的長條根，長約3—4寸，多呈彎曲狀，外表為淡褐色或土灰色，折斷面呈黃白色，有特異的香氣。

【炮制】將原藥洗淨泥土，用水潤軟後切成5—6分長的小段陰干，生用。

【性味和歸經】本品味辛烈，性溫無毒。入心、肺、肝、腎四經。

【應用】本品有散風祛寒、溫中破結、開竅止痛、消痰嗽、利水道等功用。主治肢節拘攣、風寒濕痹、咳嗽、頭重、冷痛等症。外用研末吹鼻通竅。對於氣虛有汗、血虛頭重者忌用。

【用量】馬和牛3錢至5錢；羊和豬5分至1錢。

【附歌】細辛辛溫，破結溫中，風寒濕痹，開竅止痛。

【配伍】配皂角末，吹入家畜鼻内（通关散），可治疗家畜闭塞假死症；配烏梅肉、天南星，用手指蘸药擦牙，治家畜牙关不开症。

【附方】治馬起臥胞轉及腸結方（晋葛洪肘后百一方）。

細辛 防风 芍药 食盐

水煮，草后或草前灌之。

腸結时，用：朴硝 郁金 寒水石 大青叶

水煮加酒、油和搅，灌口中。

按：細辛气味辛烈，温散力很大，用量不可过大。由于气味雄厚，驅风疎寒，奏效亦捷。徐洄溪說：“凡药香者，皆能疎散风邪，細辛气盛而味烈，其疎风力更大。且风必挟寒以来，而又本热而标寒，細辛性温，又能驅逐寒气，故其疎散上下之风邪，能无微不入，无处不到也。”

辛 荳（本草經）

【别名】木笔。

【主要产地】四川、浙江、陝西、河南、安徽等地。

【药用部分】本品是木兰科落叶乔木，入药用其未开放的花芽。干燥的花芽呈毛笔头状，长约8分至1寸，外表苞片呈深褐色，密被絲綿样的茸毛，毛为黄色或金黄色；花芽有特殊的芳香。

【炮制】将花芽采下后晒干，去梗并剥去外層，搗碎用或炒炭用。

【性味和归經】味辛，性温无毒。入肺、胃二經。

【应用】本品能散上焦风热，温中解肌、通窍、杀虫、通鼻塞。主治头风、脑額鼻湿、鼻塞、头面肿胀等症。

【用量】馬和牛5錢至1两5錢；羊和猪1錢至2錢；兔和鷄

3分至6分。

【附歌】辛荑辛温，寒热头重，鼻漏流涕，清阳上升。

【配伍】配知母、黄柏、沙参、木香、明矾、郁金(吉林)，治脑额鼻湿；配白芷、防风、知母、貝母、銀花、連翹、陈皮、甘草(辽宁)，治馬騾火鼻湿(即火鼻子)。

【附方】(1)辛荑散(四川)：治牛鼻肿潰膿症。

辛荑 蒼耳子 細辛 川芎 白芷 升麻 木通 蕁撥 藁
本 防风 薄荷 甘草 茶叶 葱头

共为末，温开水冲服。

按：辛荑性升，能散上焦风热，引諸药上行，为治鼻漏要药。

葱白（别录）

【别名】葱头。

【主要产地】我国各地皆有出产。

【药用部分】本品是百合科多年生草本植物葱的新鲜根茎。新鲜葱白呈类圆柱形，由多层膜鞘合集而成，外表呈白色，光滑而质脆，断面组织疏松，有粘液，并具特异气味。

【炮制】洗净生用。

【性味和归经】本品味辛，性温无毒。入肺、胃二经。

【应用】葱白能解表和里，发汗解热，通阳活血，明目解毒。主治风寒感冒、发热无汗、面目浮肿、阴寒腹痛、赤白痢疾等症。反蜜、蜡。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪2錢至3錢；兔和雞3分至6分。

【附歌】葱白辛温，散邪发汗，风寒感冒，冷痛引药。

【配伍】配花椒、豆豉、朴硝(葱豉散),治馬肾伤、气把腰膀病。

按:葱白辛温,专主发散,以通上下阳气,气通则血活,也就是寒气既散,血气既理,就有发汗解热、通乳安胎、明目解毒的功效。时珍說:“生用辛散,熟用甘温,外实中空,肺之药也,肺病宜食之,肺主气,外应皮毛,其合阳明,故所治之証,多屬太阴(肺)阳阴(胃),皆取其通气发散之功,通气故能解毒,理諸病。气者,血之帅也,气通则血治矣。”

白芷(本草經)

【别名】芳香、白蔭、澤芳、香白芷。

【主要产地】四川、陝西、湖南、浙江、江西、河南、河北、安徽等地。

【药用部分】本品是繖形花科多年生草本植物,入药用其根。干燥根呈紡錘形或圓錐形,长约5—6寸,粗約6—7分,外面为灰白色,有縱皺,質地坚硬,折断面呈灰白色,为粉質,气味芳香。

【炮制】将原药洗净泥土,置清水内浸1至2小时,取出,以湿布复盖,待中心潤透变軟后,再切成薄片,晒干,生用。

【性味和归經】味辛,性温无毒。入肺、胃、大腸三經。

【应用】白芷有祛风解表、驅寒燥湿、通經利窍、排膿止痛、生肌行血等功用。主治感冒、头重、目赤弩肉、腰痛、腹痛、皮肤发痒、諸疮膿肿、难产、乳癰等症。

【用量】馬和牛5錢至1两;羊和猪1錢至3錢。

【附歌】白芷辛温,驅寒散风,皮肤諸瘡,排膿止痛。

【配伍】配当归、生地黄、黄芩、郁金、梔子、茯苓、黄药子、地骨皮(白芷散),治胸膈热;配茴香、細辛、芍药等,治气脹腹痛。



图 26, 白 芷

左、白芷原植物；右、药用部分外形及横切面。

【附方】攻胃散(居家必用事类全集):治水牛气脹病。

白芷 茴香 桔梗 蒼朮 細辛 芍藥 橘皮 官桂

以上共为末,生姜为引,候温灌服。

生姜 (別录)

【別名】姜根、百辣云、因地辛。

【主要产地】主产于安徽、四川、湖北、江苏、江西、浙江、广东、山东、河北等地。其他各地亦有栽植。

【药用部分】本品系姜科多年生草本植物,其根莖供药用。新鮮的根莖横列如掌,多分叉,形略扁圓,近莖及嫩芽处为紅紫色,宿

根則帶淡黃色，外表有環狀的條紋，容易折斷，斷面平坦，呈黃棕色或淡黃色。

【炮制】將原藥洗淨泥土，切片生用，搗汁用或煨熟用。

【性味和歸經】本品味辛，性微溫無毒。入肺、脾、胃三經。

【應用】生姜有發散風寒、止嘔消痰、開胃溫中、利水解毒等功用。主治外感風寒、鼻塞流涎、痰壅咳逆、反胃吐食、胃冷少食、腹痛泄瀉等症；并解天南星、半夏毒，對於陰虛有熱者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和豬 2 錢至 5 錢；兔和雞 3 分至 1 錢。

【附歌】生姜辛溫，散寒驅風，去痰止嘔，開胃和中。

【配伍】配陳皮、白茅根、黃柏、丁香、地骨皮、枇杷葉，止嘔吐；配明礬、巴豆（姜礬散），治打破梁脊瘡。

【附方】（1）調胃散（師皇安驥集）：健脾。

生姜 陳皮 茅根 地骨皮 丁香 枇杷葉 甘草

上藥共為末，用溫水調灌之。

（2）治黑疔瘡方（司牧安驥集）。

生姜 巴豆 胡桃仁

上藥三味，細研為末，塗瘡上。

按：生姜藥用甚廣，功能亦多，凡配宣、通、補劑，十有五、六配有生姜。如配半夏、陳皮治嘔；配豆蔻、砂仁，開胃健脾；配竹瀝，治痰涎；配黃連，健脾清濕等，都因生姜有調和諸藥的作用。

葛根（本草經）

【別名】干葛、粉葛、甘葛、粉葛根。

【主要產地】各地均產。其中以浙江、廣東、安徽、江蘇等地方

量較多。

【藥用部分】本品是豆科多年生藤本植物，其根供藥用。干燥根為不規則的圓柱形，外面呈紅褐色，有縱皺紋；一般切成厚薄不等的片塊，顯粉白色或黃白色，充滿纖維及粉狀物。以色白粉多者為最好，粉少筋多者為次品。



图 27 葛 根

左、葛根原植物；右、藥用部分外形。

【炮制】生用或煨用。

【性味和归經】味辛甘，性平無毒。入脾、胃、大腸三經。

【应用】葛根有疗肌解表、退热、止渴生津、清胃热、下食等功用。主治表証，大热、口渴、舌干、风邪项直、腸風血痢、泄瀉、猪羊痘

疮等症。

【用量】馬和牛6錢至2兩；羊和猪2錢至3錢；兔和鷄5分至1錢。

【附歌】葛根甘平，解肌退热，止渴止泻，猪羊痘疮。

【配伍】配陈皮、香附子、紫苏、薄荷、藿香、川芎、升麻、甘草（香葛散，师皇安驥集），治头风；配芍药、桂枝、生姜、升麻等，治牛、馬表証。

按：葛根虽为表証要药，但与麻黄、桂枝解表有所不同。麻黄治表实，其发汗解表，乃解皮毛之邪以退热；桂枝治表虚，其发汗解肌，乃调和营卫解肌腠之邪以退热；葛根入阳明胃经，主治热甚或呕或痢，以发汗生津而退热。东垣说：“葛根其气轻清，鼓舞胃气上行，以生津液，又解肌热，为治脾胃虚弱泄泻圣药。”

第二节 寒凉解表药

升麻（本草经）

【别名】绿升麻、周麻、黑升麻、关升麻。

【主要产地】四川、广东、陕西及东北各地。

【药用部分】本品是毛茛科多年生草本植物，其根茎供药用。干燥的根茎为不规则的圆柱形，多分叉、扭曲，外面呈棕黑色，有细纵皱纹，质坚而轻；折断面不平坦，横切面现放射线，内部呈灰绿色，往往有空洞。药用者以陕西所产者为佳。

【炮制】将原药洗净，用水润透，切片晒干，生用或蜜炙用。

【性味和归经】味甘辛微苦，性微寒无毒。入肺、脾、胃、大腸四经。



图 28 升 麻

左、升麻原植物；右、药用部分外形。

【应用】升麻有解表、散风热、解毒、升阳、行瘀血等功用。主治时气寒热、猪羊痘疮、咽喉疼痛、风疮肿毒、口疮、久泄下痢、脱肛、子宫脱出等症。凡上盛下虚及火旺者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】升麻微寒，散风解毒，下痢脱肛，升阳力速。

【配伍】配黄芩、当归、柴胡、黄耆、黄药子、黄连、羌活、甘草、人参、防风、白朮、葛根、白药子、茯苓(升麻散)，治内障眼、黄晕绿晕、浸睛；配防风、川芎、白芷、羌活、甘草、桂皮(湖北)，治马感冒发热；配葛根、赤芍药、牛蒡子、蝉蜕、荆芥、防风、连翘、梔子、木通、紫草、甘草(甘肃)，治羊痘疮。

蔓荆子（本草經）

【别名】京子、大荆子、万金子。

【主要产地】江西、湖北、广东、江苏、浙江、山东、河南、内蒙等地。

【药用部分】本品是馬鞭草科落叶灌木，入药用蔓荆的果实。干燥果实为球形或卵圆形，外面呈灰褐色，下部伴有灰白色宿存的花萼，剖开内面为灰白色，分四室，各室藏有微小的种子，質輕。

【炮制】将原药晒干，除去外衣，以盐水炒用或生用。

【性味和归經】味苦甘辛，性微寒无毒。入肝、肺、膀胱三經。

【应用】蔓荆子有疏散风热、通利九窍、明目去翳等功用。主治劳热骨蒸、湿痹拘攣、头风痛、破伤风、目赤流泪等症。凡血虛或胃虛者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和雞 2 分至 8 分。

【附歌】蔓荆苦寒，除湿散风，凉血明目，搜风止痛。

【配伍】配威灵仙、何首烏、玄参、苦参（肺风散），治肺热；配白芍、黄柏、黄耆、人参、甘草（蔓荆子散）治內障眼。

薄荷（唐本草）

【别名】蕃荷菜、香荷、苏薄荷。

【主要产地】江苏的太倉、嘉定、苏州，江西吉安的永和、三曲滩、水东、固江，浙江的笕桥，湖南的谷水，以及河南、广东、福建等地。

【药用部分】本品是唇形科多年生草本植物，入药用其莖叶。

干燥的莖呈黄褐色,为方形,节明显,叶对生,呈黄褐色或綠褐色,作卵圆形而尖,边缘有锯齿,在叶脉上有短毛,富有强烈的香气。

【炮制】将原药淋水湿润,待莖变软后,即切细,置通风处阴干,生用。

【性味和归经】本品味辛,性凉无毒。入肺、肝二经。

【应用】薄荷能清热发汗,清暑化痰,消食利水,消肿。主治外感风热,宿食不消,咽喉肿痛,头晕目赤,口臭鼻塞,腹胀,风热惊悸。对病后自汗者忌服。

【用量】马和牛5钱至1两5钱;羊和猪1钱至2钱;兔和鸡2分至5分。

【附歌】薄荷辛凉,清热发汗,利水化痰,消肿止痛。

【配伍】配瓜蒌仁、枇杷叶、砂仁、紫苏叶、甘菊花、桔梗,治伤风感冒;配人中白、硼砂、孩儿茶、冰片(湖北),治咽喉口舌溃烂。

【附方】驱风散(福建):治风寒感冒、体表寒冷。

薄荷 荆芥 桂枝 白芷 陈皮 紫苏 防风 木香
共研为末,生姜、葱白为引,温开水冲服。

牛蒡子(别录)

【别名】牛子、鼠粘子、黍粘子、大力子。

【主要产地】四川、山东、浙江、湖北、河南、甘肃、云南及东北各地。

【药用部分】本品是菊科二年生草本植物牛蒡子的种子。干燥品呈长卵圆形或圆锥形,略弯曲,长约1分半至2分余,外面为暗灰色或黄褐色,并杂有黑褐色的斑点。

【炮制】生用或炒熟、杵碎用。

【性味和归經】味辛苦，性寒无毒。入肺、胃二經。

【应用】本品有散风除热、消肿解毒、潤肺化痰等功用。主治外感风热、咳嗽气喘、咽喉肿痛、諸肿疮瘍等症。对于脾胃虛寒泄泻者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两；羊和猪 2 錢至 4 錢。

【附歌】牛蒡子寒，疏风散热，解毒消肿，咽痛可安。

【配伍】配牵牛子、大麻子、甜瓜子、紅花子、郁金、秦艽、天花粉（五子散），治馬鼻湿、肺毒疮、前后脚虛肿、草慢；配金銀花、大黃、元明粉、連翹、黃芩、梔子、貝母、薄荷、板藍根、黃、白朮子、甘草，通大海为引（牛蒡散，山西），治馬风热咽喉肿痛。

柴胡（本草經）

【別名】北柴胡、才胡、茈胡。

【主要产地】江苏、安徽、河南、河北、湖北等地。

【药用部分】本品是繖形花科多年生草本植物，入药用其根。干燥根为不整圓錐形，往往分叉而扭曲，长约 2—3 寸，頂端有莖的殘基，外面呈暗褐色而带縱皺；折断面呈淡黄色，为纖維性。

【炮制】将原药洗净泥土，切片晒干，生用，酒炒，醋炒，盐水炒用。

【性味和归經】味苦，性平（或作微寒）无毒。入肝、胆、心包絡、三焦四經。

【应用】柴胡有和解、退热、升阳、解郁、疗諸风、泻肝胆火等功用。主治寒热往来、胸胁痛、寒热邪气、头重眩暈、口干目赤、子宮脫出、脫肛等症。对于馬脉迟而弱者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄

4分至1錢。

【附歌】柴胡苦平，发表祛风，寒热胁痛，升阳宜用。

【配伍】配紫苑、知母、貝母、百合、桑白皮、胡黃連（柴胡散，安驥藥方），治慢肺病、哮喘；配大黃、枳實、黃芩、半夏、芍藥、甘草、生薑、車前草，治水牛外感風寒。

【附方】治羊痘方（山西）。

柴胡 防風 羌活 荊芥穗 生地 玄參 烏藥 大黃 白
僵蚕 蟬蛻 凝水石 升麻 生石膏 甘草

上藥用水煎，候涼冷飲之。

按：柴胡質輕味薄，具有升發之性，功能散表清熱以和營衛，故為半表半里証的和解藥。因邪在半表半里，引起痰凝氣滯，氣血升降之機受阻，當升不能升，則陽盛發熱，而當降又不能降，則陰盛而發寒，故症狀表現寒熱往來，非柴胡和解之力不可。柯韻伯說：“柴胡為樞機之劑，凡風寒不全在表，未全入里者皆可用。”

豆豉（別錄）

【別名】淡豆豉、香豆豉、制豆豉。

【主要產地】我國各地均產。其中以江西、湖南及東北各省產量較多。

【藥用部分】本品是豆科植物黑大豆的種子，經加工釀制而成。乾燥的豆豉，呈橢圓形，稍扁平，外面為黑褐色或紫褐色，微有皺縮，外面帶污白色的粉霜，稍濕潤而柔軟，有特異的芳香气味。

【炮制】豆豉原為加工制品，不須再制。

【性味和歸經】味甘淡微苦，性寒無毒。入肺、胃二經。

【應用】豆豉能解表發汗，退熱解毒，散風熱，開腠理。主治肺

热、虚劳喘息、消化不良、烦躁不安等症。

【用量】馬和牛 8 錢至 2 兩；羊和猪 3 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】豆豉苦寒，退热解毒，散风发汗，解表去煩。

【配伍】配葱白，治伤风感冒；配梔子，治煩热；配葱、姜，治后軀受冷。

按：豆豉是由黑豆蒸制而成，按其味淡微苦性寒，似屬苦降下行之药，无升引上行之力，但經火蒸制，味虽苦而气香，虽寒而質則浮，能升能散，故得葱則发汗，得盐則止吐，得酒則治风，得韭則治痢，得蒜則止血，炒熟又能止汗。

菊花（本草經） 附：野菊花

【别名】黃菊花、白菊花。

【主要产地】安徽、河南、浙江、江苏、四川、湖南、山东等地。

【药用部分】本品是菊科多年生草本植物菊的花。菊花种类很多，有黃菊花、白菊花、野菊花等分別。黃菊花呈黃色，朵小而圓，花冠外層为舌狀，內層为筒狀，总包片呈綠黃色。白菊花外層呈白黃色或淡粉紅色，其他同黃菊花。野菊花形最小，多数为未盛开的花朵，呈土黃色或黃褐色。

【炮制】將原药阴干或晒干，生用。

【性味和归經】黃、白菊花味甘微苦，性平无毒。入肺、脾、肝、腎四經。野菊花味苦，性辛温有小毒。

【应用】本品能明目，散风热，降火，解毒。主治上焦风热、头眩、目痛泪出、翳膜盖睛、恶风湿痹。野菊花治疮肿疔毒有效。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和猪 1 錢至 4 錢；兔和鷄

5分至1錢。

【附歌】菊花甘平，除熱祛風，降火明目，瘡腫亦用。

【配伍】配刺蒺藜、防風、羌活（涼肝散），治肝熱、眼生翳障；配辛荑、防風、連翹、香薷、薄荷、蟬蛻等，治鼻內紅腫。

按：菊花為平肝之藥，因頭重目疾，多由肝經風熱上行所致。菊花入肝，兼行周身，祛風清熱而利血脈，則諸症自愈。如濕重而成癰，是因血脈不利所成，菊花有利血脈的功能，所以也能奏效。此外，菊花又能解毒，故對癰疽疔毒多搗汁敷之，沈金鰲說：“菊花并莖葉打汁飲，可治療瘡，以滓外敷紅綫疔，尤為要藥，以疔瘡之生，由風火之毒也。”

桑葉（本草經）

【別名】冬桑葉、霜桑葉。

【主要產地】我國各地均產。

【藥用部分】本品是桑科落葉喬木桑樹的葉。呈廣卵圓形，頂端短尖，基部呈心臟形，邊緣有鋸齒，乾燥後質脆，多折為碎片，表面為黃綠色，背面為灰綠色，葉脈明顯，入藥以冬季採摘者為良。

【炮制】採後曬干，生用或蜜炙用。

【性味和歸經】味苦甘，性寒無毒。入肝、肺二經。

【應用】桑葉有發汗、解熱、涼血、散風、明目、通骨節、下氣等功用。主治一切風痛、勞熱啞嗽、頭重目赤、口渴發熱、淚出眩暈、四肢麻木、瘡癰等症。

【用量】馬和牛5錢至1兩；羊和豬2錢至3錢；兔和雞5分至8分。

【附歌】桑葉苦寒，發汗解熱，頭重目赤，涼血去風。

【配伍】配决明子、谷精草、菊花、蝉蜕、大黄、黄连、青箱子、龙胆草、石决明(安徽),治肝经热,眼晕。

按:桑叶、桑枝、桑白皮、桑椹等同为桑树所长之物,但在使用的各有不同,桑叶能祛风清热、凉血明目,为疏表解热药;桑椹补肾明目,养血祛风,用作强壮药;桑枝能祛风湿,利骨节,专作风痹药;桑白皮能泻肺行水,为喘咳祛痰药,又为水肿之利水药。

蝉蜕 (别录)

【别名】蝉退、蝉衣、虫退、蝉皮、蝉壳、虫蛻。

【主要产地】各地都产。其中以浙江、江苏所产者为佳。

【药用部分】本品是蝉科昆虫蚱蝉的蛻壳,即蝉的幼虫出土爬至树上时,自背部裂开所脱下的皮壳,形态与蝉无异。干燥的皮壳,两侧各有翅痕,带黄褐色,背面有光泽;两眼突出,明亮;腹部往往粘有泥土,无光泽;胸部有足三对。质轻而脆,易压碎。



图 29 蝉 蛻

【炮制】将原药洗净泥土,剪去翅足生用。

1.前足; 2.中足; 3.后足; 4.眼; 5.翅痕; 6.腹。

【性味和归经】味咸甘,性寒无毒。入肝、肺二经。

【应用】蝉蜕有逐风散热、定惊去翳、通乳、催生等功用。主治头风眩晕、皮肤风热、胎衣不下、目翳、破伤风、疔疮、肿毒等症,对于虚证、无风热者及孕畜忌服。

【用量】馬和牛5錢至1兩；羊和猪1錢至2錢；兔和鷄2分至4分。

【附歌】蟬蛻甘寒，消風散熱，逐邪定驚，退翳催生。

【配伍】配黃連、菊花、地骨皮、甜瓜子、白朮、蒼朮、龍胆草、當歸、厚朴、青皮、陳皮、白牽牛、益智仁、赤芍藥(蟬蛻散)，治馬谷料喂多，眼暈眼腫。

表 26 解表藥歸納簡表

類別	藥名	性味及歸經	功 用	用 量 (錢)		
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄
辛 溫 解 表 藥	麻 黃	辛苦溫，入肺、心、大腸、膀胱	開腠發汗，止咳定喘	4—8	1—3	—
	荊 芥	辛苦微溫，入肺、肝	发散風寒，涼血解毒	5—15	2—3	0.5—1
	防 風	辛甘溫，入肝、肺、脾、胃、膀胱	祛風胜濕，解表發汗	5—15	2—4	0.5—1
	紫 蘇	辛甘溫，入肺、脾	發汗解表，順氣安胎	5—15	2—4	0.5—1
	桂 枝	辛甘大熱，入肺、心、膀胱	解肌發汗，通經溫絡	4—10	1—3	0.2—0.5
	細 辛	辛溫，入心、肺、肝、腎	散風開竅，風寒濕痺	3—5	0.5—1	—
	辛 夷	辛溫，入肺、胃	散熱通竅，鼻塞鼻濕	5—15	1—2	0.3—0.6
	葱 白	辛溫，入肺、胃	發汗散邪，感冒風寒	5—15	2—3	0.3—0.6
	白 芷	辛溫，入肺、胃、大腸	驅寒散風，行血止痛	5—10	1—3	—
	生 姜	辛微溫，入肺、脾、胃	发散風寒，止嘔消痰	5—15	2—5	0.3—1
寒 涼 解 表 藥	葛 根	辛甘平，入脾、胃、大腸	發汗退熱，止瀉止渴	6—20	2—3	0.5—1
	升 麻	甘辛苦微寒，入肺、脾、胃、大腸	解表散風，升陽解毒	5—15	1—2	0.4—1
	蔓 荊 子	苦甘辛微寒，入肝、肺、膀胱	疏散風熱，通利九竅	5—15	2—4	0.2—0.8
	薄 荷	辛涼，入肺、肝	祛風化痰，咽痛目赤	5—15	1—2	0.2—0.5
	牛 蒡 子	辛苦寒，入肺、胃	潤肺瀉熱，散腫解毒	5—10	2—4	—
	柴 胡	苦平，入肝、胆、心包、三焦	發表退熱，升陽和中	5—15	1—2	0.4—1
	豆 豉	甘淡微苦寒，入肺、胃	發表退熱，散風解毒	8—20	3—4	0.5—1
	菊 花	甘微苦平，入肺、脾、肝、腎	疏散風熱，降火明目	5—15	1—4	0.5—1
	桑 葉	苦甘寒，入肝、肺	散風清熱，涼血明目	5—10	2—3	0.5—0.8
	蟬 蛻	咸甘寒，入肝、肺	逐風散熱，定驚退翳	5—10	1—2	0.2—0.4

第 三 章

泻下药和逐水药

凡能引起腹泻或通便的药物,都可称为泻下药,其药性较为猛烈。凡能逐水急泻的药物,就称为逐水药。这两类药物,既有它们密切的关系,也有质和量的区别。

泻下药包括攻下药和润下药两类。它们的主要功用,可分为两点:一为攻逐或润滑肠内结滞的宿粪或清除有害的物质;二为清热泻火,使实热壅滞得到缓解。此外,某些泻下药也兼有逐水和破瘀的功效,用重量时这种作用尤为显著。

逐水药的功用,主要是能驱逐水湿,所以多用于水肿、痰饮等实证,以促进水湿向外排泄。

在治疗上,常将泻下药与逐水药配伍,以增强其逐水和破瘀的功效。

对于病久气虚、瘦弱体衰以及怀孕的家畜,禁忌应用烈性泻下药和逐水药,以免引起副作用。

兹将本章药物分为攻下药、润下药、逐水药三节叙述。

第一节 攻下药

大黄（本草经）

【别名】将军、川军、锦纹。

【主要产地】大黄是我国特产药材之一，主产于青海、陕西、四川、山西、甘肃、西藏等地，其中以四川产量最大，西北产的质量最好。

【药用部分】本品系蓼科多年生草本植物，入药用其根茎。削去外皮的干燥根茎，呈圆柱形或圆锥形，形状不一。大黄品种很多，主要可分为西宁大黄、汉中吉黄、马蹄大黄三种，分别叙述如下：



图 30 大 黄

左、大黄原植物； 右、药用部分外形：1. 横切面的纤维纹和淀粉点。

西宁大黄：产于青海，質坚实，顏色鮮黃，切开呈黃白色，夾有赤色槲櫟紋和硃砂点，故又称錦紋大黄，品質优良。

汉中吉黃：产于陝西汉中一带，形呈长塊状，縱切成片，顏色較淡，沒有錦紋，品質較次。

馬蹄大黄：产于四川及甘肅岷县一带，个大而質較松，形如馬蹄，呈黃褐色，內心空松如絲瓜絡，品質最次。

【炮制】將原藥浸入清水片刻，濾出，上复湿布，悶一、二天，如果中心潤透变軟，就可切片晒干，生用、酒炒、炒炭或蒸制。

制大黄法有两种：(1)將大黄加酒煮爛，晒干研粉，用蜜和合制成小塊晒干；(2)將大黄片加酒蒸晒几次，即成为“熟軍”、“熟大黄”。

【性味和归經】味苦，性大寒无毒。入脾、胃、肝、心包絡、大腸五經。

【应用】本品能下腸胃积滯，泻血分实热，行水消肿。主治腸滯秘結、实热燥結、瘀血、水肿、腸胃损伤。外用治金疮等症。但对于患畜秘結而体虛或不食者忌服。

【用量】馬和牛 6 錢至 3 兩；羊和猪 2 錢至 4 兩；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】大黄苦寒，泻火通腸，腸胃燥結，实热尤良。

【配伍】配朴硝、厚朴、枳实，治伤料、腸胃积滯；配厚朴、枳实，治腹滿、大便不爽；配滑石、皂角、木通、白朮、茯苓、瞿麦、当归、茴香（九龍轉江散），治馬七結；焦軍配黃連、黃芩、焦黃柏、梔子、知母、烏梅、訶子、猪苓、澤瀉、藿香、生姜（解毒湯，四川），治猪拉稀、里热实証；配槲櫟、党参、巴豆霜（攝金散），治駒恶露伤胃症。

按：大黄为兽医常用的藥物，其气味俱厚，苦寒泄降，能泻腸胃实热积滯。如入于清血解毒剂中，可去伏火，治疮毒，破积聚。此

外，外科药剂中，亦多应用。大黄少量能健脾而助消化，多量则峻泻而通大肠，因而患畜非实证及体质虚弱者，宜酌情小量或加入佐药使用。

大黄性能泄降下走，若病邪在上部，当用酒制引导。李东垣说：“大黄苦峻下走，用之于下必生用，若邪气在上，非酒不至，必用酒浸，引上至高之分，驱热而下。”这也就是李时珍所谓：“治者引之以酒，则浮而上至巅顶”之意。

朴硝（本草经） 附：元明粉

【别名】芒硝、皮硝。

【主要产地】我国沿海各地都有出产，盐硷地区也产。煎炼时结于盆底的称朴硝，结于上面形如麦芒的称芒硝。

【炮制】朴硝含杂质很多，应加精制。如将朴硝与萝卜同煮，除去萝卜，倾入放有草绳的盆中，露置一夜，上结晶状物，称为元明粉。

【性味和归经】味咸苦，性寒无毒。入胃、大肠、三焦三经。

【应用】本品能润燥软坚，除肠胃积滞，消痰逐水。主治肠胃实热积滞，停痰痞满。惟元明粉效力较缓；外用可治目赤肿痛、口疮等症。内用时，虚弱病畜和孕畜忌服。

【用量】马和牛 6 钱至 3 两；羊和猪 2 钱至 4 钱；兔和鸡 5 分至 1 钱。

【附歌】朴硝咸寒，软坚破结，化积除痰，肠胃实热。

【配伍】配大黄、牵牛子、陈皮、枳实等，可治结症。

按：朴硝、元明粉皆为泻实热要药。东垣说：“去胃中实热，荡胸中宿垢，可谓言简意明……，一以治阳明之胃家实热，大便不行，

一以治温病之表里实热，火甚煩燥，其他則概須慎之又慎。”大明謂：“消肿毒，非伏阳在內者不可用。”

巴豆（本草經）

【別名】剛子、江子、巴菽。

【主要产地】本品主产于四川、广东、福建以及其他热带地方，其中以四川产者个大为佳。

【药用部分】本品是大戟科常綠灌木，入药用其种子。干燥的果实，呈卵圆形，三稜状，有六条綫紋，橫切面呈鈍三角形，內有三室，各貯一粒种子，共三粒。种子呈卵圆形，长约3—4分，外表呈淡棕色或赤褐色；种仁黄白色，多油脂。

【炮制】剝去外种壳，将种仁用草紙包好，碾壓去油，即成巴豆霜。

【性味和归經】味辛，性热有大毒。入胃、大腸二經。

【应用】本品能泻寒积，破积聚，化痰行水，杀虫。主治前結、中結、腹脹糞閉不通、水肿等症。外用可治恶疮、疥癩。因为性味猛烈，內用时常配生麻油、面粉漿等以緩和其烈性。孕畜和泌乳期母畜禁用。若中毒时，可用冷水或寒水石解毒。

【用量】巴豆霜：馬和牛1錢至3錢；羊和猪2分至6分；鷄5厘至1分5厘。

【附歌】巴豆辛热，腸胃寒积，頑固冷結，用时去油。

【配伍】配五灵脂、甘遂、大黃、滑石等，或配生麻油等，治馬七結；配烏豆（黑大豆）、血竭、瀝青、紅娘子（烏金膏），治馬水疔疮。

按：巴豆为猛烈峻泻药，用以开堅破結，頃刻奏效；因其辛热有毒，用之务須适当。海藏說：“若急治，为水谷道路之剂，去皮心膜

油,生用;若緩治,为消坚磨积之剂,炒去烟,令紫黑用,可以通腸。”

巴豆去寒积,大黃去热积,此是一寒一热攻下药。丹溪說:“巴豆去寒积,无寒积者勿用。”东垣說:“以沉香水浸,則能升能降,与大黃同用,泻火反緩,为其性相畏也。”

番泻叶 (藥物大成)

【别名】泻叶、洋泻叶。

【主要产地】本品主要产于热带,我国南方也有出产。

【药用部分】本品是豆科灌木状草本植物,入药用其干叶。叶呈长卵形,长约7—8分至寸半,宽约3—4分,先端稍尖,叶基部不对称(印度番泻叶)。

【炮制】将叶晒干,泡湯服、研末服或煎服。煎服时必须后加入,因为久煎效力减少。

【性味和归經】味甘苦,性寒无毒。入大腸經。

【应用】本品能消积滯,通大便。对食积腹脹、大便不通,都可应用。孕畜和虛弱家畜禁用。

【用量】馬6錢至2两;牛1两至2两;羊2錢至4錢;猪2錢至5錢;兔和鷄3分至6分。

【附歌】番泻叶寒,攻积通便,食积脹滿,孕虛禁用。

【配伍】配朴硝、大黃、郁李仁、續隨子、牵牛子、五灵脂、滑石、香附、瞿麦、通草、枳壳、木香、麻油等,治大便秘結。

蘆薈 (开宝)

【主要产地】蘆薈原产于南非洲好望角等地,我国华南及其他地区也有栽培。

【药用部分】本品是百合科多年生草本植物。入药用其叶汁，干燥后呈黑色不透明的、有光泽的块状物，质坚硬而脆弱。

【性味和归经】味苦，性寒无毒。入肝、心包、大肠、脾、胃五经。

【应用】本品能攻逐肠内结滞的宿粪，清湿热。量小时有健脾作用。此外，还有杀虫和明目的功用。主治结症、胃热、湿热、黄疸、水肿等症。对于肾病的患畜、泌乳期的母畜和孕畜禁用。

【用量】攻下：马和牛3钱至6钱；羊和猪5分至1钱；兔和鸡1分至3分。

【附歌】芦荟苦寒，主攻结滞，小量健脾，乳孕禁忌。

【配伍】配朴硝、大黄，治疗结滞宿粪，可清湿热；配当归、龙胆草、黄芩、黄连、焦黄柏、厚朴、陈皮、枳实、火麻仁、郁李仁（芦荟饮），治猪伤胃、大便秘结。

第二节 润下药

火麻仁（本草经）

【别名】大麻仁、麻子仁。

【主要产地】河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川等地。

【药用部分】本品是大麻科一年生草本大麻的干燥果实。呈椭圆形或卵圆形，两侧稍扁，边缘有稜，表面呈灰褐色而光滑，有黄色网纹；种仁灰白色，含有大量油脂。

【炮制】将成熟果实晒干，过筛打碎用。

【性味和归经】味甘，性平无毒。入脾、胃、大肠三经。

【应用】本品能潤燥滑腸，滋阴生津，故对津液亏耗、大便燥結、胃热汗出等症，可以应用。此外，也可配合其他药物而用于疮癰或胎衣不下症。对于腸滑者忌用。

【用量】馬和牛 4 两至 6 两；羊和猪 4 錢至 6 錢。

【附歌】麻仁甘平，潤腸益津，大便燥結，功效著称。

【配伍】配大黃、白芍、枳实、杏仁、厚朴，治腸胃燥热、大便不通等症；配苦参、石膏、香油(云南)，治猪大便秘結。

郁李仁(本草經)

【别名】棣仁、山海子。

【主要产地】陝西、甘肃、内蒙、山西、山东等地。

【药用部分】本品是薔薇科落叶灌木郁李的子仁。种子呈卵圓形而微扁，种皮灰黃色；种仁乳白色，内含大量油脂。

【炮制】去种皮，搗碎用。

【性味和归經】味辛苦微甘，性平无毒。入脾、大腸、小腸三經。

【应用】本品能潤燥滑腸，下气，消食，利水，止痛。主治大便燥結、四肢浮腫、大腸气滯等症。其根皮煎剂內服，具有杀虫的能效。对于阴虛津亏的家畜禁忌服用。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 6 分。

【附歌】郁李仁平，潤燥潤腸，大腸气滯，利水尤良。

【配伍】配麻子仁、桃仁、大黃、当归等，治馬燥結；配麻子仁、桃仁、当归、防风、羌活、大黃、皂角子(通关散)，治馬大腸风、腸头翻出、頻努拽、拋糞不下。

麻油（本草拾遺）

【别名】芝麻油、香油。

【主要产地】主产于河北、河南、山东、陕西等地，其他各地也有出产。

【药用部分】本品是胡麻科植物芝麻的成熟种子，经压榨取得的油。系呈淡黄色或金黄色的油状液。

【性味和归经】味甘，性寒无毒。入大腸經。

【应用】本品能潤燥滑腸。主治大便燥結。也可配合其他藥物外用。

【用量】馬和牛 4 两至 8 两；羊和猪 3 两至 4 两；兔和鷄 3 錢至 5 錢。

【附歌】麻油甘寒，潤腸泻火，內治燥結，外搽潤肤。

【配伍】配巴豆或单用，能潤腸通便；配白蜡、輕粉、紫草、血竭、当归、白芷、甘草（生肌膏），治各种疮症、黄症。

酥油（别录）

【别名】酥。

【主要产地】甘肃、青海、西藏等地多产，其他各地亦有出产。

【药用部分】本品是由牛、羊奶制取的油脂塊状物。色淡黄，或近白色，呈半硬塊。有固有的臭气。

【性味和归经】味甘，性微寒无毒。入肺、大腸二經。

【应用】本品能潤肺滑腸。主治大腸燥結。

【用量】馬和牛 4 两至 6 两；羊和猪 2 两至 4 两；兔和鷄 1 錢至 2 錢。

【附歌】酥油甘寒，潤肺滑腸，大腸燥結，用之最宜。

【配伍】配枳实、槟榔片、滑石、青皮、木通、陈皮等，可治結症。

猪胆（別录）

【主要产地】我国各处都有。

【药用部分】本品是猪的胆汁，为黄色透明的液体。

【性味和归經】味苦，性寒无毒。入大腸、心、肝三經。

【应用】本品能潤燥滑腸，清心明目，凉肝胆。主治大腸燥結，目赤眼翳，并可通小便。外用敷恶疮，治燙、火伤，或为灌腸剂。

【用量】馬和牛半个至两个猪胆中的胆汁（鮮胆汁）。

【附歌】猪胆苦寒，泻火利腸，大便不通，用之有功。

【配伍】配鷄蛋，可治燥結；配黄柏末，可治火燙伤；配青箱子、决明子、井泉石、龙胆草、石决明、蟬蛻、木賊草、黄連、黄芩、郁金、蒼朮、防风、菊花、甘草、鷄子清（青箱子散），治馬骨眼磨眼、睛肿泪下。

蜂蜜（本草經）

【別名】蜂糖、蜜糖。

【主要产地】本品主产于浙江、江苏、广东、四川、安徽、河南、甘肃、江西、黑龙江等地，其他各地亦有出产。

【药用部分】本品是蜜蜂所酿的蜜。新鮮品为半透明，貯藏稍久，则逐渐析出白色顆粒状的結晶。

【炮制】将蜜汁放入鍋內，加等量水，加温拌攪，待蜜溶解后，放置片刻，乘温滤过，除去杂质，再加热蒸发其水分，就可得到純品，純品呈白色，又称白蜜。生用或制过用。

【性味和归經】味甘，性平無毒。入心、肺、脾、胃、大腸五經。

【應用】本品能清心養脾，潤肺止咳，補中潤燥，解毒止痛。主治脾胃虛弱、腸燥秘結、啞嗽，并可解烏頭毒，去三焦火，止咳去鼻膿，止馬心驚。外用可治創傷，也可作為煉合藥。反蔥。

【用量】馬和牛 1 兩至 3 兩；羊和豬 3 錢至 1 兩；兔和雞 1 錢至 2 錢。

【附歌】蜂蜜甘平，滑腸潤肺，生用清熱，熟用溫中。

【配伍】本品常作引藥，和許多藥都可配伍，也可單用治療上述各症。

按：蜂蜜是百花之精，能養脾胃，和百藥，并能益氣補中。汪昂說：“蜜生性涼，能清熱，熟性溫，能補中，甘而和，故解毒，柔而滑，故潤燥。甘緩可去急，故主心腹肌肉，瘡瘍諸痛。甘緩可和中，故能調營衛，通三焦，除眾病，和百藥。”吳普說：“蜜成干蜡，而萬物之主味，莫甘于蜜，莫淡于蜡，蜜之氣味俱厚，屬乎陰也，故養脾；蜡之氣味甚薄，屬乎陽也，故養胃。厚者味甘而性緩質柔，故潤臟腑；薄者味淡性濇質堅，故止泄痢。”

第三節 逐水藥

大戟（本草經）

【別名】下馬仙、兔兒奶、邛鉅。

【主要產地】廣東、廣西、江西、湖北、湖南、陝西、山東、江蘇、浙江等地。

【藥用部分】本品是大戟科多年生草本植物，入藥用其根。有綿大戟、紫大戟兩種，分述如下：

綿大戟：又称北大戟，呈細长圓柱形，外表赤褐色或灰褐色，带卷曲，質柔軟不易折断，分离纖維如絲，不多用。

紫大戟：其干燥品呈紡錘形，扭曲皺縮，外面呈赤褐色或灰褐色，縱皺长而深，断續不定，質堅而脆，折断面有不明显的放射状紋理。

【炮制】原药湿润后，切半分厚的横片，生用或醋煮。

【性味和归經】味苦，性寒有毒。入十二經。

【应用】本品能逐腹中水，通大小腸，利大小便，发汗解毒，破瘀血。主治水腫、腸鳴腹痛等症。體質虛弱者和孕畜忌用。

【用量】馬和牛3錢至5錢；羊和猪6分至2錢。

【附歌】大戟苦寒，利大小腸，腸結肚脹，水腫佳良。

【配伍】配牽牛、甘遂、大黃、黃芩、滑石、黃耆、朴硝（穿腸散），治牛草伤脾病；配穿山甲、滑石、海金沙（神聖散），治牛胎衣不下；配滑石、甘遂、牽牛、黃耆、巴豆、大黃、朴硝（大戟散），治牛水草脹肚。忌与甘草配伍。

按：大戟、甘遂、芫花、商陆均为逐水要药，宜于水腫痰滯实証，四药虽同为逐水，性能則稍有分別。沈金鰲說：“四物异性同功，而大戟泄臟腑水湿，甘遂行經墜水湿，芫花消伏飲痰癖，商陆专除水腫。”

甘遂（本草經）

【主要产地】甘遂分布很广，到处都有，主要产于陝西、河南、山西、甘肃、四川、江西等地。

【药用部分】本品是大戟科多年生草本植物，入药用其根。干燥根呈連珠状紡錘形，扭曲不整，长约1—2寸，粗約2分至4分，

两端较小,中间膨大,外表呈黄白色或灰白色,有棕色斑点,质轻而脆;横断面色白而呈粉质。其黄心明显的是次品。



图 31 甘 遂

左、甘遂原植物；右、药用部分外形。

【炮制】去外皮晒干,炮制用醋炒、甘草汤浸炒或面裹煨用。

【性味和归经】味苦,性寒有毒。入十二经。

【应用】本品的功用与大戟基本相同,能祛痰积,泻水饮。主治水肿胀满、外肾肿胀等症。体质虚弱者和孕畜忌用。

【用量】马和牛 3 钱至 5 钱;羊和猪 5 分至 2 钱。

【附歌】甘遂苦寒,主通二便,水肿肚胀,药反甘草。

【配伍】配大戟、芫花等,治水肿肚胀、大小便不利等症。忌与甘草配伍。

按：甘遂为行水要药，治疗身肿肚胀，外肾肿胀，祛除痰水，利大小便，功速奏效。时珍说：“肾主水，凝则为痰饮，溢则为肿胀，甘遂能泄肾经湿气，治痰之本也。”喻嘉言说：“胃为水谷之海，五脏六腑之源，脾不能散胃水积于肺，而病于中；肺不能通肾之水于膀胱，而病于上；肾不能司胃之关，因其蓄积，而病于下。以致积水浸淫，无所底止，治标，俱宜甘遂等以逐其水。”

甘遂、大戟、芫花一般均用醋制，以减低其毒性；其中甘遂内含油分，而毒性大部蕴蓄在油内，故又有面粉裹煨透的方法，以去其油，如煨得不透，服后可引起强烈的反应。曹颖甫编著的“经方实验录”中指出：“此药须煨透，服后始不致作呕，否则吐泻并作，颇足惊人，曾屡次试验而知。”因此，在应用时应予注意。

芫花（本草经）

【别名】金腰带、头痛花、杜芫、鱼毒。

【主要产地】主产于江苏、安徽、山西、浙江、江西、湖南等地，其他各地亦有出产。

【药用部分】本品是瑞香科落叶灌木，入药用其未盛开的干燥花蕾，其根和叶也作为药用。花萼为筒状，质绵软，先端裂成四片，呈紫红色，无花冠，干燥后屈曲不整，密被灰白色的茸毛，叶呈椭圆形，全缘，密生茸毛。

根细长，稍有分枝，外表呈黄褐色，质柔韧，不易折断，捶之成绵状纤维，内部为淡黄色。

【炮制】花晒干，醋煮用；叶搓碎用；根则去外皮生用。

【性味和归经】味辛，性温有毒，根和叶的毒性较大。花入肺、大腸、肾三经。




图 32 芫 花

左、芫花原植物；右、药用部分外形。

【应用】芫花能逐水飲，除胸膈水，通利二便。主治水腫痰癰、脹滿、喘急咳逆、胸膈疼痛、腹痛等症。叶能去风湿。根煎服能治跌打損伤，退热消腫。花、叶和根外用可杀虫，疗疥癩。常作农藥用。民間用以毒魚，故又名魚毒。因本品有毒，用时应小心。孕畜禁用。

【用量】花：馬和牛 3 錢至 5 錢；羊和猪 5 分至 2 錢。

根(生)：馬和牛 2 兩至 3 兩；叶(鮮)：馬和牛 4 兩至 6 兩。

【附歌】芫花辛溫，逐水利湿，又止咳逆，醋炙相宜。

【配伍】配金毛狗脊、大黄、椒目、川烏头、天仙子（芫花散，安驢药方），治馬伤冷气痛起臥。反甘草。

【附方】搽疥方（元亨疗馬集）：搽馬干癢。

芫花 蛇床子

以上二药，等分碾羅，共为細末，生油調匀，患部洗后，待干燥再涂搽此药。

牵牛子（別录）

【別名】丑牛子、黑丑、白丑、黑白丑、二丑。

【主要产地】各处庭园都有。

【药用部分】本品是旋花科一年生藤本，入药用其种子。干燥种子略呈球形，背面隆起，腹面两侧平直，外表棕黑色（俗称黑丑）或黄白色（俗称白丑），質坚硬；种子淡黄綠色，富含油脂。

【炮制】去果壳晒干，打碎后入煎，生用、炒用或研末用。

【性味和归經】味苦，性寒有小毒。入肺、腎、大腸三經。

【应用】本品能泻气分湿熱，消水肿，通二便，除积滯，亦有杀虫之效。主治中、下焦壅塞、二便結、风湿腰痛、血气停滯、后軀种滿、水肿痰喘等症。白丑入肺，用于胸膈病；黑丑入腎，用于水肿，对于元氣虛弱、便泻、尿频、胎娠等忌服。

【用量】馬和牛4錢至8錢；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】牵牛苦寒，逐水除湿，除积杀虫，用之相宜。

【伍配】配甘遂、大戟、大黄、青皮、陈皮等，主治水腫脹滿；配續隨子、郁李仁、陈皮等，治料伤气痛、草慢；配木香、使君子、槟榔，治虫积；配益智仁、当归、厚朴、青皮、陈皮、赤芍药（七宝散），治馬脾

胃寒冷、腸鳴泄瀉、腹痛、草慢，老馬久經陰雨、口色青黃。忌与巴豆配伍。

按：牽牛子有黑白两种，称二丑或白丑、黑丑。白丑入肺，下利之功較緩，黑丑入腎，下利之功虽緩而較好，故攻上焦气分之湿宜白丑，泻下焦郁結之湿宜黑丑。二丑用以治疗湿热，行水消肿，大有功效。亦治疮毒初起。如配合甘遂、大戟、芫花、大黃、木香、青皮、陈皮、槟榔、輕粉等，效力甚猛，可治水肿。配大黃泻肺热气喘，亦治火盛而便秘及疮毒內发形气俱实之証。如蜂蟻等虫刺伤，可取叶用盐揉軟涂擦。

又牽牛子的性味，在“本草綱目”以后許多書中記載为：味辛，性热。

續隨子（开宝）

【别名】千金子、联步。

【主要产地】本品主产于四川、浙江、台湾、广东等地。

【药用部分】本品系大戟科二年生草本植物，入药用其干燥种子。呈橢圓形，外表呈黃褐色，有黑褐色小斑紋，腹面有凹綫，种皮薄而脆；种仁黃白色，富含油脂。

【炮制】把种仁打碎用紙包，压去油，成粉状，即称为千金霜。

【性味和归經】味辛，性温有毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能行水破血，潤腸攻积。主治腸結、大小便不通、水肿脹滿、子宮瘀血等症。外用涂擦疥癩。

【用量】馬和牛 3 錢至 6 錢；羊和猪 4 分至 2 錢。

【附歌】續隨性温，滑腸破結，行水破瘀，退肿除湿。

【配伍】配大戟、牽牛子、木通、滑石、鼠糞、膩粉、酥油、皂角（續

随散)，治馬大便不通、腹脹起臥病；配通草、車前子等，治小便淋漓；配膩粉、滑石、木通、鼠糞、牽牛子、酥油、皂角（通关散），治馬大便秘結。

【附方】气滑散（元亨疗馬集）：治馬非时起臥腹痛。

續隨子 木通 滑石 瞿麥 青皮 茴香 陈皮 細辛 甘遂 当归 蒼朮 牽牛
上藥共研为末，水、酒同煎，候溫灌服。

葶藶子（本草經）

【主要产地】本品主产于陝西、河北、河南、山东、安徽、江苏等地。

【藥用部分】本品是十字花科二年生草本植物，入藥用其干燥的种子。呈橢圓形，稍扁平，是很小的粒子，外表呈紅褐色。

【炮制】微炒，蜜炙或隔紙焙用。

【性味和归經】味辛苦，性大寒无毒。入肺、膀胱二經。

【应用】本品能行水消腫，潤肺潤腎，止咳定喘。主治脹滿喘急、肺中水气、肺癰、痰黃、水腫浮腫等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 8 錢；羊和猪 1 錢至 3 錢；兔和鷄 3 分至 5 分。

【附歌】葶藶子寒，行水消腫，止咳定喘，除痰亦良。

【配伍】配梔子、黃芩、天門冬、麥門冬等，治喘甚。

【附方】葶藶散（元亨疗馬集）：治馬气喘。

葶藶子 玄參 升麻 牛蒡子 馬兜鈴 黃耆 知母 貝母
上藥为末，用水調勻，草后灌服。

按：葶藶子辛散苦泄，性寒沉降，功泄肺气，下通膀胱，因肺为

水之上源，肺气壅塞，则膀胱气化不行，水湿泛滥而成喘逆胀满等症；由于本品能泻肺气，疏利水道，故能除痰壅喘逆及利水消肿。

葶藶逐水，其与大戟、甘遂在功用上所不同者，主为泻肺。因其性峻烈，易损伤肺气，故虚症不宜用。如治肺癰，适用于不成膿之时，如膿成后就不宜用；又如在肺无实邪而喘咳及脾虚胀满、气虚的小便不利等均忌用。海藏说：“甜者性缓，虽泄肺而不伤胃；苦者性急，泄肺而易伤胃，故必以大枣辅之；然肺中水气膈满迫急者，非此不能除，水去即止，不可过剂。”

商陆（本草经）

【主要产地】本品主产于江苏、浙江、江西、安徽、四川、河南等地。现在到处都有栽培。有红白二种，红者毒性较大，只作外用。

【药用部分】本品是商陆科多年生草本植物，入药用其根。干燥根呈圆锥形，长约1尺余，粗2—3寸到5—6寸，外皮黄褐，粗糙多皱，支根很多，一般商品多横切成1至3分厚的片，栓皮呈黄褐色，内部为粉白色或黄白色，有圆心环，断面粗糙，质坚硬而脆。

【炮制】洗净切片晒干，醋制用，或用鲜品捣碎外用。

【性味和归经】味苦，性寒，有毒。入肾经。

【应用】本品功专利水，外敷解毒消肿。主治水腫脹滿、湿熱等症，以用白商陆为宜。外敷则疗癰肿恶疮，此时用紅色商陆奏效較好。对于脾虚水肿和孕畜禁用。

【用量】馬和牛5錢至1两；羊和猪8分至2錢。

【附歌】商陆苦寒，利水消肿，外治恶疮，孕畜禁用。

【配伍】配木通、澤泻、大腹皮、土茯苓等，可治水肿、尿淋等症；配赤芍药、密陀僧等，外敷可治疮毒。

表 27 泻下药和逐水药归纳简表

类别	药名	性味及归经	功用	用量 (錢)				
				馬	牛	羊	猪	兔 鷄
攻下药	大 黄	苦寒,入脾胃、肝、心包、大腸	腸胃燥結, 祛除实热	6-30		2-4		0.5-1
	朴 硝	咸苦寒,入胃、大腸、三焦	潤燥軟坚, 化积破結	6-30		2-4		0.5-1
	巴豆霜	辛热,入胃、大腸	腸胃寒积, 頑固結症	1-3		0.2-0.6		0.05-0.15(鷄)
	番泻叶	甘苦寒,入大腸	攻积泻下, 胸腹脹滿	6-20		2-4		0.3-0.6
	蘆 薈	苦寒,入肝、心包、大腸、脾、胃	腸內結滯, 清除湿熱	3-6		0.5-1		0.1-0.3
潤下药	火麻仁	甘平,入脾、胃、大腸	潤燥滑腸, 主治結症	40-60		4-6		—
	郁李仁	辛苦平,入脾、大、小腸	潤腸潤燥, 下气利水	6-20		2-4		0.4-0.6
	麻 油	甘寒,入大腸	潤腸去結, 泻火潤皮	40-80		30-40		3-5
	酥 油	甘寒,入肺、大腸	潤肺滑腸, 大腸燥結	40-60		20-40		1-2
	猪 胆	苦寒,入大腸、心、肝	潤燥滑腸, 又清肝热	半个-2个		—		—
	蜂 蜜	甘平,入心、肺、脾、胃、大腸	潤腸潤肺, 清熱解毒	10-30		3-10		1-2
逐水药	大 戟	苦寒,入十二經	通利二便; 逐水消腫	3-5		0.6-2		—
	甘 遂	苦寒,入十二經	祛痰积, 泻水飲	3-5		0.5-2		—
	芫 花	辛温,入肺、大腸、腎	逐水利湿, 又止咳逆	3-5		0.5-2		—
	牵牛子	苦寒,入肺、腎、大腸	逐水利湿, 除积杀虫	4-8		1-3		0.2-0.5
	續隨子	辛温,入肝、腎	滑腸破結, 退肿除濕	3-6		0.4-2		—
	葶藶子	辛苦大寒,入肺、膀胱	行水消腫, 泻肺平喘	5-8		1-3		0.3-0.5
逐水药	商 陆	苦寒,入腎	利水消腫, 外治惡疮	5-10		0.8-2		—

第四章

渗湿利水药

凡能促进水湿向外排泄或能通利小便的药物，都称为渗湿利水药。

本类药物其性较缓，主要是以利水的方式来排除体内滞留过多的水湿，其次是引导湿热下行，使从小便排出。因此，对于因体内水湿不能外泄或因湿热而产生的浮肿、胀满、水泻、小便不利或赤白痢以及黄疸等症，都可适用。对于剧症或急症时，往往与逐水药合并应用。

本类药物若用量过大，则能伤阴液，所以对于阴虚的病畜，在应用时，须配合补养药应用。

車前子（本草經） 附：車前草

【别名】前仁、車前仁、当道、車輪菜、虾蟆衣。

【主要产地】我国中南部地区都有出产，其中以江西、安徽、江苏等地产量较多，品质较好。

【药用部分】本品属車前草科多年生草本植物，入药用其干燥的种子；全草亦作药用。种子呈椭圆形，或卵圆形，黑褐色。

全草：叶呈广卵形，全緣，青綠色，叶脉显著，叶柄长，春日抽出花梗，夏季开白色或淡紫色花，为穗状花序。

【炮制】在种子有七成熟时，即可采集全株，曝晒后，待果实裂开，去果壳，去杂质，将子淘洗晒干，炒用，酒浸用，或盐水炒用。車前草可以晒干用其原药。

【性味和归經】味甘，性寒无毒。入肝、腎、小腸三經。

【应用】本品能利水清热，除湿止泻，益精明目。主治小便不通、热淋、尿血、暑湿泻痢、眼目赤痛、障翳、咳嗽等症。

車前草的利尿功效，較車前子稍弱。牛鼻出血时，可采鮮草搓烂塞鼻，即有止血之效。

【用量】車前子：馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

車前草：馬和牛 1 两至 3 两。

【附歌】車前甘寒，利水清热，止泻除湿，子草均用。

【配伍】配木通、瞿麦、篇蓄等，治热淋、小便不通。

【附方】治牛急性膀胱病方（浙江）。

車前子 当归 木通 黄芩 猪苓 澤泻 黄柏 白芍 天花粉 甘草 秦艽 灯芯草



图 33 車 前(草)

水煎服。

按：車前子能利水道而不損正氣，與茯苓同功。治暑濕下痢，可使小便利而泄瀉自止；治五淋，則滲泄濕熱，使小便下而淋自愈。故临床上常用之。

木通（本草經名通草）

【別名】万年藤、川木通。

【主要产地】江西、湖南、湖北、四川、河南、安徽、江苏、陝西、山东等地。

【药用部分】本品屬木通科落叶藤本植物，入药用其剥去外皮的干燥莖。干燥莖呈圓柱形，稍現扭曲，外表为灰黄色，分枝处稍大，質堅而輕；橫断面有明显的輻射綫，另有針孔狀的环列綫，以枝細者为佳。

【炮制】將木通莖去外皮，火烤或晒干。炮制时，將木通浸入水中，待其吸水后，即取出切片阴干应用。

【性味和归經】味苦，性寒无毒。入心、肺、小腸、膀胱四經。

【应用】本品能导濕熱，利小便，降心火，清肺熱，生津止渴。主治小便短赤、尿血、水肿、胃熱口干、心中伏熱、口舌生疮，母畜乳汁不通等症。病畜自汗不止及尿頻数者忌用。

【用量】馬和牛 6 錢至 1 兩 3 錢；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】木通苦寒，清熱利水，自汗尿頻，均所禁忌。

【配伍】配車前草、澤瀉、茯苓、淡竹叶、猪苓，治濕熱癃閉；配車前子、滑石、朴硝，治馬尿結；配天花粉、黃芩、黃連、連翹、茯神、黃柏、桔梗、梔子、牛蒡子、白芷（洗心散），治馬心經伏熱，舌上生疮；




图 34 木 通

左、木通原植物； 右、藥用部分外形及橫切面。

配灯芯草、瞿麦、車前子、梔子、生大黄、篇蓄、甘草(猪經大全)，治猪尿血症。

【附方】(1)木通散(元亨疗馬集)：治馬春季草細。

木通 干山藥 山梔子 牛蒡子 天花粉

上共为末，童便、生姜为引，开水調勻，同調灌服。

(2)治牛进食癆、吐倒草方(元亨疗馬集)。

木通 山梔子 晚蚕沙 青皮 山藥 陈皮 天南星 天花

粉 蒼朮 香附子

上药焙干为末，用酒灌下。

按：木通苦寒，能清心火而入血分，为治淋結尿赤的药物。丹溪說：“君火宜木通，相火宜澤瀉，利水虽同，所用各别。又肺为水源，肺热清则津液化，水道通矣。又凡利小便者，多不利大便，以小水愈通，大便愈燥也。木通能入大腸，兼通大便。……木通能通心火，故治淋瀝。”此均說明 通的主要作用。

茯苓（本草經）

【别名】茯灵、云苓、赤茯苓、白茯苓。

【主要产地】云南、安徽、河南、湖北、浙江等地。

【药用部分】本品是担子菌綱植物寄生于松根腐朽部分的菌类。干燥后供药用。为类球形的块状物，大的如瓜，小的如拳，外表粗糙而呈褐色，有疣状突起，外皮坚硬，内面为粉質。呈白色者称白茯苓，呈淡紅色者称赤茯苓，白茯苓中心有細松根穿过的，称为茯神。茯苓切下的外皮，称为茯苓皮。

茯苓以云南野生品为最佳，安徽产的次之。一般以内部緻密而有粘質者为上品；其質輕而粘性少的老苓为次品。

【炮制】单用或硃砂拌用，或去皮水浸一夜，切片晒干用。

【性味和归經】味甘淡，性平无毒。入心、肺、肾、脾、胃五經。

【应用】茯苓能利水除湿，健脾和胃，安神宁心，消痰逐飲。主治水腫脹滿、小便不利、胸腹脹滿、气促喘粗、口舌干燥、脾胃虛弱等症。“元亨疗馬集”說：“白茯苓健脾，去皮用；赤茯苓利小腸。”病畜多汗、尿频、津液耗伤者忌服。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分

至 1 錢。

【附歌】茯苓甘平，除湿开胃，白苓健脾，赤苓利水。

【配伍】配远志、黄芩、知母、貝母、梔子等，治惊恐、癲癇等症；配人参、桔梗、白芷（鎮心散），治馬心风惊悸，癲狂不宁；配远志、黄芩、知母、蒲黄、貝母、梔子、藁本、朴硝（鎮心散，牛經），治牛心风狂病。

按：茯苓行气而緩和，利水而不伤正气，为通补之藥。此因乃古松精华蘊結而成，入地最久，得气最厚，其質重，其气清，其味淡。由于重能培土，清能益金，淡能利水，所以能治虚热虚火，脾虛痰湿，又能为諸阴藥之佐而去其滯，为諸阴藥之使而宜其道。繆希雍說：“白者入气分，赤者入血分。补心益脾，白优于赤；通利小腸，专除湿热，赤亦胜白。”

澤泻（本草經）

【主要产地】福建、江西、浙江、陝西、安徽、四川等地。

【藥用部分】本品系澤泻科多年生草本植物，入藥用其地下塊莖，剝去外皮干燥而成。全形呈不整形的球状，直徑 1 至 2 寸，外表黃白色或灰黃色，全体有环节状突起，質坚硬；其橫切面为黃白色。以个大質坚者为佳。四川产的个较小，質松粗糙，粉性少，較次。

【炮制】除去須根和根莖外皮，洗淨，火烤，焙去油分。炮制时用清水浸 20 小时，放入缸中悶透，再切片，晒干，生用或盐水炒用，或酒浸一夜，炙用。

【性味和归經】味甘咸，性寒无毒。入腎、膀胱二經。

【应用】本品能利水除湿，消肿下乳，除痰飲，止泄痢。主治水

肿胀满、小便淋瀝、膀胱停水、尿血、泻痢、风寒湿痹、筋骨挛缩等症。对于肝、肾虚而无湿热者禁用。但服量过多则可昏目，应予注意。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和鷄 2 分至 4 分。

【附歌】澤泻甘寒，利水除湿，水肿脹滿，止痢下乳。

【配伍】配白朮、茯苓、猪苓、桂枝等，治小便不利。

【附方】治牛膀胱脹方（江西）。

澤泻 知母酒炙 黄柏 茵陈 猪苓 甘草 牵牛子 海金沙 地肤子 淡竹叶

上药煎水，候温灌服。

猪苓（本草經）

【别名】朱苓、豕猪屎、地烏桃。

【主要产地】主产于河北、山西、河南、陝西、四川、云南等地，其他各地也有出产。

【药用部分】本品屬多孔菌科植物猪苓菌，寄生于楓树根部，入药用其干燥的菌塊。其形如猪屎，外表呈灰褐色而粗糙，为不整形塊，凹凸不平，質堅而輕；其折断面为灰白色顆粒性。以皮黑肉白質重者为佳。如質輕能浮于水面者，则为次品。

【炮制】洗淨阴干，剔除凹处砂石，用水湿润后切片用。

【性味和归經】味甘淡，性平无毒。入肾、膀胱二經。

【应用】本品能利水除湿。主治水腫脹滿、小便不利、尿閉、发热口渴等症。誤用多量时能損腎气，且使目昏。病畜虛弱而不食水草者忌服。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 3 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢。

【附歌】猪苓甘平，利水除濕，水腫尿閉，應用相宜。

【配伍】配茯苓、木通、黃柏、牽牛子等，治尿閉；配黃芩、地黃、
阿膠等，治氣衰。

【附方】治馬冷腸泄瀉病方（吉林）。

猪苓 澤瀉 木通 茵陳 瞿麥 青皮 厚朴 蒼朮 枳殼
當歸 木香 藿香

以上共研為末，用開水沖之，候溫灌服。

按：猪苓利水和茯苓同功，如生用則效能更佳，但補性却不如
茯苓。時珍說：“猪苓淡滲氣升，而又能降，故能開腠理，利小便，與
茯苓同功，但入補藥不如茯苓也。”

防己（本草經）

【別名】解離、解石。

【主要產地】陝西、湖北、四川、貴州等地（漢防己）；浙江、江
西、廣東等地（木防己）。

【藥用部分】本品是防己科藤本植物，有漢防己和木防己兩
種，入藥均用其根。

漢防己（又名粉防己）：干燥根呈不規則圓柱形，大多屈曲，一
般切成塊段，長約 2 至 3 寸，粗約 4 分至 1 寸多，其外表呈灰黃色，
質堅硬；橫斷面為灰白色或灰黃色，有數條粗髓綫自中心輻射狀散
出，直達外皮，為粉質。

木防己（又名廣防己）：干燥根呈圓柱形，多半縱破為二，長約
2 至 3 寸，粗約 1 寸至 1 寸 5 分，外皮呈灰黑色而有縱皺，質堅而
輕；其橫切面呈黃白色，有淡褐色的髓綫自中心輻射狀散出，亦為



图 35 防 己

上左、木防己； 上右、汉防己； 下、药用部分外形：1.木防己， 2.汉防己。

粉質。

【炮制】水浸一日，滤出，然后放入罐中闷透，再切片，阴干生用，或酒炒用。

【性味和归經】味苦辛，性寒无毒。入膀胱經。

【应用】本品能清热利水，祛风止痛。主治水腫、下焦湿熱、癰腫惡結、肺氣喘咳、四肢骨節腫痛或麻木不仁等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和雞 4 分到 6 分。

【附歌】防己苦寒，主治水腫，祛風止痛，風濕要藥。

【配伍】配延胡索、茴香、烏頭、麻黃、肉桂等，治骨節風濕症；配陳皮、知母、款冬花、杏仁等，治肺勞傷。

【附方】防己散（元亨疔馬集）：治馬肺咳不止，傳于大腸，咳時屁出遺糞。

漢防己 白牽牛 款冬花 桑白皮 陳皮 甘草 知母 黃柏 木通 杏仁去皮尖

上為末，蜜、姜為引，水煎三沸，草后灌服。

按：漢防己功能治水，木防己功能治風。因其辛苦大寒，性燥而健，善走下行，長于除濕通竅利道，為瀉下焦血分濕熱及疔風行水之藥。故水濕喘咳、水腫風腫、癰腫惡瘡、四肢拘痛，及濕流入十二經、二便不通都可以應用。若四肢腫痛，因濕則加蒼朮、木瓜、薏苡仁；因熱則加黃芩、黃柏；因風則加羌活、草薢；有痰則加竹瀝、天南星；疼痛則加木香、香附；如血虛則加當歸、熟地、川芎、白芍；如痛連前膊則加桂枝、威靈仙；如痛連脇則加龍胆草，功效較好。但此藥力猛而速，無下焦血分實熱實濕，及二便不利者，應禁用。

通草（綱目）

【別名】通脫木、方通草、白通草、絲通草、通条。

【主要產地】四川、貴州、廣西、湖北、陝西、西藏等地。

【藥用部分】本品屬五加科灌木，其莖髓供藥用。干燥的通草，呈長圓柱形，長約4至5寸，質軟體輕，容易折斷，如用指壓之則扁，若製成方形薄片者，稱為方通草；如成絲條者，則稱為絲通草，以體軟色白者為佳。

【炮制】原药折断用。

【性味和归经】味甘淡，性微寒无毒。入肺、胃二经。

【应用】本品能利水，清肺湿热，下乳行气。主治水腫、小便不利、肺热、喘急、乳少等症。对于气虚无湿热者忌用。

【用量】馬和牛 3 錢至 7 錢；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 2 分至 7 分。

【附歌】通草淡寒，利水降热，水腫尿閉，肺热喘急。

【配伍】配續随、膩粉、滑石、生油、治馬腸結；配党参、当归、白朮、巴戟天、連翹、桂枝、酸枣仁、乳香、沒药、枳壳、大枣、王不留行（四川），治乳汁不通。

按：通草、木通都是利水药，但亦有不同之处。通草味甘淡，功能泻肺热，行气分，利小便，消水腫。木通則味苦性寒，能清心火而入血分，主治小便短赤。应用时須注意。

滑石（本草經）

【别名】液石、画石、化石、滑石粉。

【主要产地】广西、广东、湖南、江西、四川、云南、山东、福建等地。

【原药形态】本品系天然滑石。四川出产的色微青。其質柔軟而滑膩者，品質較好。

【炮制】揀去杂质，打碎成小塊用，即塊滑石；將小塊研粉放入水缸中沉淀，取浮于水面的一層，去水晒干研細，即为飞滑石。

【性味和归经】味甘，性寒无毒。入胃、膀胱二经。

【应用】本品能利水、除湿，止渴，除煩燥，下乳汁。主治二便有热、水腫、暑热煩渴等症。

【用量】馬和牛 6 錢至 3 兩；羊和猪 2 錢至 6 錢；兔和鷄 5 分至 2 錢。

【附歌】滑石甘寒，特利小腸，滲濕利水，除煩止渴。

【配伍】配朴硝、木通、車前子、牽牛子等，治小便不通。

【附方】滑石散（元亨疔馬集）：治馬胞轉。

滑石 澤瀉 灯芯 茵陳 知母 黃柏酒炒 猪苓
上葯爲末，水調煎，入童便，帶熱空草灌之。

薏苡仁（本草經）

【別名】米仁、薏珠子、薏苡米。

【主要產地】我國各地都有出產，其中以江蘇、安徽、浙江、四川、山東等地產量較多。

【葯用部分】本品屬禾本科一年生草本植物，入葯用其干燥的子仁。呈橢圓形，長約 1 分半，寬約 1 分，外表爲類白色，質堅脆，斷面有粉質。

【炮制】晒干，搗去外殼，揚淨，以清水噴濕，放入籬筐內，踩去表面黃皮，晒干，即成洁白的成品，生用或炒用。

【性味和歸經】味甘，性微寒無毒。入脾、胃、肺三經。

【應用】本品能清熱燥濕，健脾補肺，下氣行水。主治骨節疼痛、筋肉拘急、風濕水腫、肺萎、肺癰、不進料草等症。對於馬中焦極冷時，雖筋肉拘急，亦應忌服。

【用量】馬和牛 8 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 8 錢；兔和鷄 5 分至 2 錢。

【附歌】薏苡仁寒，下氣行水，清熱燥濕，止痛消腫。

【配伍】配赤茯苓、澤瀉、木瓜等，可治水腫，利小便；配蒼朮、

汉防己、羌活、独活、木瓜，治后肢风湿肿痛。

按：薏苡仁不仅燥湿行水，并极富滋养，为清补之品，若入强壮补剂中，能强壮病体，有益于肺。訥菴說：“泻水所以益土，故健脾益土，所以生金；……扶土所以抑木，故治风热拘攣。”甄权說：“治肺萎肺膿者，土为金之母，虚则补其母也。”这就说明了薏苡仁的药性。

地肤子（本草經）

【别名】落帚、地麦、地葵、鉄扫帚、千头草、千透子。

【主要产地】南方田野到处都有，其中以江苏、浙江产量较多。

【药用部分】本品属藜科一年生草本植物，入药用其干燥的果实。全形呈细小扁球状，直径约半分，呈黄褐色或灰褐色，有五稜，包裹五片宿存萼，常混有破碎的干燥叶和花。

【炮制】采取成熟果实，除去枝叶杂质，晒干，即为成品。

【性味和归经】味甘苦，性寒无毒。入膀胱经。

【应用】本品能利水通淋，除皮肤风热，补中益精气。主治膀胱热、尿淋、皮肤瘙痒、公畜阳痿等症。对于阴虚而无湿热或尿多时忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】地肤子寒，利尿通淋，除湿去热，补中益精。

【配伍】配知母、猪苓、赤芍药、通草等，治尿淋；配五倍子、蛇床子、五加皮、苍朮，治牛湿热瘙痒；配明矾、荆芥、防风、花椒、艾叶、野菊花，外洗阴户瘙痒。

篇蓄（本草經）

【別名】扁竹、粉节草、通生草。

【主要产地】我国各地的田野或路旁都有生长。

【葯用部分】本品系蓼科一年生草本植物，其干燥全草供葯用。其干燥莖叶呈綠褐色，莖圓，有細縱綫，节明显，有殘留叶鞘状的托叶，叶互生而皺縮。

【炮制】全草洗淨，去根，晒干，切碎用。

【性味和归經】味苦，性平无毒。入胃、膀胱二經。

【应用】本品能利水通淋，清火杀虫，去湿消肿。主治小便不利、尿淋瀉痛、恶疮疥痒等症。凡无湿热以及胎前产后，均应忌用。

【用量】馬和牛5錢至1两；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】篇蓄苦平，利水通淋，清热去湿，消肿杀虫。

【配伍】配瞿麦、木通、車前子、地骨皮等，治小便不利。

【附方】篇蓄散（安驥葯方）：治馬热发多饒狂惊及倒地或揩擦毛焦受塵病。

篇蓄 瞿麦 木通 防风 薄荷 石膏 車前子 甘草 大
黄 板藍根 荆芥 山梔 黄芩 地骨皮 黄连
上葯为末，蜜为引，水煎放冷，草后灌之。

瞿麦（本草經）

【別名】巨句麦、南天竺草。

【主要产地】长江流域以南地区，到处都有，以广东北江等地的产量多而品質較好。

【药用部分】本品是石竹科多年生宿根草本植物瞿麦的干燥全草。其干燥的莖叶呈黄绿色，莖圆柱形，粗约半分，处处有稍隆起的节，叶对生，为线状披针形，叶基抱莖互相癒合。

【炮制】花未开时，平地面割取，去杂质，扎成小把，晒干，用清水湿润后，切断用。

【性味和归经】味苦，性寒无毒。入心、小腸二经。

【应用】本品能利水清热，破血，墜胎。主治小便不利、热淋有血、水肿，亦能下胞衣，下死胎。但虚弱羸瘦者及胎前产后忌用。

【用量】馬和牛6錢至1两5錢；羊和猪2錢至4錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】瞿麦苦寒，利水清热，破血下胎，孕期宜戒。

【配伍】配木通、車前子、澤泻、猪苓等，治膀胱热、小便不利等症。

海金砂（嘉祐）

【别名】竹园葵。

【主要产地】广东、湖北、湖南、江西、江苏、浙江、貴州等地。

【药用部分】本品屬海金砂科多年生藤本植物，入药用其干燥孢子。孢子呈橙褐色，細如砂土，遇火爆鳴而燃燒，質輕，投入水中，則浮于水面。

【炮制】割取莖叶，曝晒，用小木棒不断的打，使孢子落下，篩去莖叶杂质，即为成品。

【性味和归经】味甘，性寒无毒。入小腸、膀胱二经。

【应用】本品能通淋利湿，泻膀胱湿热。主治尿淋急痛、小便不利、尿血、狂热等症。对于腎虛无湿热者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和雞 3 分至 6 分。

【附歌】海金砂寒，利水清火，膀胱濕熱，尿血亦可。

【配伍】配澤瀉、滑石、木通、茯苓等，治小便不利、水腫等；配大戟、滑石、穿山甲，治胎衣不下。

按：海金砂主要是通小腸血分之藥，凡小腸熱閉，而見淋痛不止者，服之可使熱从小便而出。若傷寒熱閉，而見腹滿狂燥，則應加梔子、朴硝、礞砂，使熱亦从小便而出。但腎臟真陽不足者忌用之。

灯芯草（开宝）

【別名】虎須草、碧玉草。

【主要產地】产于江南池沼地，江西撫州、江苏苏州及浙江、湖南、四川、福建等地產量較多。

【藥用部分】本品是灯芯草科多年生草本植物灯芯草的莖髓。呈細長圓柱形，粗約半分至 1 分，通常截成數寸一段，呈白黃色，質輕軟，壓扁後不能彈起。

【炮制】灯芯難研末，可用粳米粉漿過，晒干研末，入水澄之，上浮的是灯芯，撈起晒干；亦有用火煨成灰者。

【性味和歸經】味甘，性寒無毒。入心、肺、小腸三經。

【應用】本品能降心火，清肺熱，利小腸。主治小便不利、尿淋。外用敷各種瘡毒。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 2 錢至 5 錢；兔和雞 5 分至 1 錢。

【附歌】灯芯甘寒，降火清熱，主利小腸，多作引藥。

【配伍】配刘寄奴、冰糖，敷外伤出血及疮毒。

淡竹叶（綱目）

【主要产地】各地都有出产。其中以浙江、江西、福建、广东、四川、江苏、安徽等地产量较多。

【药用部分】本品是禾本科多年生草本植物淡竹叶的干燥茎叶。叶呈广披针形，多皱缩，在纵平行脉中有明显的小横脉，外表呈黄绿色。

【炮制】揀淨杂草，去根，切断晒干用。

【性味和归經】味甘淡，性寒无毒。入心、小腸二經。

【应用】本品能清心火，利小便，除煩热，止溺血。主治胸中痰热、逆气、肺萎、衄血、小便不利等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 6 錢；羊和猪 2 錢至 5 錢；兔和雞 2 分至 4 分。

【附歌】竹叶甘寒，清火除热，主利小便，并作引药。

【配伍】配黃連、梔子、黃柏、木通、連翹等，可治热症。



图 36 淡竹叶

【附方】治牛膀胱脹方(江西)。

淡竹叶 車前草 木通 香薷草 灯芯草 生地黃
煎水內服。

赤小豆 (本草經)

【別名】赤豆、紅豆。

【主要产地】我国各地都有出产。

【药用部分】本品屬豆科一年生草本植物，入药用其干燥的種子。呈长椭圆形，种皮为赤褐色而有光泽，脐点突起，种仁黄绿色，質堅脆。

【炮制】洗淨，晒干，打碎用。

【性味和归經】味甘酸，性平无毒。入心、小腸二經。

【应用】本品能利水气，泻湿热，清热解毒，消肿排膿，止煩渴。主治疮黃肿毒，內热，泻痢，并可外敷疮毒。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两；羊和猪 3 錢至 5 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】赤小豆平，利水消肿，癰疽恶疮，散血排膿。

【配伍】配滑石、木通、知母、黃柏、官桂、苦竹叶(貴州)，治馬小便不通；配芙蓉叶(清涼膏，四川)，可外敷肿毒。

表 28 渗湿利水药归纳简表

药 名	性 味 及 归 经	功 用	用 量 (钱)		
			马 牛	羊 猪	兔 鸡
車前子	甘寒,入肝、肾、小腸	利水清热,止泻除湿	5-15	2-4	0.4-1
木 通	苦寒,入心、肺、小腸、膀胱	引导湿热,利水消肿	6-13	1-2	0.4-1
茯 苓	甘淡平,入心、肺、肾、脾、胃	清湿利水,补脾宁心	5-20	2-4	0.5-1
澤 泻	甘,咸寒,入肾、膀胱	利水除湿,消肿下乳	5-10	2-3	0.2-0.4
猪 苓	甘淡平,入肾、膀胱	利水渗湿,水肿尿闭	5-13	2-4	—
防 己	苦辛寒,入膀胱经	利水消肿,祛风解表	5-15	2-3	0.4-0.6
通 草	甘淡,微寒,入肺、胃	利水降热,水肿尿闭	3-7	1-2	0.2-0.7
滑 石	甘寒,入胃、膀胱	利水渗湿,止渴除烦	6-30	2-6	0.5-2
薏苡仁	甘微寒,入脾、胃、肺	下气行水,清热除湿	8-20	2-8	0.5-2
地肤子	甘苦寒,入膀胱经	利水除湿,补中益精	5-15	2-4	0.4-1
薦 蓄	苦平,入胃、膀胱	利水通淋,去湿消肿	5-10	1-3	0.2-0.5
瞿 麦	苦寒,入心、小腸	利水清热,破血下胎	6-15	2-4	0.2-0.5
海金沙	甘寒,入小腸、膀胱	利水清火,膀胱湿热	5-15	2-4	0.3-0.6
灯芯草	甘寒,入心、肺、小腸	利水去湿,降火清热	5-10	2-5	0.5-1
淡竹叶	甘淡寒,入心、小腸	利水去湿,解热清心	5-16	2-5	0.2-0.4
赤小豆	甘酸平,入心、小腸	利水消肿,散血除毒	5-10	3-5	0.2-0.5

第五章

化痰止咳平喘藥

凡能祛痰或化痰，从而減輕或制止咳嗽的藥物，就称为化痰止咳藥。凡能緩解喘急的藥物，就称为平喘藥。

咳嗽一般多挟有痰，痰不仅能引起咳嗽，而且痰多时，由于肺气壅塞，气逆失降，易致喘急，所以化痰止咳藥，亦常有平喘的功効。因为这些藥物有不可分割的关系，所以把它們列在一章內来叙述。

严格說来，止咳、化痰、平喘藥亦各有其主治的范围，而它們的功用也有不同之处。治疗时应根据不同的病因和病情，选用或选配各种不同的藥物。例如因外感（风、寒、暑、湿、燥）引起的咳嗽，除选用本章藥物外，应配以解表藥；因虚勞引起的痰咳，則应配以补养藥；因痰結而引起的咳嗽，必須首先选用化痰藥；非因痰壅而引起的喘急，主用平喘藥，或用标本兼治的方法。

由于喘急宜平，气逆咳嗽宜降，燥咳宜潤，热咳宜清，痰結宜化，寒痰宜温，所以化痰止咳平喘藥可分为止咳平喘藥、化痰降气藥、潤肺化痰止咳藥与清肺化痰止咳藥等四类。茲分述于下。

第一节 止咳平喘药

桔梗（本草經）

【别名】苦桔梗、白桔梗、梗草。

【主要产地】本品主产于江苏、安徽、江西等地，其他各省也有出产。

【药用部分】本品系桔梗科多年生草本植物，入药用其根。干燥根呈纺锤形，微弯曲，长约2至6寸，上端粗约4至7分，外表呈类白色或黄白色，有绞转扭曲的深纵皱，质轻松而易折断；折断面呈类白色或黄白色，外皮被以暗褐色的栓层，皮部与木部的厚度略同。

【炮制】原药用水湿润，使柔软，切片晒干，生用。

【性味和归经】味苦辛，性微温无毒。入肺经。

【应用】本品能止咳化痰，除壅排脓，宣肺气，散风寒。主治外感咳嗽肺热、肺癰、痰壅气逆、胸胁气痛、喉痹咽痛等症。对于阴虚咳嗽者忌用。

【用量】马和牛5钱至1两3钱；羊和猪1钱至2钱；兔和鸡3分至5分。

【附歌】桔梗苦辛，化痰止咳，载药上浮，宽胸利膈。

【配伍】配葶藶子、黄芩、贝母、款冬花、马兜铃、明矾、麻黄、细辛等，治外感咳嗽；配瓜蒌仁、枳壳、厚朴、枇杷叶、黄芩、百合等，可宽胸利膈，化痰止咳。

【附方】治马啞嗽（陕西）。

桔梗 蒼朮 当归 瓜蒌 知母 馬兜鈴 天門冬 五味子



图 37 桔 梗

左、桔梗原植物；右、药用部分外形及横切面。

上药研末，用开水调匀，候温灌服。

按：桔梗苦辛，为开提肺气、宣泄上焦之药，功能治肺实胸胁作痛及肺癰咳吐膿血。在临症运用上，配貝母、前胡或麦門冬、阿胶，

治干咳；配杏仁、貝母、远志、瓜蒌，則能化痰止咳。逆气加陈皮，涎咳加知母、貝母，咳渴加五味子、葛根，气虛加党参，嘔吐加半夏、生姜，吐膿血加紫苑，肺萎加阿胶，胸膈不快加枳壳，痞滿加枳实，目赤加梔子、大黃，去風寒加荆芥、防风。总之，桔梗用途較广，因其性有升浮上行作用，所以有宣肺气及散風寒的功用，張洁古称桔梗为舟楫之剂，能載諸药上浮，就是这个含意。但阴虛咳嗽，不可輕用。

款冬花（本草經）

【别名】冬花。

【主要产地】陝西、山西、河北、河南、浙江、甘肅等地。

【药用部分】本品系菊科多年生草本植物，入药用其花蕾。干燥花蕾常2—3个集生在一花軸上，花軸微弯曲，呈黃褐色，花蕾外層有多数鱗片狀的总苞片，呈淡紫色，長約3—4分，質輕，可供药用。

【炮制】采集后，揀去花梗，晒干，生用或蜜炙用，炒焦用。

【性味和归經】味辛甘，性溫無毒。入肺經。

【应用】本品能下气、止喘，潤肺止咳。主治气喘、咳逆上气、肺癰、鼻流膿血、肺萎等症。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪1錢至3錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】款冬花溫，止喘下气，潤肺止咳，功效佳良。

【配伍】配知母、貝母、馬兜鈴、桑白皮等，治肺熱咳嗽。

【附方】款冬花散（元亨疗馬集）：治馬非時惡喘。

款冬花 郁金 黃药子 白芨 玄参 白殭蚕

上药共研为末，蜜为引，用溫水調勻，草后灌服。

按：款冬花治肺病咳嗽，为和平之药，惟多配合他药应用，如与百合同用，则润而带补，可治喘咳痰中带血；与紫苑、百部同用，则润肺止咳，治上气发热、吐脓血、杀肺虫；与杏仁、麻黄同用，则祛肺寒，化痰止咳；与莱菔子、苏子同用，则降气除痰。

前胡（别录）

【主要产地】江苏、浙江、江西、广西、安徽等地。

【药用部分】本品是繖形花科多年生草本植物，入药用其干燥根。其干燥根略呈圆锥形，上端膨大而下端或有分枝，长约1至3寸，上端粗约4—5分，外表呈灰褐色，顶端有莖的殘基，其四周圍生有棕毛状物，并密布橫皺，有的往往由于皺紋層而形成节状鈍稜，根質輕松，易析断；断面呈黄白色，为纖維性。

【炮制】水浸后悶透，以中心部軟化为度，切片篩去蘆头及碎末，生用或炙用。

【性味和归經】味苦辛，性微寒无毒。入肺、脾二經。

【应用】本品能清肺化痰，宣散风热，降气止咳，安胎。主治胸腹肋脹、心腹結气、风热咳嗽、风邪寒热等症。对于无实热与外感者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1两3錢；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄3分至1錢。

【附歌】前胡苦寒，清肺化痰，宣散风邪，热咳能安。

【配伍】配柴胡、独活、桔梗、茯苓、枳壳等，治外感、喘咳等症。

按：前胡、柴胡均是风药，但功用主治则各不同。前胡味苦性微寒，入肺、脾二經，主下降，能散风驅热，降气祛痰，止咳安胎；而柴胡入肝、胆二經，主上升，引邪外出，多用于无实痰实气的病症，

如兼有外感风邪与痰火实结成疾，若用柴胡上升，犹如火上加热，故必须用前胡下降治疗。

百部（别录）

【别名】百条根、婆妇草、百步、野天门冬。

【主要产地】江苏、安徽、山东、河南、浙江、广东、福建、湖北、江西等地。

【药用部分】本品是百部科多年生藤本植物，入药用其干燥的块根。根呈纺锤形，长约2—4寸，粗约2—3分，下部膨大，上部渐



图 38· 百部(直立百部)

左、百部原植物；右、药用部分外形。

細，其干燥品有縱皺沟，外表呈灰黃色，質硬而脆；橫斷面為黃白色，往往有空洞。

【炮制】洗淨後，放入開水內燙過，待體軟即可取出（不可煮透，以免內心變黑），切片曬干，生用、炒用或蜜炙用。

【性味和歸經】味苦甘，性微溫，有小毒。入肺經。

【應用】本品能溫肺、潤肺，下氣止咳，消痰殺蟲。主治咳逆上氣、寒痰、虻蟲、蟯蟲，外治疥癩并除蠅、虱等。對於脾胃虛弱，大便泄瀉者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢。

【附歌】百部甘溫，溫肺止咳，下氣消痰，殺蟲有功。

【配伍】配枇杷葉、天門冬、麥門冬、桑白皮、貝母、沙參、紫苑、五加皮、甘草，治馬肺虛咳嗽。

【附方】百部散（元亨疔馬集）：治馬脾胃傷啞，右肋疼痛，回頭右顧。

百部 枇杷葉去毛 青皮 厚朴

上為末，葱白切碎、糯米粥、酒同調，飽灌。

按：百部、天門冬雖同一類，但功能主治有顯著的區別。百部苦甘微溫而不燥，具有開泄降氣殺蟲作用，能治肺寒久咳，殺蟲，外治疥癩、蠅、虱等；而天門冬性寒，宜治熱咳，無殺蟲功能。時珍說：“百部亦天門冬之類，故皆治肺病殺蟲，但百部溫，寒嗽宜之，天冬寒，熱咳宜之。”

據歷代文獻記載，使用百部殺蟲方法，有內服、外敷、烟熏三種。如治虻蟲、蟯蟲，則用內服法；治疥癩、蠅、虱，則用外塗法。殺樹木蛀蟲，可用烟熏的方法。

馬兜鈴（开宝）

【别名】馬斗苓。

【主要产地】山西、山东、江西、湖南、湖北等地，南方其他各省也有出产。

【药用部分】本品是馬兜鈴科多年生藤本植物，入药用其果实。根称青木香（土青木香），亦作药用。

本品的干燥蒴果呈卵圆形，长约1寸至1寸半，粗约7分至8分，外表为暗褐色，有六条縫綫，成熟时开裂分为六瓣，果柄位于较小的一端，亦随分蒴而裂为六裂，如細絲状。种子为三角形，扁平而有寬翅，呈深褐色。

【炮制】将果实剪下，阴干后，去淨莖叶，生用或蜜炙用。

【性味和归經】味苦辛，性微寒，有小毒。入肺、大腸二經。

【应用】本品能清肺热，定喘降气，化痰止咳。主治肺热喘咳、肺气上逆等症。对于肺虚寒喘咳嗽者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1两；羊和猪1錢至4錢。

【附歌】馬兜鈴寒，定喘降气，化痰清肺，虛寒不宜。

【配伍】配葶藶子、玄参、升麻、牛蒡子、黄耆、知母、貝母（葶藶散，安驥药方）治喘；配大黄、黄芩、貝母、杏仁等，可治鼻膿不止。

【附方】大黄散（元亨疗馬集）：治馬鼻膿不止。

馬兜鈴 大黄 秦艽 黄芩 荆芥 莪朮 朴硝 白芷 杏仁 甘草 茴香 知母 貝母 茵陈 汉防己 瓜蒌根 黄药子 白药子

共为末，蜜为引，开水冲，候温灌服。

按：馬兜鈴能清热降气，多用蜜炙以取其潤，但无补肺功能。它

与紫苑均有疏通壅滯，止咳化痰的作用，但馬兜鈴性微寒，主治热喘咳嗽；紫苑性微温，主治寒喘咳嗽。这就是二者的不同点。

白前（別录）

【别名】石藍、嗽葯。

【主要产地】浙江、山东、安徽、河南、广东、江苏等地。

【药用部分】本品是蘿藦科多年生草本植物，入药用其地上莖、根莖和根。其地上莖呈圆柱形，中空如管，长约2—3寸至5—6寸，粗约半分至2分，外表为灰黄褐色，有細縱皺，并有对生的叶迹，微突起，管内壁为白色。其根莖的节部膨大，散生多数須根，外表呈黄褐色或赤褐色，質地坚硬，内部充实，节間仍为管状，但管壁較厚。

【炮制】切片晒干，生用。

【性味和归經】味辛甘，性微寒，无毒。入肺經。

【应用】本品能泻肺降气，祛痰止咳。主治咳嗽喘滿、肺气壅实、胸膈逆滿等症。对于无实邪壅肺者应小心使用。

【用量】馬和牛6錢至1两2錢；羊和猪1錢至4錢；兔和鷄4分至8分。

【附歌】白前辛寒，祛痰止咳，泻肺治喘，胸膈逆滿。

【配伍】配紫苑、远志、大戟等，治久嗽上气。

按：白前能祛痰而利肺气，如以温葯相佐，則效果更佳。例如与紫苑同用，因其泻肺不补，而痰能降，气乃安，故肺气壅实兼有痰凝塞时，用之有效。但若无实邪壅肺者，不宜使用。

白果（日用本草）

【别名】銀杏。

【主要产地】我国各地都有，河南、广西等地产量较多。

【药用部分】本品是银杏科落叶乔木，入药用其成熟的种子。呈椭圆形，长约4—5分，粗约3—4分，外表呈灰白色，坚厚、光滑而平坦；种仁为黄绿色，质软。

【炮制】去壳，剥去黄色种皮，捶碎用。

【性味和归经】味甘苦而濡，性平、无毒。入肺经。

【应用】本品能敛肺气，定痰喘（熟用），杀虫（生用）。主治喘咳、尿白浊，外用可治疥癩。对于有实邪者禁用。

【用量】马和牛8钱至2两；羊和猪2钱至4钱。

【附歌】白果甘平，敛肺定喘，杀虫治疥，兼治白浊。

【配伍】配麻黄 苏子 款冬花 半夏 黄芩等，可治哮喘。

曼陀罗（綱目）

【别名】洋金花、曼陀罗华、风茄儿。

【主要产地】温带地区到处都有野生。

【药用部分】本品是茄科一年生草本植物，入药用白花曼陀罗或紫花曼陀罗的花和叶。干燥的花，其筒状花冠缩成带形，长约2—3寸，外表为黄褐色，尖端五浅裂，质柔软。干燥的叶，为广卵圆形，先端短尖，边缘呈波状，或有疏锯齿，呈深绿褐色。

【保管】将干花扎成小把，密封石灰缸中，以防霉蛀。临用时可切成丝或研末用。

【性味和归经】味辛，性温有毒。入肺经。

【应用】本品能祛风湿，止哮喘（亦可烧烟熏鼻）。主治气喘咳嗽、寒湿痹痛。对于体弱者禁用。

【用量】花：马和牛2钱至5钱；羊和猪3分至5分。叶：加

倍量。

【附歌】曼陀罗温，止喘祛风，风湿痹痛，有毒慎用。

旋复花（本草經）

【別名】金沸草、金錢花、六月菜。

【主要产地】广西、广东、江苏、浙江等地。

【藥用部分】本品是菊科多年生草本植物，入藥用其干燥的花。呈扁球形，質輕，直徑約3至6分；瓣片为金黄色，多卷曲。

【炮制】采集后晒干，用手压平，装袋。原藥布包入煎。

【性味和归經】味咸，性温，有小毒。入肺、大腸二經。

【应用】本品能消痰健脾，降气行水，明目。主治喘咳、痰涎胶結、胸滿胁痛、肺胃气虛、水肿、目疾等症。对于泄瀉者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1两5錢；羊和猪2錢至4錢。

【附歌】旋复花温，健脾寬胸，降气行水，主治咳喘。

【配伍】配决明子、青葙子、龙胆草、黃連、梔子、郁金等，治馬眼內障。

【附方】治牛腦中毒（旋轉風）方（江苏）。

旋复花 天竹黃 菊花 防风 石决明 决明子 刺蒺藜
青葙子 淨蟬蛻
水煎，連服二剂。

第二节 化痰降气藥

半夏（本草經）

【主要产地】湖北、湖南、江苏、安徽、山东、江西、福建、四川等

地,其中以湖北江陵产者为佳。

【药用部分】本品系天南星科多年生草本植物,入药用其干燥块茎。呈扁球形或椭圆形,直径约1分半至5分,外表呈类白色,一面凹入呈臼状,在凹窝的四周有多数细小的窝点,质坚脆;其断面呈白色粉状,嚼之刺舌。以陈久的较好,生则有毒,所以必须制过再用。一般以粒大而色白的为佳。




图 39 半 夏

左、半夏原植物；右、药用部分外形。

【炮制】半夏的制法很多,主要有下列几种:

姜半夏:以生半夏放入清水内浸泡七天,每天换水二次,以保持水的清洁,捞出后,每斤半夏放二两生姜(须切片或打碎)同入蒸笼内蒸,蒸至中心无白色星点为止,即倒出晒干,然后去姜渣,捶碎用或切片用。

法半夏：以生半夏入清水浸泡兩天，每天換水兩次，撈出然後用百分之三十的生薑和百分之四十的明礬（須搗碎），一層半夏，一層生薑、明礬，層層鋪勻，再注入清水浸沒，經二十四天後，撈出晒干，切片或打碎用。

【性味和歸經】味辛，性溫有毒。入脾、胃二經。

【應用】本品能燥濕化痰，降逆止嘔，止咳，消腫散結，和胃健脾。主治胸膈脹滿、逆氣、胃冷、心痞痛、咽喉腫痛、反胃吐食等。生半夏外用敷癰腫止痛，亦作為吹鼻藥。對於口渴、肺虛、多汗液耗或無寒濕及陰虛者忌服。孕畜禁用。反烏頭。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢。

【附歌】半夏辛溫，燥濕化痰，嘔咳痞痛，生用敷腫。

【配伍】配生薑，溫脾暖胃；配升麻、防風、飛白礬（半夏散），治馬肺寒、口吐涎沫。

按：半夏味辛性溫有毒，生用研末吹鼻，可治中風昏迷；對於癰腫疼痛，敷之可止痛消腫。但內服必須炮制，或同生薑配伍入藥，否則會刺激咽喉，並有毒性。

半夏與貝母，均為化痰之藥，但半夏性溫燥，入脾、胃二經，功能燥濕化痰，降逆氣，故主脾濕不化而聚結的痰疾；而貝母寒潤入肺，功能清熱化痰，與半夏化痰有着顯然的不同。應用時應注意二藥的特點。元素說：“熱痰用半夏佐以黃芩，風痰佐以南星，寒痰佐以干姜，痰痞佐以陳皮、白朮，此則又隨佐而異也。”這可以作為臨床上用藥的參考。

天南星（本草經）

【別名】南星。

【主要产地】河南、安徽、福建、江西、湖北、江苏、浙江、山东、河北等地。

【药用部分】本品系天南星科多年生草本植物，入药用其块茎，去栓皮干燥后作为药用。全体呈扁球形，直径约1寸多，上面凹入，下面圆而平，四边常生有圆芽，外面呈黄白色，质坚硬；碎断面为白色，系粉质，嚼之刺舌，辛辣如灼。

【炮制】将生南星平铺蒸笼内，层层叠起，每层铺以生姜片，用火煮透，至中心无白色星点为度，切片阴干，就成为制南星。又有用湿纸包裹置于糠火中炮透的，称为炮南星。将天南星研末，置缸中，放入牛胆汁，拌匀浸没为度，日晒夜露，如果干燥，再加胆汁，如此3—4次，色即转褐，再放入牛胆中阴干，切片即成胆南星或简称胆星；以陈久者为佳。

【性味和归经】味苦辛，性温有大毒。入肺、肝、脾三经。

【应用】本品能祛风湿，化痰散结消肿。主治中风口噤、痰盛昏倒、口眼歪斜、四肢抽搐、破伤风、揭鞍风、痛肿等。外敷可治癰肿。对于阴虚燥痰以及孕畜忌服。

【用量】马和牛5钱至1两；羊和猪1钱至3钱。

【附歌】南星苦温，化痰除风，中风口噤，散结消肿。

【配伍】配冰片研末擦牙，治中风口噤；配芍药、当归、麻黄、桂枝、红花等，治五攒痛；配全蝎、白附子、白僵蚕、麻黄、乌蛇、川芎、刺蒺藜、海桐皮、防风、黑附子、甘草、藁本、天麻、桂心（麻黄散，蕃牧纂验方），治马心脏虚热、中风。

【附方】牡蠣散（安驥药方）：治马袖口阴肿，涂擦消肿毒。

天南星 缩砂仁 牡蠣_{燒过} 天仙子 木鼈子

上药为末，淡醋同调、煎沸，热擦涂上，自消。

按：天南星、半夏俱为治痰之药，因半夏味辛而能守，可用以治湿痰（寒痰）；天南星味辛而不能守，开泄走窜燥湿的作用很强，可以治风痰湿痰所引起的中风口紧、痰盛昏倒、口眼歪斜、全身风痹等症。生南星则可用以攻顽痰、风症痹硬疼痛，或外敷跌打瘀血肿痛、癰疽肿痛等。时珍说：“味辛而麻，故能治风散血；气温而燥，故能胜湿除痰；性紧而毒，故能攻积拔肿。”

白芥子（开宝）

【主要产地】全国各地都有出产。

【药用部分】本品系十字花科一年生或二年生草本植物，入药用其干燥种子。呈类球形，直径约半分，外表呈类黄色或黄褐色，药种皮薄；种仁为黄绿色，富含油脂。

【炮制】洗净晒干，簸去壳，炒后捣碎用。

【性味和归经】味辛，性温无毒。入肺经。

【应用】本品能化痰利气，发汗散寒，消肿止痛，解毒。主治胸胁满痛、咳嗽上气、寒痰凝结、筋骨关节疼痛等症。若用醋调外敷，可治肿毒。对于肺虚咳嗽时忌用。

【用量】马和牛 5 钱至 1 两 5 钱；羊和猪 1 钱至 3 钱；兔和鸡 5 分至 8 分。

【附歌】白芥子温，下气宽中，胸胁胀满，降痰止痛。

【配伍】配乌头、雄黄、蓖麻子等，外敷治疮肿；配桂枝、杏仁、半夏、厚朴等，可治风寒咳嗽。

【附方】蓖麻散（安骥药方）：治马关节疮肿痛。

白芥子 木鼈子 蓖麻去壳 葶藶子 草乌头 雄黄
上药共研为末，油调擦。

苏子（别录）

【别名】紫苏子、黑苏子。

【主要产地】見解表药紫苏項下。

【药用部分】本品是紫苏的成熟种子。呈卵形，长约半分至1分，外表为黄褐色；种仁呈黄白色，富含油脂。

另有一种白苏的种子，称白苏子，呈灰白色，較紫苏子稍大，功效稍次。

【炮制】揚淨洗后晒干，生用或炒用，用时搗碎。

【性味和归經】味辛，性温无毒。入肺經。

【应用】本品能降气定喘，温中祛寒，消痰止咳，利膈寬腸。主治肺气喘急、胸腹脹滿、反胃、胸膈有痰等症。对于腸滑气虚者慎用。

【用量】馬和牛 6 錢至 8 錢；羊和猪 2 錢至 5 錢。

【附歌】苏子辛温，止咳定喘，散寒降气，温中散滿。

【配伍】配前胡、厚朴、半夏、陈皮、沉香、当归、甘草等，治肺逆喘咳。

【附方】治小駒肚脹方（河南）。

苏子 萊菔子 枳櫟 陈皮 青皮 大黃 甘草

按：苏子与苏叶的不同点是苏子內含有油脂，所以能滑腸；至于表散之力，苏叶要稍强些。但苏子都是与他药配合来应用，例如时珍說：“同橘皮、砂仁，則行气安胎；同藿香、烏药，則温中止痛；同香附、麻黃，則发汗解肌；同川芎、当归，則和血散血；同木瓜、厚朴，則散温解暑；同桔梗、枳壳，則利膈寬胸；同杏仁、萊菔子，則消痰定喘。”此外，苏梗尚有安胎的功用。

萊菔子 (唐本草)

【別名】蘿卜子、卜子。

【主要產地】各地都有出產。

【藥用部分】本品是十字花科一年或二年生草本蘿卜的干燥種子。呈卵圓形而稍扁，長約1分，外表赤褐色或淡褐色，平滑；種仁呈淡黃色，富含油脂。

【炮制】洗淨，曬干，炒后退去皮用或碾碎用。

【性味和歸經】味辛甘，性平無毒。入脾、肺二經。

【應用】本品能降氣，定喘，化痰，消食，除脹，解毒。主治咳嗽痰喘、胸腹脹滿、食積氣滯等症。對於氣虛及脾弱者忌用。

【用量】馬和牛8錢至2兩；羊和豬2錢至4錢；兔和雞5分至1錢。

【附歌】萊菔子平，降氣化痰，胃弱食滯，解毒平喘。

【配伍】配當歸、白芍、枳殼、檳榔、車前子、甘草、烏梅、蜂蜜，治牛羊紅白痢疾。

【附方】理氣止咳散(四川)：治牛、豬風熱啞咳。

萊菔子 杏仁 桔梗 前胡 牛蒡子 檳榔 百部炙 藿香
共研為細末，開水沖服。

紫苑 (本草經)

【別名】返魂草、夜牽牛。

【主要產地】本品主要產於河北、河南、安徽、東北等地。

【藥用部分】本品系菊科多年生草本植物，入藥用其根莖和須根。干燥的根莖，位於須根的上部，長約5至8分，粗約3至6分，

外表呈黄褐色，下部密生紫褐色的须根，长约2—3寸，粗约半分，有细纵皱，质柔软。

【炮制】剪去硬苗，洗净，切片晒干，生用或蜜炙用。

【性味和归经】味苦甘，性温无毒。入肺经。

【应用】本品能泻肺降气，化痰止咳。主治咳嗽气喘、肺癰咳嗽、鼻流脓血、咽喉肿胀、小便短赤等症。对于阴虚肺热者忌用。

【用量】马和牛5钱至1两3钱；羊和猪1钱至3钱；兔和鸡2分至4分。

【附歌】紫苑苦温，化痰止咳，劳伤肺癰，降气宜用。

【配伍】配秦艽、贝母、马兜铃、款冬花、防己等，治马鼻湿。

【附方】紫苑散(元亨疗马集)：治马鼻湿。

紫苑 秦艽 当归 天門冬 百合 貝母 芍药 汉防己
款冬花 馬兜鈴 麦門冬

以上共为末，蜜、薤汁为引，同煎三沸，草后灌服。

按：紫苑、杏仁、桑白皮的作用稍有不同。杏仁、桑白皮为肺中气药；紫苑为肺中血药，故阴虚肺热者忌用。紫苑若配款冬花、百部，同蜜炙用，能化痰润喉，入肺杀虫；若配合生地黄、麦門冬，能入心宁神养血；配牡丹皮、赤芍药，能入胃清热凉血；如配合知母、贝母、阿胶、党参、桔梗、茯苓、甘草、五味子、莲肉，能治肺伤、劳热、咳嗽、肺痿、肺癰等症。

桑白皮 (本草經)

【主要产地】浙江、广东、江苏、四川、山东等养蚕地区均产。

【药用部分】本品是桑科落叶喬木桑树根部的白色内皮。干燥的桑白皮呈条带状，一般都截成一尺多长，厚约半分至1分，外面

呈灰白色而平坦，內面呈淡褐色，比較粗糙，質地柔軟而強韌，易縱裂而不易橫斷；橫切面呈白色，為纖維性。

【炮制】剝取十年以上的桑樹根皮，除去其黃色表皮，捶洗干淨，晒干，濕潤后切絲，生用或蜜炙用。

【性味和歸經】味甘，性寒無毒。入肺經。

【應用】本品能瀉肺火，行水，降氣開胃，化痰止渴。主治喘滿傷中、胸膈水腫、熱渴、喘咳、逆氣、衄血、腹脹等症。對於肺虛無火以及寒咳時忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分至 6 分。

【附歌】桑白皮寒，瀉肺行水，肺熱啞咳，化痰止渴。

【配伍】配紫蘇、杏仁、麻黃、青皮、陳皮、五味子、甘草（陝西），治牛馬外感風濕。

按：桑白皮能治喘嗽脹滿，在於瀉肺利水，因瀉肺氣而痰水喘嗽皆除。故肺中有水氣及肺火有餘時，適用。又根據古代文獻記載，桑白皮堅韌的纖維，可作金鎗傷口的外科縫合之用，例如蘇頌說：“桑根的白皮作綫縫金鎗腸出，更以熱雞血塗之，……而愈。”

第三節 潤肺化痰止咳藥

瓜蘤（本草經） 附：瓜蘤仁

【別名】括樓、括樓仁。

【主要產地】安徽、浙江、江蘇、江西、山東、陝西、廣西、河北、四川、湖北、雲南、廣東、福建等地。

【藥用部分】本品是胡蘆科多年生草質藤本植物，入藥用其干



图 40 瓜 蒌

左、瓜蒌原植物；右、药用部分外形：1. 根及果实(瓜蒌)，2. 瓜蒌仁。

燥的果实。种子称瓜蒌仁，根称瓜蒌根(即天花粉)，都作药用。

瓜蒌呈卵圆形，长约2至4寸，粗约1至2寸，外表呈黄赤色，干燥后有皱折，内面为淡黄色，皮有网状脉纹，内藏有多数种子，质轻而脆，全体称瓜蒌实。

瓜蒌仁呈扁平卵圆形，前端稍尖，中央微突起，长约4至6分，宽约2—3分，厚将近1分，外表呈淡褐色，种皮坚厚；种仁为类白色，富含油脂。

【炮制】瓜蒌实捣碎，生用；瓜蒌仁炒用或生用。

【性味和归经】味甘，性寒无毒。入肺、胃、大肠三经。

【应用】瓜蒌能清热化痰，润肺止咳，滑肠。主治肺热咳嗽、大便燥结等症。瓜蒌仁能润燥滑肠。主治衄血、口干、肠风下血、赤

白痢、大便燥結。對於脾胃虛寒，無實熱者禁用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和豬 2 錢至 4 錢，兔和雞 2 分至 5 分。

【附歌】瓜萐甘寒，清熱化痰，潤肺止嗽，仁能潤燥。

【配伍】配桔梗、前胡、牛蒡子等，治咳嗽；配馬兜鈴、黃藥子、茵陳、明礬、黃連、杏仁、陳皮等（瓜萐根散，安驢藥方），治肺氣。

【附方】治馬肺痿方（內蒙古）。

瓜萐 紫苑 知母 川貝母 桔梗 五味子 炙甘草 茯苓
人參 天門冬 麥門冬 阿膠 黃芩 天花粉 馬兜鈴 蜂蜜
生油為引，灌服。

天粉花（本草經）

【別名】瓜萐根。

【主要產地】同瓜萐項下。

【藥用部分】本品是瓜萐的根，剝去外皮干燥後作藥用。呈不規則的圓柱形，或扁平形，長約 3—4 寸，粗約 1 寸多，外表呈灰白色，為粉質，質硬而重；橫斷面為類白色，有棕色的小斑點。

【炮制】浸潤切片用。

【性味和歸經】味甘酸，性寒無毒。入肺、胃、大腸三經。

【應用】本品能潤肺益氣，止喘，生津止渴，通血脈，降火潤燥，下乳，排膿消腫。主治咳嗽、腸胃燥熱、尿頻、喉干，並治諸瘡。對於脾胃虛寒，無實熱者禁用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 4 錢；兔和雞 3 分至 6 分。

【附歌】天花粉寒，潤肺益氣，定喘降火，止渴生津。

【配伍】配馬兜鈴、黃葯子、茵陳、杏仁、明礬、黃連、陳皮，治馬肺氣病；配桔梗、金銀花、杏仁、貝母等，治喘咳。

按：瓜蒌根稱天花粉，子稱瓜蒌仁，皮稱瓜蒌皮，三種雖為同一植物，其功能稍有差異。天花粉因能潤肺生津，止渴消腫，所以可治咳喘、時熱大渴或癰疽腫毒；瓜蒌仁則以清胸中痰火，潤腸為主；而瓜蒌皮則以潤腸消痰並行，但其力較緩。

凡入肺治痰之劑，有宣、有下、有消、有攻、有潤，而瓜蒌的果實則是潤劑，但潤中亦有別，如瓜蒌清而潤，蘇子溫而潤，萊菔子消而潤，麥門冬補而潤，牛蒡子、杏仁散而潤。至於補肺以治痰，有五味子之收斂、除濕健脾以治痰；而半夏以溫燥治痰。

杏仁（別錄）

【主要產地】本品主產於山東、河北、陝西、安徽、東北等地，南方各省也有出產。

【藥用部分】本品是薔薇科落葉喬木杏樹的成熟種子，有苦杏仁和甜杏仁兩種。

苦杏仁：呈扁平心臟形，長約3至5分，寬約3分，其頂端略尖，基部為鈍圓，種皮薄，呈紅棕色，剝去種皮，可見到兩片乳白色的種仁，且有特殊的芳香。

甜杏仁：亦呈扁平心臟形，但較苦杏仁稍大，種皮較厚，其他基本上相同，但氣味較淡。

【炮制】原葯用沸水泡後，剝去皮尖，整用或搗碎用。

【性味和歸經】苦杏仁味苦，性溫有小毒。甜杏仁味甘，性平無毒。二者均入肺、大腸二經。

【應用】本品能潤肺，祛痰止咳，定喘，疏肺部風寒，潤大腸燥

結。苦杏仁主治寒痰、胸膈咳逆上氣、喉痹、燥結，且能去風痛，治癰瘤；馬涎多時亦用之。甜杏仁功專潤降，主治虛勞咳嗽。對於陰虛咳嗽者，苦杏仁當慎用。

據“齊民要術”中載，杏仁還可治馬瘡蹄瘡，即洗淨瘡口後，把杏仁搗爛和以豬油，塗四、五次即愈。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 4 錢。

【附歌】杏仁苦溫，潤肺止咳，定喘化痰，潤腸通便；甜者甘平，功專潤降。

【配伍】配桔梗、貝母、麥門冬、天花粉、知母等，治肺熱咳嗽；配蒼朮、阿膠、麥門冬、白芷、瓜蒌、牛蒡子、桔梗、明礬、姜黃（杏仁散），治牛肺傷、喘息。

【附方】杏仁散（元亨疔馬集）：治牛肺敗傷。

杏仁 百合 瓜蒌 知母 白礬 貝母 秦艽 梔子 荊芥
香草（即爛孩草） 蕎麥

上為末，蜜糖為引，一日灌二服。

按：杏仁有甜苦二種。甜杏仁甘平潤燥，多用於虛勞而引起的咳嗽；苦杏仁苦溫潤肺，多用於實邪所引起的喘咳氣逆。時珍說：“食杏仁多，致迷亂將死，用杏樹根切碎煎湯服即解。”

杏仁、桃仁功用略同，但杏仁治氣下喘，桃仁治血疔狂。東垣說：“杏仁下喘治氣也，桃仁疔狂治血也。俱治大便秘，當分氣血，……脈浮者屬氣，用杏仁、陳皮；脈沉者屬血，用桃仁、陳皮。”這可作為應用上的參考。

貝母（本草經）

【別名】川貝母、浙貝母、象貝母、大貝、珍珠貝、珠貝。

【主要产地】本品主产于四川、云南、浙江、江苏、河北、青海、新疆等地。其中以四川松潘、灌县产的品質最好，通常簡称为川貝；产于浙江宁波、象山一带的，称为浙貝或象貝。其他各地出产的还有种种名称。近年来江西彭澤等县也发现有野生的貝母，并大力进行栽培。



图 41 貝 母

左、川貝母； 右、浙貝母； 下、藥用部分外形：1. 川貝母的正面、側面及反面； 2. 浙貝母的正面及反面。

【藥用部分】本品系百合科多年生草本植物，入藥用其鱗莖。市上品種很多，主要的有川貝母和浙貝母兩種，茲分述如下：

川貝母：呈小球形或近圓錐狀，由大小二片肥厚鱗葉和其中包含的兩片小鱗葉所組成。長約2—3分，頭部尖，底部闊，外鱗葉呈內凹外凸的卵圓形，外表為白色或淡黃白色，內鱗葉小而狹長，呈淡黃色；質脆，粉質。產于松潘的有如懷中抱子，形圓光滑而潔淨，又名珍珠貝或簡稱珠貝，現多出口。

浙貝母：原產于浙江象山，故又名象貝母。呈扁圓球形或饅頭形，由兩片肥厚的鱗葉和其中包含的數個小鱗葉所組成。外層肥厚鱗葉的形狀如元寶，直徑8—9分至1寸多，外面呈粉白色或淡黃色，小鱗葉為灰白色，常有淡黃色斑痕，內面呈棕色，質脆，粉質。

【炮制】川貝母先用水浸後，再以粗糠拌和手揉，然後淘淨粗糠，放入盆中，上蓋濕布，待中心微軟，把鱗葉剝開去心，曬干用。浙貝母以水浸後，濾出，放入盆內，上蓋濕布，使中心微軟，切片、曬干用。

【性味和歸經】川貝味苦甘，性微寒無毒。浙貝味苦，性寒無毒。入心、肺二經。

【應用】本品能潤心肺，化燥痰，止熱咳。主治咳嗽、吼喘、肺癰、肺萎、衄血。若燒炭（存性）油調，可外敷惡瘡、瘍腫。凡脾胃虛寒以及有濕痰者，均須忌用。

【用量】馬和牛3錢至1兩；羊和豬1錢至2錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】貝母苦寒，止咳化痰，肺癰肺痿，潤肺除煩。

【配伍】配知母、瓜蒌仁、桔梗、款冬花、山豆根、枇杷葉等治干咳；配梔子、桔梗、牛蒡子、百部根、甘草、杏仁、紫苑（貝母散），治馬

肺热、喘粗及啞咳。

按：貝母及半夏，均为治咳祛痰之药，但貝母以潤肺清热之功为胜，痰去咳即止。汪昂說：“貝母寒潤，主肺家燥痰；半夏溫燥，主脾家濕痰。凡風寒濕熱諸痰，貝母非所宜也，宜用半夏。”汪机說：“貝母肺經药，半夏脾胃經药，切不可代。”因此，凡脾胃有湿而肺又有痰者，不妨二者同用。

貝母一般分浙貝、川貝两种，浙貝性味苦寒，对于外感風邪、痰熱郁肺、肺气失降者，用以泄肺降气；若陰虛火盛的虛勞咳嗽，浙貝应慎用。川貝性味苦寒而甘，滋潤功能胜于开泄，因此，大多用于虛勞之咳嗽；若脾胃衰弱，不可应用。

天門冬（本草經）

【別名】天冬、天棘。

【主要产地】四川、貴州、云南、广西、河南、江西、陝西、浙江等地。

【药用部分】本品系百合科多年生蔓性草本植物，入药用其塊根。呈长条圓柱形，两头稍細而短尖，长约2至5寸，中部直径約4分至6分，为半透明粉褐色，或有細条紋，質較軟，有粘性；断面呈淡黄色，其中心有坚硬的木部，甚細，显黄白色。

【炮制】采集后去細根，剝去外層皮，用热水泡1小时，取出，入稀矾水泡过或蒸过，晒干，切断用或剖开去心用。

【性味和归經】味甘苦，性大寒无毒。入肺、腎二經。

【应用】本品能滋陰潤肺，清热降火，止咳化痰，利水。主治肺虛咳嗽、气逆喘急、衄血、热病伤津、口渴、燥結等症。凡脾虛寒泄瀉者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 6 錢；羊和豬 2 錢至 6 錢；兔和雞 2 分至 6 分。

【附歌】天冬甘寒，潤肺滋陰，清熱定喘，止咳止渴。

【配伍】配生地黃、人參等，治虛勞咳嗽；配藕節、阿膠、當歸、麥門冬，治衄血；配麥門冬、黃芩、梔子、甜葶藶，治喘甚。

按：天門冬甘苦而寒，為潤肺滋陰常用之藥。

天門冬、麥門冬性相近似，主治亦大致相同。但天門冬入肺兼入腎，滋腎潤燥于下元，稍異于麥門冬，在應用時，二冬往往同用，以治肺癰衄血之症。例如楊時泰說：“二冬皆由胃而或入心或歸腎，以同奏功于肺。麥冬味甘平而氣微寒，天冬味甘苦，苦胜于甘而氣寒。二冬之味俱厚，一則清心而復脈滋陰，一則通腎而潤燥益精，以腎忌燥而喜潤，又精不足者補之以味，故天冬力勝也。”

麥門冬（本草經）

【別名】麥冬、寸冬、階前草。

【主要產地】浙江、四川、湖北、貴州、陝西、山東等地，以浙江杭州產者較好。

【藥用部分】本品系百合科多年生常綠草本，入藥用其塊根。呈不整紡錘形，長約 5—6 分至 1 寸余，直徑約 2 分左右，兩頭尖，中部略膨大，外表為淡黃褐色，有縱皺，質柔軟；橫斷面呈黃白色，中有細硬的木心一根，抽去木心後，形成細小孔洞。以長大肥壯而肉厚者為上品。

【炮制】將原藥用熱水浸泡約 1 小時後，濾出置盆內，以手揉搓，使其肉變軟和中心木質脫離，以便抽去木心，用小刀剔開用，或壓扁用。

【性味和归經】味甘微苦，性微寒无毒。入心、肺、胃三經。

【应用】本品能清心潤肺，养胃生津，化痰止咳，解渴去煩。主治肺中热痰、阴虛、燥咳、肺癰鼻膿、衄血、口渴、津枯、燥結、乳汁不下等症。凡有寒者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 6 錢；羊和猪 1 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】麦冬甘寒，清心潤肺，化痰止咳，去煩止渴。

【配伍】配阿胶、桑叶、石膏、杏仁、治肺燥咳嗽；配人参、五味子，治热伤元气、自汗喘咳。

【附方】治馬、牛发喘方(河南)。

麦門冬 天門冬 桔梗 玄参 貝母 杏仁 枇杷叶 菊花
白芍 葶藶子

以上共为末，蜂蜜为引，用温水調匀，灌服。

按：麦門冬治肺热，皆以潤肺生津为主。凡因胃火偏盛、阴液漸枯及热病伤津、病后虛弱、津液未恢复，或暑热燥津、短气倦怠、秋燥逼金、肺胃液耗等症，用麦門冬寒潤补阴生津，都能奏效。

第四节 清肺化痰止咳药

沙参(本草經)

【主要产地】北沙参产于山东、河北、辽宁等地，南沙参产于安徽、江苏、浙江、江西等地。

【药用部分】北沙参是繖形花科多年生草本植物北沙参(珊瑚菜)的干燥根。剥去栓皮后的干燥品，长达 7 寸至 1 尺，粗約 2 分左右，表面光滑而平坦，近蘆头处，微有皺紋，色白質堅；其折断面，有

淡黃白色的木心。

南沙參是桔梗科多年生草本植物，入藥用其干燥的根。呈長紡錘形或圓柱形，為淡黃白色，長達6—7寸至1尺，直徑4至5分，上端的蘆頭，粗糙不平，全体有疏密不均勻的輪狀環皺，其折斷面粗糙疏松，有多數不整齊的小孔，質輕松。

【炮制】北沙參剝皮晒干后，將原藥浸潤后切成片，生用或炒用。南沙參刮去皮后，切片，晒干，生用。

【性味和歸經】味甘苦，性微寒無毒。入肺經。

【應用】本品能養陰清肺，除濕熱，止咳，化痰。北沙參滋陰作用較強；南沙參祛痰作用較強。主治虛熱咳嗽、久咳肺萎、燥咳等症。凡肺寒咳嗽者忌用。反藜蘆。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬1至4錢；兔和雞3至6分。

【附歌】沙參苦寒，清肺除濕，止咳化痰，退熱滋陰。

【配伍】配金銀花、梔子、貝母、天花粉、馬兜鈴、黃芩等治肺壅、鼻膿等症。

【附方】治馬駝鼻膿症方（山西）。

沙參 廣陳皮 毛橘紅 清半夏 川貝母 枯礬 白芨 白芷 阿膠 防風 杏仁 甘草 薏苡仁 血余炭 黃蜡
煎服。

按：沙參味甘苦，凡肺有虛熱、咳嗽、衄血、久咳肺萎等症，用之甚佳，如熱症犯肺，氣逆多痰，用鮮者其力更大。元素說：“肺寒者用人參，肺熱者用沙參。”“本草經”載：“補中益肺氣，是其清補肺氣之功不弱可知。”但風寒之初，肺中尚未釀成痰時，應以解表為先，沙參不宜入藥。

枇杷叶 (别录)

【别名】盧橘叶、无憂扇。

【主要产地】全国各地均产。

【药用部分】本品是蔷薇科常綠乔木枇杷树的叶。干燥叶呈长椭圆形,其末端尖銳,邊緣有鋸齿,全体长约5寸至8—9寸,寬約1寸5分至2寸,表面呈綠褐色或深褐色,背面为灰褐色,密布土黃色細茸毛;叶柄粗而短,稍弯曲;叶厚,为革質,易破碎。

【炮制】摘下后,乘新鮮扎成把,晒干,刷去叶背面的茸毛,再以清水洗淨,橫切成1分左右寬的絲条状,生用或蜜炙用。

【性味和归經】味苦,性平无毒。入肺、胃二經。

【应用】本品能清肺化痰,开脾胃,解暑气,止渴。主治咳嗽气喘、热咳痰盛、胃热口渴、肺风疮等症。

【用量】馬和牛5錢至1两;羊和猪1錢至3錢;兔和鷄3分至6分。

【附歌】枇杷叶平,清肺化痰,解暑止渴,开胃下气。

【配伍】配知母、地黄、馬兜鈴、貝母、款冬花、瓜蒌根、紫苑、杏仁等,治肺血气壅閉、气滯、毛焦前探。

【附方】(1)枇杷散(元亨疗馬集):治馬肝伤咳嗽,左肋疼痛,回头左顧。

枇杷叶 知母 干地黄 馬兜鈴 貝母 款冬花 瓜蒌根
紫苑 干山藥 紫苏子 秦艽 当归 紅花子 自然銅 天
門冬 芍藥 沒藥 瞿麦 木通 麦門冬 阿膠炙焦 甘草
黃連 蚯蚓

上药为末,童便为引,草飽灌之。

昆布（別錄）

【別名】綸布。

【主要產地】本品產於沿海各地，在浙江、山東、福建、廣東等沿海地區產量較多。

【藥用部分】本品系昆布科，其全草供藥用。乾燥全草呈皺縮的條片狀，基端有柄，呈黑褐色，質薄而脆，有海草的特殊腥氣。

【炮制】清水浸洗，漂去鹽味，切斷後曬干，或焙干用。

【性味和歸經】味咸，性寒無毒。入肝、胃、腎三經。

【應用】本品能消痰行水，除熱軟堅，破積聚。主治癰瘡、壅腫、頰下癰腫、水腫等。對於脾胃虛寒有濕者忌用。

【用量】馬和牛 3 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢。

【附歌】昆布咸寒，消痰行水，破堅散腫，功同海藻。

【配伍】配海藻、茯苓、連翹等，能散聚積，消癰腫。

【附方】昆布解毒湯（山西）：治馬槽結癰癥。

昆布 海藻 連翹 桔梗 金銀花 蒲公英 郁金 牛蒡子
酒知母 酒黃柏 木香 浙貝母 酒大黃 朴硝 荊芥 防
風 甘草

研末，麻油為引，灌之。

海藻（本草經）

【主要產地】同昆布。

【藥用部分】本品是海藻類海藻的全草。乾燥全草呈綫形，卷曲多分枝，直徑約半分，長達 3 尺以上，外表呈黑色，有海草的特殊腥氣。

【炮制】以清水浸，去咸味，晒干或焙干用。

【性味和归经】味苦咸，性寒无毒。入肝、胃、肾三经。

【应用】本品能消痰行水，散肿软坚，泄湿热，破积聚。主治同于昆布。反甘草。

【用量】马和牛5钱至1两；羊和猪1钱至3钱。

【附歌】海藻咸寒，消痰行水，散肿软坚，功效亦显。

【配伍】配昆布、茯苓、连翘等，用于化痰消肿、解毒。

【附方】三海散(四川)：治牛前胸瘰癧肿胀。

海藻 昆布 海带 全蝎 穿山甲 荆山稜 莪朮 青黛
荆芥 土茯苓 夏枯草

共研细末，开水冲温服。

按：昆布及海藻，均是海内所产，二者性味皆为咸寒，故功用相同。咸能软坚润下，寒能清血热，因而用以破散结肿、消水肿、祛痰，尤其对于瘰癧结肿疼痛，功效较好。东垣说：“咸能软坚，故瘰癧坚如石者，非此不除。”

硼砂 (大明)

【别名】蓬砂、盆砂、月石。

【主要产地】四川、西藏、青海、印度等地。

【原药形态】本品是硼矿中无色透明或半透明稜柱状小晶块。

以色白者为佳。黄色者不作药用。

【炮制】生用或煨过研末用。

【性味和归经】味甘咸，性凉无毒。入肺、胃二经。

【应用】本品能消痰止咳，制腐解毒。主治咽喉肿痛、舌疮目疾等症。外用治恶疮、目障等。

【用量】馬和牛 3 錢至 1 兩。

【附歌】礪砂咸涼，排膿消痰，目翳喉腫，清熱生用。

【配伍】配硃砂、冰片、明礪等，可治膿瘡；配黃丹、豬油等，治馬瘡跡。

【附方】(1)礪砂散(元亨疔馬集)：治馬瘡跡。

礪砂 黃丹

上二藥同研為細末，羊骨髓調勻搽之。

(2)礪砂散(著牧纂驗方)：治馬肺風發毒瘡。

礪砂 胆礪 砒霜 銅綠

上藥為末，用鹽漿水洗淨瘡後貼之，四日再一換。

(3)南礪砂散(牛經)：治牛患肝礪黃病。

南礪砂 薄荷 川芎 桔梗 白礪 黃柏 甘草 青黛 黃連 人參

上為末，蜜、酒、水同調，灌之立效。

(4)上清散(四川)：治咽喉腫痛，口舌生瘡，啞咳肺氣，前胸腫脹疼痛。

礪砂 冰片 桔梗 訶子 硃砂 元明粉 薄荷 百藥煎 甘草 共為細末，溫開水沖服。

表 29 化痰止咳平喘藥歸納簡表

類別	藥名	性味及歸經	功 用	用 量 (錢)				
				馬 牛	羊 猪	兔 雞		
止 咳 平 喘 藥	桔 梗	苦辛溫，入肺經	化痰止咳，宣氣散寒	5-13	1-2	0.3-0.5		
	款冬花	辛甘溫，入肺經	止喘下氣，潤肺止咳	5-15	1-3	0.2-0.5		
	前 胡	苦辛寒，入肺、脾	清肺止咳，宣散風熱	5-13	2-4	0.3-1		
	百 部	苦甘溫，入肺經	溫肺止咳，消痰殺蟲	5-10	1-3	—		

(續)

类别	药名	性味及归经	功 用	用 量 (錢)			
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄	
止咳平喘药	馬兜鈴	苦辛寒,入肺、大腸	化痰定喘, 清热降气	5-10	1-4	—	
	白 前	辛、微寒,入肺經	祛痰止咳, 泻肺降气	6-12	1-4	0.4-0.8	
	白 果	甘苦溫平,入肺經	欬肺定喘, 杀虫治疥	8-20	2-4	—	
	曼陀罗	辛溫,入肺經	止喘祛风, 有毒慎用	2-5	0.3-0.5	—	
	旋复花	咸溫,入肺、大腸	消痰健脾, 降气行水	5-15	2-4	—	
化痰降气药	半 夏	辛溫,入脾、胃	燥湿化痰, 降逆止嘔	5-10	1-3	—	
	天南星	苦辛溫,入肺、肝、脾	化痰除风, 消肿解毒	5-10	1-3	—	
	白芥子	辛溫,入肺經	化痰下气, 消肿止痛	5-15	1-3	0.5-0.8	
	苏 子	辛溫,入肺經	散寒降气, 止咳定喘	6-8	2-5	—	
	萊菔子	辛甘平,入脾、肺經	降气化痰, 消食解毒	8-20	2-4	0.5-1	
	紫 苑	苦甘溫,入肺經	化痰止咳, 泻肺降气	5-13	1-3	0.2-0.4	
潤肺化痰止咳药	桑白皮	甘寒,入肺經	泻肺行水, 消痰止渴	5-20	2-4	0.5-0.6	
	瓜 蒌	甘寒,入肺、胃、大腸	清热化痰, 潤肺止咳	4-10	2-4	0.2-0.5	
	天花粉	甘酸寒,入肺、胃、大腸	潤肺益气, 止喘降火	5-10	1-4	0.3-0.6	
	杏 仁	苦溫,入肺、大腸	潤肺止咳, 定喘潤燥	5-10	1-4	—	
	貝 母	苦甘微寒,入心、肺	祛痰清热, 潤肺止咳	3-10	1-2	0.2-0.5	
	天門冬	甘苦大寒,入肺、腎	潤肺滋陰, 清熱止咳	5-16	2-6	0.2-0.6	
清肺化痰止咳药	麥門冬	甘苦微寒,入心肺、胃	潤肺清心, 化痰止咳	5-16	1-4	0.2-0.5	
	沙 参	甘苦微寒,入肺經	清肺養陰, 化痰止咳	5-15	1-4	0.3-0.6	
	枇杷叶	苦平,入肺、胃	清肺化痰, 解鬱止渴	5-10	1-3	0.3-0.6	
	昆 布	咸寒,入肝、胃、腎	消痰行水, 破堅散腫	3-10	1-3	—	
	海 藻	苦咸寒,入肝、胃、腎	消痰行水, 破堅散腫	5-10	1-3	—	
	礞 砂	甘咸涼,入肺、胃	消痰止咳, 散鬱消腫	3-10	—	—	

第六章

理气药与消食药

理气药就是調理气分、疏暢气机的药物。气分大致可分为气虚和气滞两大类：气虚宜补气，詳見补养药項下。气滞宜理气。本章所謂理气药，是指治疗气滞的一类药物。

家畜由于气候急变，飼养管理不良（如喂飼不节、劳役过度等），或因其他病变的緣故而引起痰壅、湿邪、瘀血等，都可阻滯气机的通暢，因而引起肚脹疼痛、反胃吐食、气虚等症。本章药物，大都有順气寬中、行气止痛等功效，故能治疗上述各症。但对于气虚、阴虛的病畜，应该配合补气药或补养药来应用。

消食药主要是加强消化机能、帮助料草消化的药物。它也有寬中除脹的功效。因此，消食药能治疗食积、胸膈脹滿、反胃吐食、食欲不旺等症。但常与理气药、健脾药或祛寒药等配合应用。

在治病时这两类药常相配伍，它們的功能主治，相互联系亦多，所以合在一章內叙述。

第一节 理气药

枳壳和枳实（本草經）

【主要产地】四川、江西、福建、浙江、江苏、广西等地。

【药用部分】本品是芸香科枳树的果实。成熟果实制成的称枳壳，未成熟果实制成的称枳实。

枳壳：本品一般是对半剖开，成半球形，直径1寸至1寸5分，外表面隆起如球，呈橙褐色或橙黄色间绿褐色，有颗粒状突起，果皮较薄，质坚韧，中央有9至12瓣，呈放射状排列，室内有疏松的褐色纤维状物。有特异的清香。

枳实：较枳壳的直径稍小，约5分至1寸，外表面呈褐色，果皮和果肉很厚，约占全体一半以上，中心微凹，呈多瓣梅花形，以肉厚而色青黑者较佳。



图 42 枳 实

左、枳实原植物； 右下角、药用部外形(对半剖开)。

【炮制】将原药洗净，闷一夜再用火烘，使之变软，压扁切片，晒干，生用、炒用或麸炒用。

【性味和归经】枳壳味酸苦，性微寒无毒；枳实味苦酸，性微寒无毒。入脾、胃二经。

【应用】本品有健脾、破气、行痰、消积、利胸膈、宽肠胃的功用。主治食积停滞、痰痞壅积、胸腹胀满、肠风下痢、小便不利、大便秘结等症。枳壳的功用比较缓和，主作理气、宽肠胃、散结、去积(去瓢用)之用。但多用能损胸中之气，应予注意。在中兽医古方中，以用枳壳为多。

【用量】枳壳：马和牛5钱至1两5钱；羊和猪2钱至3钱；兔

和鷄 5 分至 1 錢，

枳实：馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和鷄 3 分至 8 分。

【附歌】枳壳酸苦，下气寬中，食积痰滯，壳緩实速。

【配伍】配官桂、当归、干姜炮、赤石脂（枳壳散），治馬非时御蕩、因伤水太过、草慢病；配大黄、火麻仁、牙皂、黄連、厚朴（河南），治小駒糞結。

【附方】枳实散（四川）：治牛胸腹脹滿、食不消化。

枳实 大黄 黄芩 黄連 白朮 神麴 茯苓 澤泻 木香
槟榔

共研末，生姜为引，灌服。

按：枳实与枳壳本是一物，只是采取老嫩果实的不同。在性味、功用则基本相同。不过枳实性速而枳壳性緩，效能則相差不远。李时珍說：“枳实与枳壳，其功皆能利气，气下則痰喘止，气行則痞脹消，气通則痛刺止，气快則后重除，故以枳实利胸膈，枳壳利腸胃。”

厚朴（本草經）

【主要产地】四川、湖北、云南、貴州、湖南、陝西、福建、浙江、安徽等地。

【药用部分】本品系木兰科落叶乔木，入药用其树皮和根皮。商品呈卷筒状或半管状，亦有压平呈板状的。长约 1 至 2 尺，厚約 1 至 3 分，外表呈灰褐色或暗褐色，粗糙，有不規則的縱皺，內面为紫褐色，平坦，質硬而脆，有特异芳香。产于四川者称川厚朴，外皮呈灰黄色，比較粗糙，油性很大，嚼之渣少，品質佳良。产于浙江、福建者称温厚朴，多自两边卷成双筒状，外皮呈灰白色，油性較少，

气味較淡，嚼之有細渣，品質較次。

【炮制】先刮去粗皮，洗淨，用生姜、苏叶二药加入同煎，煎透后去生姜和苏叶，切片，阴干用。

【性味和归經】味苦辛，性温无毒。入脾、胃、大腸三經。

【应用】本品有温中燥湿、健脾散满、破积、下气消痰的功用。主治消化不良、胸腹脹满、反胃、下痢、冷痛、腹痛、气脹、喘咳、瘀血停宿等症。对于馬腹脹而虛弱时不可多服。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 6 錢；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和雞 5 分至 8 分。

【附歌】厚朴辛温，健脾温中，气脹冷痛，下气散满。

【配伍】配陈皮、麦芽、五味子、官桂、砂仁、牵牛子、青皮(厚朴散)，治馬脾不磨草，口色黄白。

按：厚朴为兽医常用的药物，功能温中、燥湿、散满、消脹。对于寒湿实邪的病畜用之最宜。“別录”說：“厚朴温中益气，消痰下气。”因此，与枳实、大黃同用，則泻实满，謂之消痰下气；与陈皮、蒼朮同用，則除湿满，謂之温中益气；与泻下药同用，則厚腸胃。丹溪說：“此(即厚朴)能泻胃中之实，然滯行則宜去之。”

砂仁 (开宝)

【別名】縮砂蜜、阳春砂仁、白砂仁。

【主要产地】广东、广西等地。

【药用部分】本品系姜科多年生草本植物，入药用其果实內的种子。干燥果实呈卵形，从上端看略呈三角形，长约 6 至 8 分，粗約 3 至 4 分，外表呈土褐色，有网状突起的紋理和短鈍刺，果皮薄而脆。种子多枚聚集成塊状，以中隔隔成三室。每粒种子呈多角

形，色褐，質堅硬。種仁為黃白色，有特殊的芳香，種子碎裂後，芳香氣味更濃。產於廣東陽春縣者稱為陽春砂仁，種粒長圓，兩頭微尖，粒飽滿，外表呈黃赤色，內面為紫色，品質最好。進口貨稱西砂仁，都是去殼的種子，呈灰白色，品質較差。

【炮制】收采後用火焙到五、六成干時，再放到太陽下晒干，去殼取仁，打碎應用。

【性味和歸經】味辛，性溫無毒。入脾、胃、腎三經。

【應用】本品能行氣和中，養胃醒脾，止痛安胎。“元亨疔馬集”把它列入溫脾和中藥。主治食積停滯、腹痛脹滿、嘔吐、腸鳴泄瀉、孕畜胎動不安。對於馬心熱時忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 2 錢；兔和雞 2 分至 6 分。

【附歌】砂仁性溫，和胃調中，冷氣肚痛，安胎止痛。

【配伍】配當歸、白朮、甘草、木香、厚朴、青皮、陳皮、五味子、檳榔、豆蔻、細辛、香附、麥芽（溫脾散），治馬翻胃；配龍骨、訶子（豬經大全），治豬脫肛。

按：砂仁氣味芳香而性速行，但殼的效力較弱。對於孕畜胎動不安，熱者配黃芩，寒者配白朮；若胃冷氣滯而引起胎動不安，可以炒砂仁為末，和溫酒服，胎動遂安。因本品芳香入脾，辛能燥濕，故為開脾胃之要藥，和中氣之正品；若兼腎虛氣不歸元，以砂仁為使，比用肉桂、附子更佳。

青皮（本草經）

【主要產地】廣東、四川、福建、浙江等地。

【藥用部分】本品是芸香科常綠小喬木，入藥用其未成熟的果

实或果皮。干燥果实，类球形，大小不一，直径3至6分，外表面呈灰黑色或绿褐色，粗糙不平，有疣状突起，底端微尖，质坚硬，外皮厚，断面呈角状，微芳香。以小而坚实者为佳。

【炮制】将未熟坠落或淘汰的果实湿润，切片晒干，生用或酒炒、麸炒用。

【性味和归经】味苦辛，性温无毒。入肝、胆二经。

【应用】本品能破气疏肝，消积化滞，消肿止痛。主治胸膈痛、过食伤脾、气逆胀满、食积、瘀血、乳痛结肿等症。对于气虚体弱而多汗者忌用。

【用量】马和牛5钱至1两；羊和猪2钱至4钱；兔和鸡5分至1钱。

【附歌】青皮苦温，破气疏肝，消积化滞，气逆胀满。

【配伍】配陈皮、苦楝子、茴香、益智、芍药、木通、滑石、官桂、红豆、乳香、没药、当归、自然铜（七补散，安骥药方），治马七伤。

陈皮（本草经）

【别名】橘皮。

【主要产地】广东、四川、浙江、江西、福建等地。

【药用部分】本品是芸香科常绿小乔木，入药用其成熟的果皮。其外表面呈橙黄褐色，往往破成数裂，内面的白皮层有絮状物，质柔软，气味芳香。以质厚色浓者为佳。陈久者称陈皮。

【炮制】洗净晒干，剪碎，生用或炒用。

【性味和归经】味辛苦，性温无毒。入脾、胃、肺三经。

【应用】本品有理气健脾、发散清热、燥湿化痰等功效。主治食欲不振、胸腹胀满、毛孔闭塞、呕吐、腹泻、膀胱停水、阴囊肿胀、乳

腫、痰滯等症。對於馬、黃牛及羊白汗、盜汗、肺虛者不可多用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和雞 5 分至 1 錢。

【附歌】陳皮性溫，理氣燥濕，升降補瀉，隨從之藥。

【配伍】配青皮、檳榔、厚朴、桂心、細辛、當歸、茴香、白芷、木通、砂仁、甘草（順氣散），治馬姜芽腹痛起臥；配青皮、厚朴、桂心、細辛、茴香、當歸、白芷、檳榔（橘皮散），治馬傷水、腹痛起臥。配生薑（豬經大全），治豬嘔吐。

按：青皮、陳皮雖是一物，但由於老嫩的不同，其氣味功用，都因之而差異。青皮破氣性烈，陳皮行氣性鈍。子和說：“陳皮升浮，入脾肺，治高而主通，青皮沉降，入肝胆，治低而主瀉。”

陳皮和百藥，用於行氣，氣行則引導各藥而有補、瀉、升、降之力，若有痰者因氣行而化，有濕者因氣行而消，即是食積及料草之毒，都可隨氣行而解。時珍說：“同補藥則補，同瀉藥則瀉，同升藥則升，同降藥則降；各因所配而補瀉升降。”由此可知其應用範圍很廣。

木香（本草經）

【別名】蜜香、廣木香、云木香、川木香。

【主要產地】雲南、四川、廣東、西藏等地。

【藥用部分】本品是菊科多年生草本，入藥用其根。由於產地不同，而有種種名稱。

廣木香：主產敘利亞，因由廣州進口，故稱廣木香。呈不正圓柱形，或板片狀，長 2 寸至 3 寸，扭曲不直，粗約 6 分至 1 寸，外皮呈紫褐色，有斷續的縱紋和溝回，質堅硬，常帶空洞，油性大，香氣

濃厚，品質佳良。

云木香：产于云南，呈圓柱形或板片形，表面显灰褐色，質略松，中心部很少有空洞，油性亦大，香气較广木香为淡。

川木香：产于四川，較广木香細而长，皮呈灰黑色，質松而軟，其橫切面有黃色菊花心紋，内部显灰白色，油性很少，香气淡薄，品質較差。

【炮制】将原药水浸2小时，滤出，上复湿布，待中心部軟化后，切片，晒干，生用或面裹包煨用。

【性味和归經】味辛苦，性微温无毒。入肺、肝、脾三經。

【应用】本品能疏肝調气，止痛安胎，健脾和胃。主治腹脹、腹痛、胃寒不食、泄痢、胃内停滯、嘔吐、膀胱冷痛、气逆胎动等症。

【用量】馬和牛3錢至6錢；羊和猪1錢至2錢；兔和鷄2分至4分。

【附歌】木香性温，行气定痛，消积止痢，肺气可通。

【配伍】配莪朮、肉桂、厚朴、薏苡、白芍药、黄柏、陈皮、白朮、甘草（安胃散，师皇安驥集），治馬虫蝕、腹痛；配枳壳、青皮、紫苏子、当归，治气滯；配香附子、砂仁、黄芩等，可安胎。

按：木香調气定痛，功效甚佳，在治疗腹内冷痛、食伤、气逆疼痛、諸虫痛时，若能辨証施治，配合他药佐使应用，效果更为显著。宗奭說：“此专泄决胸腹間滯塞冷气，其他則次之，得橘皮、薏仁、生姜相佐使，效尤速。”

香木香（开宝）

【别名】土木香、土青木香。

【主要产地】山西、山东、江西、湖南、湖北等地。

【藥用部分】本品是馬兜鈴科多年生蔓生植物，入藥用其根。干燥后呈圓柱形，稍有屈曲，長約2寸至5寸，粗約3分至5分，外表土灰色至深褐色，質堅實而重；橫斷面污黃色或灰白色，粉質；外層與中柱界限明顯，從中心有少數土黃色條紋散出。有特异的芳香。

【炮制】掘取后，剪去根須，洗淨，切片晒干。

【性味和歸經】味辛苦，性寒無毒。入肝、胃二經。

【應用】本品有利氣止痛、溫內、寬胸、緩大小腸、消腫解毒等功效。主治胸腹作痛、瘡疽癰毒、惡腫、蛇咬傷等症。用于治惡腫、蛇毒時，水磨敷在患部。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪2錢至4錢；兔和雞3分至6分。

【附歌】青木香寒，寬胸緩腸，理氣止痛，瘡疽癰毒。

【配伍】配香附、檳榔、青皮、陳皮、枳殼、砂仁、厚朴、蒼朮、甘草炙、生薑（木香順氣散），治氣滯腹痛。



圖 43 青木香

左、青木香原植物（馬兜鈴）；右、藥用部分外形及橫切面：1. 外層，2. 中柱，3. 條紋。

沉香（别录）

【别名】沉水香、蜜香。

【主要产地】广东海南岛、广西等地。

【药用部分】本品是瑞香科常绿乔木，入药用其有树脂沉着的木心。商品呈不整齐的长条块片，长约1寸至2寸，宽约7分至8分，外表呈深褐色或黑褐色，细緻油润，有细纵纹理，两端往往参差不齐，质坚而重，有特异的清香。

【炮制】将沉香木蒸热，当木质软化时，刨片，入煎，或剉末用。

【性味和归经】味辛苦，性微温无毒。入脾、胃、肾三经。

【应用】本品有降气纳肾、壮阳益精、补五脏、暖腰肾等功效。主治心腹疼痛、胃寒泄泻、呕吐、腰肾虚冷、气逆喘息等症。对于气虚下陷者忌用。

【用量】马和牛2钱至5钱；羊和猪5分至1钱5分；兔和鸡1分至3分。

—【附歌】沉香辛温，降气纳肾，下元虚冷，理气益精。

【配伍】配香附、砂仁、甘草等，治气滞；配苏子、半夏、厚朴，当归、陈皮、甘草、前胡（苏子降气散），治痰滞气喘。

白豆蔻（开宝）

【别名】白蔻仁、白叩、叩仁。

【主要产地】我国广东、广西等省出产。

【药用部分】本品是姜科常绿草本植物，入药用其种子。果实呈类球形或扁球形，直径约3分至4分，果皮呈黄白色，表面光滑，有三条显著的深沟和多数浅沟纹。果壳质脆而常裂开，露出集成

塊狀的褐色種子，內有三室，每室有種子9至12粒。種子呈多角形，為灰白色，種仁白色，氣芳香。

【炮制】剝去外殼，打碎用。

【性味和歸經】味辛，性溫無毒。入肺、脾、胃、三經。

【應用】本品能行氣寬中，醒脾溫胃，消食，化寒痰，止吐逆。主治脾寒食滯、腹脹、冷痛、嘔吐、冷氣上逆、下痢等症，但忌用于熱症。



图 44 白豆蔻

左、白豆蔻原植物；右、药用部分外形：

1. 果实，2. 种子。

【用量】馬和牛5錢至1兩；羊和猪1錢至2錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】白蔻辛溫，行氣溫胃，食滯腹脹，嘔吐下痢。

【配伍】配當歸、白朮、陳皮、青皮、厚朴、砂仁等，治瀉痢，消腹脹；配厚朴、木香、枳實，治腹脹疼痛。

按：白豆蔻為胃寒、脾冷、反胃常用之藥，亦可用以開肺氣，因肺為諸氣的門戶，肺氣開而諸氣之郁亦開。蘇恭說：“白豆蔻之用有五，入肺經本藥一也，散胸中滯氣二也，去感寒腹痛三也，溫暖脾胃四也，治赤眼暴發，去太陽經目內大眚紅筋，可用少許五也。”

薤白 (別录)

【别名】藟子、菝子。

【主要产地】我国各地都有出产,其中以江苏、浙江、江西等省产量较多。

【药用部分】本品是百合科多年生草本植物,入药用其鳞茎。呈卵圆形,直径约2分至3分,外表呈白色或黄褐色,多数呈半透明,外层包被的薄膜鳞叶,与内部鳞茎相粘合,不易剥离,有强烈的蒜臭。以皮薄肉质丰满者为良品。

【炮制】去苗,洗净,晒干,生用或酒炒用。

【性味和归经】味辛苦,性温无毒。入肺、大腸二经。

【应用】本品能温中通阳,下气散结。主治食积气滞、臌胀、泄痢后重、水气肿胀等症;外用敷金疮创伤(生用)。

【用量】馬和牛2两至3两(据民间兽医经验,牛可用生薤白半斤至1斤,治急性臌胀,功效良好);羊和猪3钱至5钱;兔和鸡5分至1钱5分。

【附歌】薤白辛温,下气温中,食积气胀,用之有功。

【配伍】配半夏、党参、天花粉、麦冬、甘草,治胸中烦热逆气;配木香、藿香、知母、贝母、厚朴、陈皮、枳实、杏仁、百部、茯苓、車前子(薤白散),治牛肺胀咳嗽、气滞等症。

烏药 (开宝)

【别名】矮脚樟、旁其、台烏、天台烏。

【主要产地】浙江、安徽、湖南、湖北、江西、江苏、福建等地。

【药用部分】烏药有天台烏药和衡州烏药两种:

天台烏藥：是樟科常綠灌木，入藥用其根。主产于浙江天台，故名天台烏藥。根略帶連珠狀的紡錘形，稍彎曲，兩端較尖，中間的段落膨大；長約3—4寸至5—6寸，膨大部粗約3分至7分，外栓皮赤褐色或土褐色，質堅不易斷；橫斷面黃白色或淡褐色。新根較好。

衡州烏藥：是防己科常綠灌木，入藥用其根。主产于湖南衡州，故名衡州烏藥。根呈圓柱形，外表為黑褐色；橫斷面呈纖維性，質堅硬。

【炮制】水浸一日，濾出，用濕布蓋悶，至中心部潤透，切片晒干用，或磨汁沖服。在出產地則乘新鮮切片。

【性味和歸經】味辛，性溫無毒。入脾、胃、肺、腎四經。

【應用】本品能順氣寬中，消食止痛。主治腹痛、氣壅腫痛、宿食不消、反胃吐食、膀胱冷氣、小便頻數、冷痛等症。“本草綱目”說：“貓有病，以烏藥水灌之，甚良。”但因其辛溫發散，不宜久用，恐損元氣；氣虛時忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬2錢至4錢；兔和雞5分至1錢。

【附歌】烏藥辛溫，順氣寬胸，冷傷腹痛，氣滯不通。

【配伍】配芍藥、當歸、玄參、貝母、茵陳、馬兜鈴、升麻、白芷、山藥、秦艽、杏仁（烏藥散，安驢藥方），治腰膀痛、把前把后、草慢病等；配桑白皮、牡丹皮、小茴香、赤芍藥、秦艽、藁本（烏藥散，安驢藥方），治馬走驟胸痛、鼻濕、前探、五七聲吼、全不食水草。

按：烏藥、木香、香附子，皆為理氣寬中、治胸腹諸痛的要藥，但各有所長。木香入脾胃，能治食積停滯、反胃嘔吐、瀉痢等症；烏藥能順氣，并下通腎與膀胱，溫腎散寒，治膀胱冷氣；香附入肝經，由

于肝藏血，所以对血郁气滞疼痛的功效較速。

大腹皮（开宝）

【别名】腹毛、腹皮。

【主要产地】海南島、台湾、南洋群島、菲律宾等地。

【药用部分】本品是棕櫚科常綠乔木，入药用其果皮。全形如黄麻纖維样，平行排列，长约寸半至2寸，呈淡黄褐色，質軟而韌，略带板櫚气味。

【炮制】将原药用水浸洗，除去泥沙和硬壳，晒干，扎成2錢或3錢大小的小捆备用。

【性味和归經】味辛，性微温无毒。入脾、胃二經。

【应用】本品能下气寬中、消肿行水、开胃和中、順气止痛；主治胸腹脹滿、湿热郁結、水肿、小便不利、四肢骨节腫脹、泄瀉等症。

【用量】馬和牛6錢至1两5錢；羊和猪2錢至4錢；兔和雞4分至1錢。

【附歌】大腹皮温，开胃和中，消肿行水，順气止痛。

【配伍】配人参、川芎、白芎、熟地、陈皮、甘草、桔梗、半夏、紫苏（腹皮散），治孕馬腹痛不宁。

按：大腹皮功能不仅理气，而且利水甚佳；理气能寬中除脹；利水能疏利小便，消水肿、止泄瀉。因其功能迅速，易泄損真氣，所以对于气虛患畜，必須慎重使用。

香附（別录）

【别名】香附子、香附米、莎草根。

【主要产地】本品产于田园路边，到处都有。主要出产于浙江、

陝西、安徽、山東、江蘇、河南等地，以陝西產者最佳。

【藥用部分】本品是莎草科多年生草本植物，入藥用其根莖。干燥品呈橢圓形或梭形，長約5分至8分，中部粗約2分至3分，外表深褐色，全體有幾個輪節，質堅硬，不易折斷；橫斷面平坦，中心為褐色，味微苦。以赤褐色個大的為良品，瘦小色淡的為次品。




圖45 香 附

左、香附原植物；右、藥用部分外形：1. 輪節。

【炮制】采挖後，除去上苗，放入鍋內或鐵絲篩內，燒去須根，揀出曬干，生用，炒用，蜜炙，糖制，或炒炭用。另有用酒、鹽、醋、童便制炒的，名叫四制香附。

【性味和歸經】味辛甘微苦，性平無毒。入肝、三焦二經。

【應用】本品能理氣解郁、消積化痰、活血止痛 主治氣郁結

滯、痰壅气逆、肾气胞冷、胸腹脹痛、食积、产后腹痛等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】香附甘平，入血行气，表里三焦，一切滯气。

【配伍】配陈皮、荆芥、羌活、葛根、白朮、升麻、甘草，治风寒；配当归、白芍、生地黄、川芎等，治牛产后腹痛；配甘草、山楂、砂仁、木香、厚朴、陈皮（消积平胃散），治馬伤料不食草；配盐杜仲、盐續断、补骨脂、骨碎补、川牛膝、茯苓（香附肾气湯，四川），治肾气胞冷。

按：香附制用或配伍后，其性味功能有所不同。时珍說：“生用則上行胸膈，外达皮肤；熟用下走肝腎，外徹腰足；炒黑止血；童便浸炒，入血分而补虛；盐水浸炒，入血分而潤燥；青盐炒，补肾气；酒浸炒，行經絡；醋浸炒，消积聚；姜汁炒，化痰飲，得参、朮补气，得归、芍补血，得木香疏滯和中，得檀香理气醒脾，得沉香升降諸气，得川芎、蒼朮总解諸郁，得黃連、梔子降火热，得茯神則交济心腎，得茴香、补骨脂則引气归元，得厚朴、半夏决壅消脹，得葱白、紫苏解散邪气，得山稜、蓬莖消磨积塊，得艾叶治血气，煖子宮。乃气病之总司。”

第二节 消食药

山楂（唐本草）

【别名】棠球子、山里果、查肉。

【主要产地】江苏、安徽、浙江、山东、河南、河北、江西、湖北、湖南等地。

【药用部分】本品是蔷薇科落叶灌木，入药用其果实。干果呈

球形，直徑約2至3分，外表呈紅褐色，果皮皺縮，頂端有圓形凹窩，基部有果柄或果柄脫落的痕跡，破裂部分露出黃褐色種子數粒，質堅硬。

【炮制】將果實蒸晒後，用石塊壓成餅狀，或切片，晒干，生用或炒炭用。

【性味和歸經】味甘酸而帶瀉，性溫無毒，入脾、胃、肝三經。

【應用】本品能破氣消食、散瘀、化痰。主治食積、胸腹痞滿、滯血腫痛等症。

【用量】馬和牛6錢至1兩5錢；羊和豬3錢至5錢；兔和雞3分至8分。

【附歌】山楂酸溫，特化料食，消痞除氣，化痰開胃。

【配伍】配萊菔子、半夏、神麴、茯苓、麥芽、連翹、枳實、黃連、陳皮，治傷食積滯或消化不良；配木香、砂仁、厚朴，治食滯腹痛氣脹；配枳實、大黃，治傷食秘結。

按：中藥能消食積者頗多，山楂破氣消食，麥芽除谷料食積，谷芽以補為消，大黃蕩滌宿滯，檳榔除蟲食之積破堅力強，萊菔子除痰食之積破堅力緩，厚朴除冷滯之積較好，枳實除熱結之積為佳。此乃消積各藥不同之點。

麥芽（別錄）

【別名】大麥芽、麥蘖。

【主要產地】我國各地都有出產。

【藥用部分】本品是禾本科大麥的粒芽，乾燥後作為藥用，呈淡黃色或金黃色的顆粒，長約2—3分，兩頭尖，有明顯的縱脈，頂端露出初芽，長約4—5分，基部有多數乾燥的根，呈須狀。

【炮制】将麦子放入缸内，上盖湿稻草或蒲包，每天洒水二次，待发芽4—5分长时取出晒干。生用或炒用。

【性味和归经】味甘咸，性温无毒。入脾、胃二经。

【应用】本品能消食行气，健脾开胃，量大可回乳。主治食积腹胀、泻痢等症。孕畜和产奶期家畜忌用。

【用量】马和牛6钱至2两；羊和猪3钱至5钱；兔和鸡5分至2钱。

【附歌】麦芽甘温，特消食积，下胎回乳，胎产忌服。

【配伍】配知母、贝母、当归、芍药、天花粉、紫苏、白芷、枇杷叶、桑白皮、甘草、茯苓、马兜铃、桔梗、茵陈、黄药子、白药子、杏仁、山药、秦艽（麦藁散，安驥药方），治马把前把后、慢病、哮喘；配萝卜、枳壳、山楂、神麴、木香、厚朴、青皮、甘草（麦藁散），治马伤料。

【附方】治小猪泻痢方（四川）。

麦芽炒 葛根 苦参炒 山楂 赤芍药 陈皮 茶叶 马齿苋
共煎水内服。

谷芽（綱目）

【别名】稻藁。

【主要产地】我国各地都有出产。

【药用部分】本品是禾本科稻的谷芽，经干燥而成。

【炮制】生用或炒用。

【性味和归经】味甘咸，性温无毒。入脾、胃二经。

【应用】本品能健脾消食，开胃行气，功同麦芽。主治食积、食欲不良。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 兩；羊和猪 3 錢至 5 錢；兔和鷄 5 分至 2 錢。

【附歌】谷芽甘温，开胃和中，健脾消食，又补又消。

【配伍】配神麴、山楂、陈皮等，治食滯、胸悶脹痛。

神麴（药性論）

【别名】六神麴、建麴、陈麴。

【主要产地】本品是用青蒿、蒼耳、野蓼的自然汁，和杏仁泥、赤小豆末、面粉等药，經发酵制成。各地药店，都会自造。过去以福建产品为上，特称建麴。实际由上述六药制成的，都是正品，并以陈久的較好。

市售品切成小方块，外表为土黄色，粗糙不平。

【炮制】稍炒用（治食积、脹滿）或炒焦用（止泻痢）。

【性味和归經】味辛甘，性温无毒。入脾、胃二經。

【应用】本品能消食行气，健脾开胃，調中止泻。主治消化不良、胃滿、食积、痰逆、气逆等症。“賈相公牛經”上說：“牛生衣不下，取六月六麴末三合，酒一升，灌便下。”“重修政和証类本草”說：“麴味甘，大暖；疗脏腑中风……六畜食米脹欲死者，煮麴汁灌之，立消。”多用能下胎回乳，故泌乳母畜或孕畜禁忌应用。

【用量】馬和牛 8 錢至 2 兩；羊和猪 3 錢至 5 錢；兔和鷄 5 分至 2 錢。

【附歌】神麴甘温，消食止痢，下胎回乳，胎产禁忌。

【配伍】配麦芽、山楂、牵牛、木通、（神麴散），治馬伤料、腹痛起臥；配麦芽、山楂、甘草、厚朴、枳壳、陈皮、青皮、蒼朮（麴藥散），治馬伤料。

鷄內金（別录）

【別名】鷄肫皮。

【主要产地】我国各地都有出产。

【药用部分】本品是鷄肫內的黃皮。干燥后呈不規則長橢形，長約2寸左右，寬約1寸多。一側剖开，邊緣向內卷曲，質脆易碎，有皺紋，以色黃、皮厚、无雜質的為佳；皮綠而薄的次之。

【炮制】剝取鷄內金，洗去屎砂等雜質，晒干。生用或炒炙用。

【性味和归經】味甘，性平無毒。入脾、胃二經。

【应用】本品能消谷草，止瀉痢。主治食滯脹滿、脾胃虛弱、反胃、瀉痢等症。多用于猪羊。外用歛疮口。

【用量】馬和牛3錢至1兩；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄3分至6分。

【附歌】鷄內金甘，能理脾胃，消化草谷，除熱止痢。

【配伍】配枳實、神麴、白朮、山楂、麥芽等，治食積脹滿、瀉痢等症。

酒麴（嘉祐）

【別名】酒餅。

【主要产地】我国各处都有出产，惟各地产品不同。

【炮制】生用或干燥后用。

【性味和归經】味甘，性溫無毒。入脾、胃二經。

【应用】本品能消食行氣，健脾開胃，止痢。主治食積脹滿，功效與神麴相同。

【用量】馬和牛8錢至2兩；羊和猪3錢至6錢；兔和鷄5分

至1錢。

【附歌】酒麴甘溫，消谷開胃，破積調中，下氣止痢。

【配伍】配大黃酒制、朴硝、枳實、厚朴、麻仁、青木香、醋制香附、木通等(加味承氣湯，中兽医研究所)，治馬騾一般中結、板腸結和后結；配麥芽、山楂、枳實、大黃、朴硝、木通(江西)，治牛食脹。

表 30 理气药与消食药归纳簡表

类别	药名	性味及归經	功用	用 量(錢)			
				馬·牛	羊 猪	兔 鷄	
理气药	枳 壳	酸苦微寒，入脾、胃	利气寬腸，食积痰滯	5—15	2—3	0.5—1	
	枳 实	苦酸微寒，入脾、胃	性較快，多用于利腸胃	5—15	2—3	0.3—0.8	
	厚 朴	苦辛溫，入脾、胃、大腸	健脾溫中，下气散滿	5—16	2—3	0.5—0.8	
	砂 仁	辛溫，入脾、胃、腎	和胃調中，止痛安胎	4—10	1—2	0.2—0.6	
	青 皮	苦辛溫，入肝、胆	破气疏肝，化滯止痛	5—10	2—4	0.5—1	
	陈 皮	辛苦溫，入肺、脾、胃	理气健脾，燥湿化痰	5—10	2—4	0.5—1	
	木 香	辛苦微溫，入肺、肝、脾	行气定痛，消积止痛	3—6	1—2	0.2—0.4	
	青木香	辛苦寒，入肝、胃	理气寬胸，止痛消腫	5—15	2—4	0.3—0.6	
	沉 香	辛苦微溫，入脾、胃、腎	降气，治虛冷，益精	2—5	0.5—1.5	0.1—0.3	
	白豆蔻	辛大溫，入肺、脾、胃	煖胃去寒，食滯腹脹	5—10	1—2	0.2—0.5	
	薤 白	辛苦溫，入肺、大腸	下气溫中，食滯气脹	20—30	3—5	0.5—1.5	
	烏 药	辛溫，入脾、胃、肺、腎	順气寬胸，消食止痛	5—15	2—4	0.5—1	
	大腹皮	辛微溫，入脾、胃	寬中下气，行水消腫	6—15	2—4	0.4—1	
消食药	香 附	辛甘平，入肝、三焦	理气解郁，行气止痛	5—15	2—4	0.4—1	
	山 楂	甘酸溫，入脾、胃、肝	健脾消积，散瘀化痰	6—15	3—5	0.3—0.8	
	麥 芽	甘咸溫，入脾、胃	健脾消食，下胎四乳	6—20	3—5	0.5—2	
	谷 芽	甘咸溫，入脾、胃	開胃和中，健脾消食	6—20	3—5	0.5—2	
	神 麴	辛甘溫，入脾、胃	消食止痛，下胎四乳	8—20	3—5	0.5—2	
	鷄內金	甘平，入脾、胃	消食止痛，兼理脾胃	3—10	1—3	0.3—0.6	
	酒 麴	甘溫，入脾、胃	消食行气，調中止痢	8—20	3—6	0.5—1	

第七章

理血药

凡能治理血分疾病的药物，就称为理血药。

所谓血分的疾病，一般包括了血虚、血瘀、血溢三方面的病症，血虚者宜用补血药（详见补养药项下）；血瘀者宜用行血药；血溢者宜用止血药。

血瘀可由跌打损伤及产后等种种原因而引起，此时由于血液不能正常运行，从而疼痛随之发作，疮黄疔毒，无法解消。再说，血与气是相互依存的，血凝则气滞，气滞则血凝，气衰则血濡，血濡而侵于肉理，肉理淹留而肉腐，肉腐乃化为脓；气壮则使血离经络，溢于肤腠，肤腠郁结而血瘀，血瘀而化为黄水。这就是气血盛衰的区别。因此，行血药必兼有理气的功效。行血药如配理气药，就可增强行血的功效，因此，临症用药时，应加注意运用。此外，孕畜禁用行血破瘀药，以免发生流产。

溢血因部位和性质的不同，而有种种不同的名称，如衄血、便血、尿血等，一般应用止血药治之。但止血药的应用必须根据出血的原因和症状来进行施治，如有留瘀情况者，也应配合行血破瘀药，较为恰当。

茲分为行血藥和止血藥两方面来叙述。

第一节 行血藥

荆山稜（开宝）

【别名】京三稜、草三稜、三稜。

【主要产地】江苏、浙江、江西、河南、安徽、湖南、湖北等地。

【药用部分】本品是莎草科多年生草本植物，入药用其塊根，一般都削去外皮，經干燥后入药。全体呈圓錐形或长圓錐形，略側扁，上端膨大，下端漸尖，兩側形成較薄的稜，中部較厚，長約1寸至2寸余，其上端膨大部粗約5分至1寸，外面呈黃灰色或灰褐色，質地堅硬；斷面呈顆粒性，為灰白色。



图 46 荆山稜

左、荆山稜原植物；右、药用部分外形。

【炮制】原药以水浸泡，蒸透切片，晒干，酒炒、醋炒或麸皮炒成黄色用。

【性味和归经】味苦，性平无毒。入肝、脾二经。

【应用】本品能破血止痛，行气消积，去肝郁，行肝气，消扑损瘀血。主治腹痛气胀、草谷不消、产后恶血结聚、跌打瘀血结肿、疮肿坚硬等症。对于气虚无瘀者与孕畜忌用。

【用量】马和牛5钱至2两；羊和猪2钱至4钱；兔和鸡6分至1钱。

【附歌】山稜苦平，消积散结，攻坚破积，行气破血。

【配伍】配醋香附、酒莪朮、青木香、砂仁、莱菔子等，治草谷不消；配陈皮、厚朴、香附、山楂（湖北），治牛马胃肠硬结。

【附方】(1)治乳缺乏症方（陕西）；治乳汁不通或产后无奶。

荆山稜 王不留行 天花粉 通草 香附子

以上共为末，水冲灌服。

(2)治全身生水泡症方（实验国药新手册）。

荆山稜 莪朮

上共为末，酒调，连服三剂。

莪朮（开宝）

【别名】蓬莪朮、文朮、蓬蓬。

【主要产地】广东、广西、浙江等地。

【药用部分】本品是姜科多年生草本植物，入药用其干燥的块根。略呈纺锤形或卵圆形，微扁，长约8分至1寸余，粗约4至9分，外表呈灰褐色，光滑或有不整齐的纵横皱纹，随处散布圆形根痕，质坚硬，横断面呈灰褐色或暗褐色，并散布有土黄色斑点，气味

芳香。

【炮制】以清水浸潤，使內部潤透后，取出蒸熱，切片，晒干用。

【性味和歸經】味苦辛，性溫無毒。入肝經。

【應用】本品能行氣破血，消積化滯。主治腹痛氣脹、瘀血結腫、食積不化、扑損腫痛、下血等症。凡氣血兩虛，脾胃虛弱而無積滯者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩。羊和豬 2 錢至 4 錢。

【附歌】莪朮苦溫，破積消聚，行血止痛，脾胃虛忌。

【配伍】配木香、荊山稜、檳榔、厚朴等，治腸蟲；配荊山稜、青皮、半夏、麥芽等，治積食不化。

【附方】(1)安蟲散(師皇安驥集)：治馬腸蟲。

莪朮 木香 荊山稜 檳榔 厚朴 甘草

虛冷而痛時酌加楊梅皮、肉桂，熱痛時酌加薏苡根、苦楝子。

上葯共為末，用黃柏煎汁調勻，加酒少許灌服。

(2)治馬積食不化方(湖北)。

莪朮 荊山稜 大黃

以上煎水，候溫灌服。

按：莪朮、荊山稜均為破血行氣、攻堅化滯的葯物，其性不及大黃、巴豆、大戟之猛，所以常用於消積化滯，如加入補脾胃葯或酒醋更佳。汪昂說：“治積不宜專用下葯，恐傷真氣，宜於破血行氣葯中加補脾胃葯，氣旺，方能磨積，正旺則邪自消也。”

莪朮、荊山稜雖性同，而在功能上稍有差異。荊山稜破血行氣的功能較大，莪朮破氣中之血的力較強，所以用於破血行氣時，二者若配伍同用，則收效更著。

姜黄（唐本草）

【别名】黄姜、宝鼎香。

【主要产地】四川、湖南、浙江、江西、广东、河南、福建、台湾等地。

【药用部分】本品是姜科多年生草本植物，入药用其干燥的根茎。全体呈扁圆柱形，常有短指状分枝，略呈弧状弯曲，长约8分至寸半，宽约4—5分，外皮皱缩，有纵横不整的皱纹，呈灰黄色或鲜黄色，质地坚硬，不易折断；断面为黄赤色，中心部色泽较深。气味微芳香。

另有一种片姜黄，系山姜的根茎，全体呈长椭圆形，色淡黄，长约1寸左右，宽约5—6分，边缘有明显的节及遗留着多数根痕，质地坚硬，不易折断。

【炮制】原药生用，或研碎用。

【性味和归经】味辛苦，性温无毒。入脾、肝二经。

【应用】本品能行气破瘀，通经消肿。主治瘀血结肿、腹肿气胀、胸腹疼痛、幼畜奶泻、风寒湿痹、跌打损伤等症。

【用量】马和牛5钱至1两5钱；羊和猪1钱至2钱；兔和鸡2分至5分。

【附歌】姜黄辛温，消瘀破血，胸腹疼痛，下气最捷。

【配伍】配诃子、乌梅等，治幼畜红白痢；配延胡索、白芍药、肉桂、香附等，治血滞疼痛。

【附方】乌梅散（元亨疗马集）：治幼畜赤白痢。

姜黄 诃子肉 乌梅 干柿 黄连

以上共为末，和温水，一天灌一次，连服三天。

郁金 (唐本草)

【別名】王金、乙金、日金、蔚金。

【主要产地】四川、甘肃、广西、贵州、浙江、广东、河南、云南、台湾、西藏等地。

【药用部分】本品是姜科多年生草本植物，入药用其块根（上部的主根茎为姜黄，见姜黄项下）。

产于四川者，其根呈长卵形或纺锤形，两端稍尖，形如橄榄，长约寸许，粗约4—5分，外表呈灰黄色或黄绿色，有弯曲细密的皱纹，质地坚硬；折断面为黄褐色，半透明，有蜡样的光泽。微有芳香气昧。

产于浙江温州者，呈扁椭圆形或细长橄榄形，微弯曲，长达1寸6分，厚约2—3分，外皮呈灰褐色，有细微皱缩，质地坚硬；断面为灰黑色。

【炮制】将原药加米汤蒸煮熟后取出，晒干，打碎用。

【性味和归经】味苦辛甘，性寒无毒。入心、肺、肝三经。

【应用】本品能凉血破瘀，行气开郁，定惊止血。主治鼻衄、尿



图47 郁金

左、郁金原植物；右、药用部分外形及横切面。

血、胸胁腹痛、癲狂、疮黄肿毒等症。凡阴虚而无瘀滞者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪1錢至4錢；兔和鷄1分至5分。

【附歌】郁金苦寒，破瘀解郁，凉血生肌，定惊止血。

【配伍】配梔子、細辛、青黛、草薢，治肝脹；配甘遂、升麻、紫苑、黄芩，治胞轉；配白朮、黄芩，治馬駒喉骨脹、鼻出白膿。

【附方】(1)消肝散(元亨疗馬集)：治馬肝脹，两前腿伸探頻頻，左右顧脚。

郁金 梔子 細辛 青黛 草薢 玄參 沙參 大黃 甘草
茯苓 青皮 汉防己 草豆蔻 人參

上藥为末，蜜、清水同調，草后灌之。

(2)郁金散(元亨疗馬集)：治馬急慢腸黃。

郁金 訶子 黄芩 大黃 黃連 黃柏 梔子 白朮子
上藥为末，白湯調灌，急者連灌三付。

按：郁金以四川、广东两省出产較多，产四川称为川郁金，产广东称为广郁金，为行气凉血、破瘀解郁要藥。因郁金有破瘀作用，故阴虚而无瘀滞者忌用。

郁金、姜黄、莪朮均为理血藥，但各有其特点，郁金入心治血，姜黄兼入脾治血中之气，莪朮入肝兼治气中之血。藏器說：“姜黄辛温色黄，兼治血中之气，郁金苦寒色赤，单治血。”陈修園說：“郁金不可以治气郁之症，是郁金专于入血解郁破瘀明矣。至荆山稜与蓬莪朮則行气破血，削坚散結之力，較郁金为大。”

延胡索 (开宝)

【别名】玄胡索、元胡索、玄胡、元胡。

【主要产地】浙江、福建、热河等地均产，其中以浙江之宁波、金华、杭州所产者为佳。

【药用部分】本品是罂粟科多年生草本植物，入药用其干燥的块根。呈不规则扁球形，直径3分至5分，外表呈淡黄色或黄褐色；上面有基痕，呈浅凹窝状，下端常有2—3条深纵沟，质地坚硬，不易打碎；断面呈黄色，为角质而微有光泽。

【炮制】将原药打碎，生用，酒炒或醋炒用。

【性味和归经】味辛苦，性温无毒。入肺、肝、脾三经。

【应用】本品能活血散瘀，利气止痛。主治胸腹诸痛、跌打瘀血、下痢腹痛、血凝气滞、肢节拘挛等症。凡血虚及血热无瘀者忌用。

【用量】马和牛4钱至1两；羊和猪1钱至3钱；兔和鸡2分至6分。

【附歌】延胡辛温，能治诸痛，散血破瘀，扑损堪用。

【配伍】配当归、芍药、山药、青皮、陈皮、茴香、木通、梔子、白药子（玄胡索散，安驥药方），治冷痛；配槟榔、没药、青皮、陈皮、胡芦巴、干姜、补骨脂、吴茱萸、白朮、牵牛（玄胡索散），治马抽肾把膀。

按：延胡索性温味辛，温则能和畅，和畅则气行；辛则走散，走散则血活，血活则气行，故治气血凝滞，浑身肢节痛，为活血利气止痛的药物。綱目載：“能行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛，用之中者，妙不可言。”

延胡索酒炒能行血，醋炒止血，生用破血，炒用调血。因其性能走而不能守，故血虚及血热无瘀者忌用。

川芎（本草经名芎藭）

【别名】胡藭、撫芎、山鞠藭、茶芎。

【主要产地】四川、江西、湖南、云南、陕西等地。

【药用部分】本品是繖形花科多年生草本植物，入药用其干燥的根莖。为呈不规则的圆块状，直径约1寸余，有许多结节状，经蒸后干燥，品质硬而为角质性，内部呈深褐色，用阳光晒干者，品质较软；断面呈类白色或黄褐色，为粉质，有淡褐色小点。富有特殊的芳香气味。

产四川者称为川芎，品质较好；产江西者称为撫芎，质松而气淡；产湖南者称茶芎，色如茶叶，形同川芎而较小，品质较次。




图 48 川 芎

左、川芎原植物； 右、药用部分外形。

【炮制】將原藥以水浸半日，取出，悶潤至中心發軟，切片，晒干，生用或酒炒用。

【性味和歸經】味辛，性溫無毒。入肝、胆、心包三經。

【應用】本品能搜風止痛，順氣行血，長肉排膿，破瘀養新。主治頭風、血郁氣滯、胸膈脹痛、四肢拘攣、眼目流淚、癰疽瘡瘍、胞衣不下等症。凡陰虛火旺者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬1錢至2錢；兔和雞2分至5分

【附歌】川芎辛溫，能治頭風，行血理氣，破瘀養新。

【配伍】配天麻，治頭風；配熟地黃、當歸、白芍、治血虛；配白芷、茜草根、黃耆、金銀花、生地黃，能排膿消腫；配當歸、牡丹皮、大黃、朴硝、玄參等，治心黃病；配黃連、黃芩、地黃、梔子、當歸、菊花等，治中暑。

【附方】必勝散（居家必用事類全集方）：治馬疥癬并痒者。

川芎 大黃 防風 全蠍 荊芥穗

以上共為末，用溫水調勻，灌服。

按：川芎味薄氣厚而芳烈，能上升頭頂，下達四肢，故為理血行氣要藥。因其性散走而不守，多與補藥配伍入藥。若使用不當，會使血分過耗，體氣過虛，所以對於陰虛火旺者，則不宜濫用。宗奭說：“治頭面風不可缺，以他藥佐之。”丹溪說：“郁在中焦，須川芎開提其氣以開之，氣升則郁自降，故川芎總開諸郁，宣達三焦，為通陰陽氣血之使。”

丹參（本草經）

【別名】赤參、紫丹參、血丹參。

【主要产地】四川、云南、浙江、江西、江苏、安徽、山东、河北、陕西、广西、湖南等地。

【药用部分】本品是唇形科多年生草本植物，入药用其干燥的根。根呈细长圆柱形，常屈曲或扭转，全长约4寸至6寸，粗约2至3分，外表呈紫红色，有纵皱及纵沟，粗根有时呈裂缝，质硬而脆；横断面呈黄褐色，有不规则的放射状纹理。

【炮制】将原药润湿切片，生用、炒用或酒炒用。

【性味和归经】味苦，性微寒无毒。入心、肝二经。

【应用】本品能益气活血，去瘀生新，安生胎，下死胎，排脓生肌。主治血瘀气滞、骨节痹痛、疮疥癰肿、胎气、胎风等症。反藜蘆。

【用量】馬和牛5錢至1兩2錢；羊和猪1錢至4錢；兔和雞2分至6分。

【附歌】丹参苦寒，益气活血，去瘀生新，癰肿疮疥。

【配伍】配生地黃、白芍、当归，治衄血；配苦参、蛇床子等，煎湯，洗风热疥癩。

【附方】(1)治乳牛恶露停滞方(江苏)。

丹参 当归尾 紅花 澤泻 炒枳壳 焦山梔 木通 連翹
上药水煎服，早晚各一剂，每日一帖，連服二至三帖。

(2)生地丹参散(甘肃)：治牛鼻出血。

丹参 柏子仁 生地黃 桔梗 沙参 杭白芍 当归 側柏
叶炒黑

远志 麦門冬 鮮荷叶 燒棕炭

共为細末，童便为引，調水灌服。

按：丹参能益气活血，消瘀止痛；如瘀血既除，痛即消失，新血

亦隨之而生，故有入心養血之效。時珍說：“五參五色，配治五臟，人參入脾曰黃參，沙參入肺曰白參，玄參入腎曰黑參，牡蒙入肝曰紫參，丹參入心曰赤參，其苦參則右腎命門之藥也。”

赤芍藥（本草經）

【別名】赤芍、木芍藥、山芍藥。

【主要產地】河北、吉林、黑龍江、四川、內蒙等地。

【藥用部分】本品是毛茛科多年生草本植物，入藥用其干燥的根。呈圓柱形，多切成長5寸至9寸的段落，粗約4—5分，外表的栓皮呈暗褐色或暗赤褐色，質松而易于脫落，有彎曲的縱皺及少數橫裂；橫斷面多粉質，不平坦，色灰白而帶微紅，皮部有時與中心木部脫離。以產于內蒙者品質較好，其體軟粉多而氣香，其他各地所產者體質較硬。

【炮制】將原藥稍浸潤片刻，然後悶一夜，使質軟後，取出切片晒干生用，或酒炒用。

【性味和歸經】味酸苦，性微寒無毒。入肝、脾二經。

【應用】本品能瀉肝清熱，散瘀活血，止痛消腫。主治療癰腫、瘀血凝滯、腹痛、腸熱下血、目赤等症。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬1錢至4錢；兔和雞2分至6分。

【附歌】赤芍酸寒，除熱瀉肝，活血止痛，瘀血癰腫。

【配伍】配乳香、青皮、陳皮、沒藥，治食滯腹痛；配桃仁、穿山甲，可消痛腫。

【附方】紅芍藥散（蕃牧纂驗方）：治馬心氣傷、驚多臥少、吐涎沫。

赤芍药 没药 人参 茯苓 木通 血竭

上药为末，加蜜、浆水灌之。

蒲黄（本草经）

【别名】香蒲、甘蒲、中央粉。

【主要产地】我国各省均产，以山东、湖北、宁夏、江苏等地产量较多。

【药用部分】本品是香蒲科多年生草本植物，入药用其花粉。为鲜黄色如米糠状的轻松粉末，微细，易动摇，有时混有黄褐色雄蕊。

【炮制】生用或炒黑用。

【性味和归经】味甘，性平无毒。入肝、脾、心包三经。

【应用】本品生用性滑，有行血消瘀、通经脉、利小便、除湿热的功用；如炒黑性涩，能止一切出血，主治下焦湿热、小便不利、尿血、扑打损伤、肿痛等症；如炒炭用则能治衄血、尿血症。

【用量】马和牛 5 钱至 1 两；羊和猪 1 钱至 4 钱；兔和鸡 2 分至 5 分。

【附歌】蒲黄甘平，逐瘀通经，生则破血，炒用止血。

【配伍】配小蓟、木通、生地黄、梔子、藕节，治下焦湿热、尿血等症；配桃仁、红花、乳香、没药、当归尾、川芎，治跌打损伤、瘀血停滞及肿痛等症；配生地黄、梔子、黄芩，治衄血；配元明粉，外用治舌下肿。

【附方】蒲黄散（山西）：治马尿血病。

蒲黄炒黑 瞿麦 車前子炒黄 当归 黄芩炒黑 赤芍药 花粉 川大黄 梔子炒 甘草梢 秦艽

共研細末，用竹叶煎湯冲药，候溫灌之。

五灵脂（开宝）

【别名】灵脂、丹芝、龙芝、血灵脂。

【主要产地】以河北之延庆、京西、良乡，广西之南宁、桂平、百色等处产量为多，其他各省亦有出产。

【药用部分】本品是蝙蝠科哺乳类动物，原名寒号鳥（或称寒号虫、大蝙蝠）的干燥粪便，有五灵脂和血灵脂两种；以后者为正品。

五灵脂，其形如山羊屎，呈椭圆形，长约2分至4分，宽约1分余，外表为黑褐色或赤褐色，质轻松；折断面内为灰色，无臭气。此种为秋季采集者称灵脂米或散灵脂。血灵脂则粒大如豆，多为粘连成块，气腥，外表润泽而有光，质润如飴，为春季采集者称灵脂块或糖灵脂，品质较佳。

【炮制】将原药筛去砂塵，生用、酒炒或醋炒用。

【性味和归經】味甘，性温无毒。入肝經。

【应用】本品能通利血脉，行瘀止痛，杀虫解毒。主治心腹血气諸痛、产后血痛、腸风血痢、胎衣不下、子宫脫出、血貫腫子及蛇、蠍、蜈蚣咬伤等症。

【用量】馬和牛5錢至1两6錢；羊和猪2錢至4錢。

【附歌】五灵脂温，能通血脉，心腹諸痛，腸风血痢。

【配伍】配蒲黄、茜香（五灵散），治馬阴腎木腎黄、摔拽后膀胱病；配海桐皮、白芥子、大黃、甘草、芸苔子、木鼈子，外用治馬伤蹄方。

按：五灵脂、蒲黄，均为行瘀要药，且常配伍使用。但五灵脂止痛作用较强，且为胎前产后的要药；而蒲黄尚有利水作用，常用以治膀胱有热之小便淋痛。

沒药 (开宝)

【别名】末药、明沒药。

【主要产地】四川、宁夏等地。

【药用部分】本品是橄榄科灌木沒药树渗出的树胶脂。凝固树胶脂为形圆而不整之块，小的如谷粒，大的如鸡蛋，形状不规则，外表呈紫褐色或赤褐色，有时带有黄色，粗糙，有多数黄白色颗粒或碎木片掺杂其中，质坚脆；断面为黄褐色或紫褐色，有光泽。气味芳香。一般有两种：一为馬皮沒药（亦称狗皮沒药），外面用带毛的兽皮包裹，色黑质韧，掺杂物较多；一为明沒药（亦称净沒药），外面没有兽皮包裹，较洁净，色红黄带黑而透明，品质较佳。

【炮制】将原药炒或以灯芯拌炒去油，作成小块用，或研末用。

【性味和归经】味苦，性平无毒。入肝经。

【应用】本品能散血消肿，行气止痛，生肌敛疮。主治癰疽肿痛、金创扑伤、五劳七伤、瘀血结滞等症。

【用量】馬和牛4钱至1两；羊和猪1钱至2钱；兔和鸡2分至5分。

【附歌】沒药苦平，疗疮止痛，跌打损伤，破瘀散肿。

【配伍】配当归、玄参、贝母、红花、白芷、秦艽、白药子、甜瓜子、自然铜（沒药散），治肾伤咳嗽、腰中疼痛；配当归、秦艽、知母、桔梗、百部，能止痛和血，治闪伤或跌伤膊膀；配乳香、白药子、山药、自然铜、玄参等，治胸膈痛。

【附方】(1)沒药散(元亨疗马集)：治马肺气，把前把后，或闪伤跌伤膊膀，止痛和血。

沒药 当归 秦艽 甘草 知母 桔梗 百部 紫苑 贝母

青葙子 白葯子 天門冬 麥門冬 柴胡

上藥为末，清油、紅花为引，水煎沸候溫灌之。

(2)止痛散(元亨疔馬集):治馬肺氣把膊。

当归 沒葯 大黃 芍葯 甘草 黃葯子 牡丹皮 枇杷叶
天花粉

上藥为末，紅花、韭汁同煎，草后灌之。

乳香 (別录)

【別名】尔香、奶香、熏陆香，天澤香。

【主要产地】南洋、印度群島等地。

【葯用部分】本品是漆樹科常綠小喬木乳香樹皮中滲出的樹脂。凝固的樹脂为乳頭形、梨形，或圓球形等不定的形狀，外表粗糙不平，有鮮黃色、赤褐色、紅黃色等各種顏色，系由大小顆粒積聚而成，表層常有粉霜，質硬而脆，斷面有玻璃樣光澤，嗅之似松香，嚼之稍能粘牙。

乳香以含泥砂樹皮等雜質較少者为佳。一般以滴乳为最好，滴乳呈橢圓形，如乳頭狀，半透明，淡黃色，是由樹液滴落積累而成；另一種稱原乳，大小不等，色同于滴乳，常常夾有砂石；米乳是乳香之最小粒者，多摻雜有砂石。入葯以透明黃亮，形如乳頭者为上品。

【炮制】將原葯炒去油，切成小塊用，或以醋噴潮濕后炒干或炒熟后噴醋。亦有將乳香、沒葯混合以灯芯拌炒去油，制成后称为制乳沒。

【性味和归經】味苦辛，性溫無毒。入心、肝、脾三經。

【应用】本品能調氣活血，舒筋止痛，消腫，托瘡毒。主治心腹諸痛，四肢拘攣，跌打損傷，癰疽瘡毒等症。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪1錢至2錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】乳香辛溫，主治疮毒，生肌調气，活血止痛。

【配伍】配沒藥、当归、牛膝、麻黃、巴戟天、紅花、檳榔、骨碎补、胡蘆巴、白附子（乳香散），治蹙損腎經、臥地難起；配沒藥、人參、当归、白芷、血竭、高良姜、远志、芍藥、香附子（乳香散），治心寒吐清水。

【附方】（1）定痛散（元亨疔馬集）：治馬跌扑損傷筋骨，和血定痛。

全当归 鶴虱 乳香 沒藥 血竭

上藥为末，紅花、酒同煎沸，入童便灌之。

（2）乳香散（司牧安驥集）：治心毒癢蹄。

乳香 烏賊骨 白矾 龙骨

上藥为末，醋調漿水洗淨，干貼之，三、五日愈。

按：乳香、沒藥均为行气散血止痛要藥，但沒藥以凉血止痛作用較好，乳香以活血止痛作用較强，二者不仅能外治跌打損傷、癰疽疮毒，并能內服治疗气血不行，或气滯經絡作痛。故常配合应用。

牛膝（本草經）

【別名】牛夕、牛七、对节菜、山萆菜。

【主要产地】我国各省均产。其中以河南，四川产者为佳。

【藥用部分】本品是萆科多年生草本植物牛膝的根。有川牛膝和怀牛膝两种。前者以根粗肉肥、質軟、味甘、嚼之无筋者为佳；后者以外表淡黄色、肥长而大者为佳。江西遂川产者，名龙牛膝，形似川牛膝，但較瘦小，品質較次。

川牛膝：根呈弯曲圆柱形或扁圆柱形，上端常有膨大的根头部，全长约6寸至尺余，根头部粗约6—7分，下部粗约4—5分，有时分枝，外表呈灰褐色而有纵皱，有时见到支根的断痕，质软，但较怀牛膝硬，有焦糖样的气味。

怀牛膝：根呈圆柱形，弯曲较少，长约6寸至2尺，粗约1—2分，外表呈黄白色或土黄色，细根微透明，有细纵皱，质柔软，微有特殊的气味。




图49 牛膝

左、牛膝原植物；右、药用部分外形：1. 川牛膝，2. 怀牛膝，3. 川牛膝的横切面，4. 根头部，5. 支根的断痕。

【炮制】川牛膝：除去芦头，洗净切成薄斜片用。

怀牛膝：横切成7—8分长的小段，晒干生用，或酒浸炒用。

【性味和归經】味苦酸，性平无毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能破血行瘀，益肝腎，壯筋骨，通淋墮胎，并能引諸藥下行。主治寒湿痿痹、腰膝及骨节疼痛、四肢拘攣、跌打損伤、四肢伸曲困难、小便淋漓、尿血、死胎、胞衣不下等症。孕畜忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两；羊和猪 2 錢至 4 錢。

【附歌】牛膝苦平，除湿治痹，强壮筋骨，腰脊痛宜。

【配伍】配大腹皮、薏苡仁、木瓜、独活、防己、木通、肉桂（和筋散，师皇安驥集），治馬风湿痹痛；配瞿麦、滑石、当归、通草、冬葵，治胎衣不下。

【附方】治筋骨伤方（司牧安驥集）：治腎虛。

牛膝 肉蓯蓉 肉桂 巴戟天 茴香 檳榔 龟板 虎骨
骨碎补 自然銅

上藥为末，温开水冲服。

按：牛膝味苦酸平，味厚气薄，走而能补，生用則引諸藥下行，有破血行瘀作用，故主治四肢拘攣、伸曲困难、小便淋漓、尿血、死胎及胞衣不下等症。酒炒則无破血作用，能滋补及壯筋骨，故能补肝舒筋，补腎强阴，治腰膝寒湿痹症、跌打損伤、血瘀結聚等症。

紅花（开宝） 附：藏紅花

【别名】紅兰花、黄兰花、兰紅花。

【主要产地】四川、河南、安徽、云南、浙江、江苏等地。

【藥用部分】本品是菊科二年生草本植物紅花的干燥花。花冠細长，呈筒状，干則收縮如絲，先端五裂，裂片为狭綫形，长约 2 分；全长約 4 分余，外表呈紅色或暗紅色，質輕松。

紅花以产河南省的怀紅花为佳，其花瓣长，呈紫紅色。产四川

的川紅花呈紫色,略带黄色。

藏紅花: 藥用部分为干燥的花柱,多集成疏松的团塊状,呈暗紅色,花柱长约 2—3 分,油潤而有特异的香味,嚼之唾液則染成橙紅色。

【炮制】原藥晒干,生用或炒用。

【性味和归經】味辛,性温; 藏紅花:味甘,性平,二者均无毒。入心、肝二經。

【应用】本品能破瘀生新,活血止痛,消肿通經;多用为破瘀血藥,少用为养血藥。藏紅花功用同紅花,但养血力較强,去瘀力較弱。主治难产、胎死腹中、瘀血結肿、跌打損伤等症。孕畜及无瘀血者忌用。

【用量】馬和牛 3 錢至 1 两;羊和猪 1 錢至 2 錢。

【附歌】紅花辛温,能消瘀血,多量破血,少量养血。

【配伍】配川芎、牛膝、肉桂、当归、車前子,治死胎不下;配全当归、熟地、白芍藥、川芎、枳实、青皮(当归散),治馬胎气。

【附方】(1)紅花散(四川):治牛胎衣不下或尿血。

川紅花 炙香附 当归 川芎 生地黄 赤芍藥 黃柏炒
官桂 瓜蒌仁 大腹皮 火麻仁 車前子
共为末,火酒为引,加水灌服。

(2)治伤重尿血方(司牧安驥集)。

紅花 当归 沒藥 酒

連灌数剂。

按:紅花辛温,辛能发散,温能行血,故破瘀行血之力較好,对于难产、胎死腹内、胞衣不下、瘀血結肿及跌打損伤等奏效甚捷。使用时,用量的多少,与其作用有关,量多則破血力大,量少則能养

血。应加注意。

桃仁（本草經）

【主要产地】我国各地均有出产。

【药用部分】本品是蔷薇科落叶乔木桃树的种子。干燥的种子呈扁平卵圆形，其先端较尖，中间膨大，基部略小而偏斜，长约5分至7分，宽约3分余，外表呈赤褐色或黄褐色，内部呈白色，富含油脂。

【炮制】将原药用沸水浸泡片刻，滤出，去皮尖，晒干生用或炒用（双仁者不供药用）。

【性味和归经】味苦甘，性平无毒。入心、肝二经。

【应用】本品能破血行瘀，润燥滑肠。主治膀胱蓄血、产后腹痛、跌扑瘀血、血热便秘、血痢、肠癰等症。孕畜忌用。

【用量】马和牛4钱至1两；羊和猪1钱至3钱。

【附歌】桃仁甘平，破血行瘀，生用行血，炒黄润燥。

【配伍】配大黄、甘草、朴硝、桂枝，治膀胱蓄血；配大黄、川芎、当归、蒲黄，治跌扑损伤、瘀血肿痛；配大黄、牡丹皮、朴硝，治肠痛尚未成膜。

【附方】桃仁活血散（四川）：治牲畜跌扑损伤。

桃仁 红花 当归尾 土鳖 乳香 没药 自然铜童便浸 参
三七 硼砂 牛蒡子 伸筋草 木通 刘寄奴
共研细末，酒为引，加温水冲服。

按：桃仁苦甘性平，质润多油。功能破血行瘀，润燥滑肠。但炮制后其作用与生用不同，生用连皮尖行血，炒黄去皮尖则润燥；如用以行血，多配合理血药或理气药；如用于润燥滑肠，多配合养血

生津藥或潤燥藥。

益母草（本草經） 附：茺蔚子

【別名】茺蔚、益明。

【主要產地】我國各地均產。

【藥用部分】本品是唇形科一年生或二年生草本植物，入藥用其全草及小堅果。其全草稱益母草，小堅果稱茺蔚子。

益母草：莖為方形，呈黃褐色，橫斷面有白色髓部，葉對生于節上，但多數脫落，其葉腋間輪生小唇形花，花冠多數脫落，僅殘留着土黃色的萼筒，萼先端有齒，尖銳如刺。

茺蔚子：呈稜形，一端較寬，如平截，另一端漸狹小，長約半分至1分，外表平坦，呈褐色，外皮較薄，種仁為類白色。

【炮制】益母草：濕潤，切成1—2分長的小段，晒干生用。

茺蔚子：篩去泥砂，生用。

【性味和歸經】味辛苦，性微寒；子、味辛甘，性微溫，二者均無毒。入心包、肝二經。

【應用】益母草能去瘀生新，活血養胞。主治產後瘀積腹痛、胎



圖 50 益母草

左、益母草原植物；右、茺蔚子。

漏难产、胞衣不下、空怀、尿血泻血、疔疮癰肿等症。

茺蔚子能活血养胞，行气明目。主治风热气凝、血滞目赤、发热口渴及胎前产后諸病、发情周期不定等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和猪 1 錢至 4 錢；兔 2 分至 5 分

【附歌】益母草辛，活血养胞，去瘀生新，产后須用。

【配伍】配乳香、沒药、血竭、琥珀，治产后血积腹痛，及胎衣不下；配紫花地丁、金銀花、沒药、甘菊、貝母，治癰疽疔疮及无名肿毒。

【附方】(1)治馬产后瘀血方(河南)。

益母草 黑豆 地肤子 車前子 紅花 紅糖 酒
上药水煎，灌服。

(2)益母散(四川)治牛、猪产后瘀血作痛。

益母草 焦荆芥 炒蒲黄 五灵脂 陈皮 藿香 青木香
全当归 延胡索 川芎 桂枝 萊菔子 槟榔 赤芍药
共为末，燒黑姜为引，温水冲服。

血竭 (唐本草)

【别名】麒麟竭、血結、血力。

【主要产地】广东以及印度尼西亚等地。

【药用部分】本品是棕櫚科藤本植物麒麟血藤制得的树脂。为不定形的塊状，有沟紋及用布包而被遺留的布紋，外表呈赤褐色或暗紅褐色，質坚而脆；断面为紅色以至紫褐色，有光澤，微显小空洞。

【炮制】将原药研末用。

【性味和归經】味甘咸，性平无毒。入心包、肝二經。

【应用】本品能散瘀生新，活血止痛；外用能止血生肌。主治瘀血肿痛、跌打损伤、金創出血、疮瘍不斂等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 6 錢；羊和猪 1 錢至 2 錢。

【附歌】血竭咸平，专治损伤，散瘀消肿，活血止痛。

【配伍】配沒药、茴香、巴戟天、胡蘆巴、苦楝子、牵牛子、木通、白朮、当归、补骨脂、藁本（麒麟竭散，安驢药方），治腰膝痛；配沒药、郁金、胡桐淚、芸苔子、当归（一捻金散），治五癰痛。

【附方】治木腎黄方（司牧安驢集）。

麒麟竭 沒药 当归 茴香 益智仁 香白芷 通草
盐湯灌服。

芸苔子（唐本草）

【别名】油菜子、芸芥。

【主要产地】我国各地皆产。

【药用部分】本品是十字花科二年生草本植物芸苔的种子。干燥品呈类球形，直径約半分，外表为淡黄色或黑褐色，有一条沟槽，种皮很薄，种仁为黄白色，富含油脂。

【炮制】原药生用或炒用。

【性味和归經】味辛，性温无毒。入肺經。

【应用】本品能破气行血，散結消肿。主治热毒、热肿、乳癰、产后瘀血腹痛等症。外用吹鼻可为通关开窍药。凡无瘀滞腸滑者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 4 錢。

【附歌】芸苔辛温，散結破气，行血消肿，热毒乳癰。

【配伍】配麻子、生油，治牛結喉惡風；配沒藥、乳香、當歸、血竭、川芎，治腰腿痛。

澤蘭（本草經）

【別名】虎蘭、孩兒菊、水香葉、水澤蘭。

【主要產地】江蘇、浙江、江西、福建、廣西、湖北、山東、廣東及其他各省的溪澗和濕地均產。

【藥用部分】本品是菊科多年生草本植物，入藥用其莖葉。在南方一年能收穫兩次，第一次生長的莖柔軟，葉較大，有濃厚香味，第二次生長的苗莖較硬，葉較小，香味較淡，容易誤作佩蘭。

干燥品的莖呈圓柱形，通常為紫色，並生有細茸毛，葉對生，多皺縮，呈黃綠色，邊緣有鋸齒，為廣披針形，商品中有时亦見到頭狀花序，呈繖房狀排列，有清香氣味。

【炮制】將原藥噴水濕潤，候潤軟，切成3—4分長的小段，晒干生用。

【性味及歸經】味苦，性微溫無毒。入脾、肝二經。

【應用】本品能行血破瘀，消水散腫，舒肝散郁。主治產後腹痛、癰腫、筋骨拘攣、骨節濕腫、扑損瘀血等症。凡無瘀血者忌用。

【用量】馬和牛4錢至1兩5錢；羊和豬1錢至4錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】澤蘭苦溫，通利關節，跌扑損傷，消水散腫。

【配伍】配當歸、芍藥、甘草，治血虛有火；配防己、酒、醋，治產後水腫。

【附方】疏風暖骨散（養耕集）：治牛膊黃。

澤蘭 川烏 草烏 防風 白芷 川芎 當歸 細辛 白芍

玄参 白茯苓 何首烏 馬鞭草 酸醬草
 生姜、葱共搗服。

水蛭 (別錄)

【別名】馬蛭、馬蟻、馬螭、吸血虫。

【主要产地】我国温暖各地之池沼、水田中都有出产。

【药用部分】本品是水蛭科环节蠕形动物水蛭的虫体。体似蚯蚓而形稍扁，有扁平的环节，长约2—3寸至6—7寸，两端渐窄。色有数种，一般背面带黄褐色，显有黄黑色斑点和黄色的直綫五列，腹面带黄綠色，无斑点，全体有百多輪，雌雄同体，体之前后两端，有大吸盘，可以叮附人畜的皮肤而吮取血液。又其体能伸长縮短，縮則状如小球，在水中行动时，則作波浪状而游泳。

干燥体长约1寸至2—3寸，粗約1分至3分，外面带綠灰黑色，有不規則的弯曲；折断面呈漆黑色，有光澤。

【炮制】将原药置缸瓦中，以微火炒焦用。

【性味和归經】味咸苦，性平有毒。入肝、膀胱二經。

【应用】本品能破瘀散結，消肿解毒。主治瘀血积聚、排尿困难、跌打损伤肿痛、癰疽毒肿等症。孕畜忌用。

【用量】馬和牛3錢至5錢；羊和猪5分至1錢。

【附歌】水蛭咸平，散結消肿，跌扑损伤，逐瘀有功。

【配伍】配大黄、牵牛，治跌打损伤，瘀血凝肿；配牛膝、乳香、沒药等，治瘀血。

【附方】治馬抽筋把膊腿痛方(河北)。

水蛭炒 川牛膝 乳香 沒药 淫羊藿 延胡索 防风
 鷄血藤 茯苓 炒白朮

共为細末,开水冲服。

苏木 (唐本草)

【别名】苏方木、赤木。

【主要产地】四川、广东等地。

【药用部分】本品是豆科植物小乔木,入药用其木部。一般多切成大小不定的塊状,外表呈黄赤色或赤褐色,带綫形,不平坦,横切面有圓心圈(年輪),質地堅实,易縱割,不易橫斷。

【炮制】將原药劈成小絲,或刨成薄片用。

【性味和归經】味甘咸,性平无毒。入心、肝、脾三經。

【应用】本品能行血祛瘀,宣散表里风气,消肿,止痛,多用能破血。主治产后瘀血积滯、恶露不安、跌打损伤、瘀肿等症。凡血虛无瘀滯者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两;羊和猪 1 錢至 2 錢。

【附歌】苏木甘平,行血祛瘀,产后瘀积,兼治跌扑。

【配伍】配澤兰、川芎、麦門冬、生地黄、蒲黃、黃耆、益母草、牛膝、荆芥,治产后恶露瘀积。

【附方】治膀胱积热、石淋、胞轉方(貴州)。

苏木 猪苓 澤泻 桃仁 荔枝核 赤芍药 海金沙 紅花
共研末,温水冲服。如尿閉点滴不下,則重用桃仁、紅花、海金
破。

刘寄奴 (唐本草)

【别名】金寄奴、六月雪。

【主要产地】各地均产,其中以河北、山东、四川較多。

【药用部分】本品是菊科多年生草本植物。入药用其干燥的全草，莖呈圆柱形，显黄褐色，有细稜线；叶互生，多皱缩，表面显黑褐色或绿褐色，背面呈灰绿色，质脆易碎。

【炮制】将原药水洗湿润，候莖润软，切成1分左右的小段，晒干生用。

【性味和归经】味苦，性温无毒。入心、脾二经。

【应用】本品能行血通经，破血消肿，止痛。主治产后恶露、腹痛等症。外用于金创出血。



图 51 刘寄奴

【用量】马和牛5钱至1两5钱；羊和猪2钱至3钱；兔和鸡4分至8分。

【附歌】刘寄奴温，破瘀行血，下气止痛，外用止血。

【配伍】配骨碎补、延胡索等，治折伤瘀血停滞于腹内；配百草霜，外用止血。

【附方】治牛产后瘀血、肚腹脹痛方（四川）。

刘寄奴 焦荆芥 蒲黄炒 五灵脂 当归尾 川芎 延胡索
香附炙 益母草 黑姜
共为细末，加糯米酒、开水，候温灌服。

自然铜（开宝）

【主要产地】云南、四川、广东、山西及华北各地。

【药用部分】本品是天然黄铁矿。呈方块状或片状，或为八面的结晶体，新出矿者，色如红铜或黄铜，日久则在表面生有斑烂的色彩，且有光泽，质甚硬。

【炮制】原药以火煨透，童便或醋淬再煨再淬，共七次，候酥而色黑，研碎后，水飞用。

【性味和归经】味辛，性平无毒。入肝经。

【应用】本品能散瘀破积，续筋接骨，散血止痛。主治跌打骨折、瘀滞疼痛等症。凡血虚无瘀滞者忌用。

【用量】马和牛5钱至1两5钱；羊和猪2钱至3钱。

【附歌】然铜辛平，消瘀止痛，破积排脓，不可多服。

【配伍】配乳香、没药、当归身、羌活，治跌扑骨折。

【附方】接骨方(辽宁)：治四肢骨折。

自然铜炙 白芷 白糖

上药混合内服。

穿山甲 (别录)

【别名】川山甲、鱗鲤、龙鲤。

【主要产地】广东、广西、四川、江苏、台湾等地。

【药用部分】本品是穿山甲科食齿类的动物。入药用其鳞甲。甲片形如鱼鳞，略呈三角形，宽约4分至2寸，外表呈淡褐色或灰褐色，背面稍隆起，一端较圆钝而平滑，其他部分则散布均等的纵条纹，边缘较薄而平滑，质甚坚韧。

【炮制】先将细砂放入锅内炒热，再投入甲片和砂拌炒，炒至甲片发泡膨胀、转为黄色时，即筛起筛去砂子，待冷后，以清水洗净粘附着的细砂，晒干即成。临用时打碎。炒成后称炒甲珠，或甲珠。



图 52 穿山甲

上、穿山甲；下、药用部分外形：1. 縱条紋。

【性味和归經】味咸，性微寒有毒。入肝、胃二經。

【应用】本品能散血通絡，攻疮排膿，通竅下乳。主治癰疽瘰癧、乳汁不下、风寒湿痹、疥癩等症。凡孕畜及癰疽已潰者忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两；羊和猪 1 錢至 3 錢。

【附歌】穿山甲寒，散血攻毒，排膿止痛，下乳有功。

【配伍】配金銀花、連翹、天花粉、陈皮、青皮，治疮疽初期肿痛；配大戟、滑石、海金沙（神聖散），治胞衣不下；配王不留行、龙骨、瞿麦、麦門冬、甘草，治乳汁缺乏。

【附方】(1) 治馬中結方（农政全書）。

穿山甲 炒黃色 大黃 郁李仁 風化石灰（如无灰以朴硝代之）

上药共为末，以麻油、醋调匀灌之，立效。如灌药不通，用猪牙皂研末，同麻油和匀，填粪门中，再灌前药一服，即愈。

(2)甲珠托毒散(四川):治牛各种疮黄症。

甲珠 白芨 花粉 牙皂 知母 貝母 金銀花 連翹 荆芥 半夏 土茯苓 蒲公英

共研末，开水冲服。(如已溃者减甲珠、牙皂，加乳香、没药；病在头部加菊花，在中部加川芎，在下部加牛膝)。

馬鞭草 (別录)

【别名】鉄馬鞭、雁頸草、凤头草。

【主要产地】

我国各省均产。

【药用部分】

本品是馬鞭草科多年生草本植物，入药用其干燥全草。

莖呈四棱形，黄褐色，质坚硬，易折断；断面黄白色，中央有白色絮状的髓心。叶片绿褐色，皱缩卷曲，质脆易脱落。花穗着生在枝莖顶端，小花及果



图 53 馬鞭草

实多数已萎落不存。

【炮制】将原药洗净，切断晒干，生用。

【性味和归经】味苦，性微寒无毒。入肝、脾二经。

【应用】本品能破血消胀，杀虫疗癰。主水肿难产、胞衣不下、产后瘀血、癰疮疥癩等症。对于体虚者及孕畜忌用。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和猪1錢至3錢。

【附歌】馬鞭草寒，破血消胀，杀虫疗癰，血瘀多用。

【配伍】配牡丹皮、川芎、当归、芍药、地黄、甘草(补血散，师皇安驥集)，治馬瘀血疼痛；配当归尾、紅花、茜草、牡丹皮、赤芍药、香附、金銀花、連翹、乳香、沒药、檳榔、萊菔子、黄酒，治牛产后瘀血。

酒 (別录)

【别名】燒酒、火酒、白酒。

【主要产地】我国各地皆有酿造。

【来源】是用米、谷、麦、高粱或其他果实，加入麴类酿制而成。

【性味和归经】味苦甘辛，性大热有毒。入十二经。

【应用】本品能活血通絡，助药力，厚腸胃，散湿气。主治筋絡攀痛、伤水冷痛、风寒湿痹、跌打损伤、破伤风等症。对于大热者忌用。反藜蘆。

【用量】馬和牛2兩至8兩；羊8錢至2兩。

【附歌】酒性大热，通活血脉，宜助药力，风寒引药。

【配伍】古方多作单方或引药用。

按：酒有白酒和黃酒两种。白酒行筋骨的力量較强，多配合祛风止痛药或跌打损伤药用；黃酒行血作用較好，多作为胎前产后的引药。

醋 (别录)

【别名】酢、苦酒、小酒。

【主要产地】各地皆产。以山西和江苏镇江产者为佳。

【药用部分】本品基本上是用酒经过发酵、变成酸味而成。入药以用米酒制成的醋较好。

【性味和归经】味酸苦，性温无毒。入肝经。

【应用】本品能散瘀消肿，下气消胀，解毒。主治肚腹胀满、口舌生疮、产后瘀血等症。外敷金疮及癰肿。

【用量】马和牛 2 两至 1 斤；羊和猪 4 钱至 1 两；兔和鸡 5 分至 2 钱。

【附歌】醋名苦酒，散瘀消肿，下气消胀，外用敷肿。

【配伍】本品多内用为引药，或和面捣糊作丸剂或外敷用。

【附方】治牛肚胀方(甘肃)。

椿白皮 榆白皮 醋香附 炒二丑 麦芽 神麴

上为粉末，陈醋、麻油为引，加水灌服。

紅麴 (丹溪补遗)

【主要产地】我国各地皆产。

【药用部分】本品是用糯米和麴母霉制而成的紫红色米粒。

【性味和归经】味甘，性温无毒。入脾、胃二经。

【应用】本品能活血消食，健脾和胃。主治食积腹痛、赤白痢疾、痰咳、跌打损伤等症。

【用量】马和牛 5 钱至 2 两；羊和猪 2 钱至 4 钱。

【附歌】紅麴甘温，开胃消食，止痢逐疾，食积腹痛。

【配伍】配白朮、当归、生姜(司牧安驥集),治馬氣痛起臥。

第二节 止血藥

參三七(綱目)

【別名】山漆、金不換、田三七、三七、田七。

【主要產地】广西、广东、云南、湖北、浙江、山东、四川、福建等地。

【藥用部分】本品是五加科多年生草本植物,入藥用其干燥的根。根呈圓錐形,上端較粗,下端較細,長約5分至1寸余,上端粗約2至5分,外表呈土黃色或黃褐色,有斷續的細縱皺,其頂端有莖的殘基,周圍有凸出疣狀的芽痕,質堅實,不易斷;斷面為黃褐色或黃白色。微有芳香氣味。

【炮制】打碎生用,或研末用。

【性味和歸經】味甘微苦,性溫無毒。入肝、胃二經。

【應用】本品能行瘀消腫,散血止血,止痛解毒。主治衄血、血痢、產後流血不止、癰腫、跌打損傷、瘀血積腫、虫咬蛇傷等症。可內服亦可外敷。對於血虛無瘀者忌用。

【用量】馬和牛3錢至1兩。

【附歌】參三七溫,消腫定痛,跌打刀傷,止血特功。

【配伍】配當歸、生地黃,治血痢腹痛;配花蕊石、血余炭,治衄血、二便下血等症。

【附方】治牛馬創傷癰疽方(湖北)。

參三七 乳香 沒藥 孩兒茶 血竭 冰片

上藥共研為細末,撒布患部。

仙鶴草（百草鏡）

【别名】龙芽草、金頂龙芽草、黄龙尾。

【主要产地】我国各地均产，其中以福建为最多。

【药用部分】本品是蔷薇科多年生草本植物，入药用其干燥的全草。莖呈紫褐色或黄褐色，因干缩而现断续的细线稜，莖节明显，基部较密，上部疏，叶皱缩，显绿褐色，边缘有锯齿，质脆而易碎。

【炮制】原药以水湿润，闷透，切成1分左右的段落，晒干生用。

【性味和归经】味苦澇，性微温无毒。入肺、脾、胃、大腸四经。

【应用】本品能收斂，止血，补虚。主治衄血、子宫出血、劳伤、赤白痢等症。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄3分至5分。

【附歌】仙鶴草澇，收斂止血，赤白痢疾，补虚有力。

【配伍】配阿胶、藕节，治衄血咯血；配槐花、地榆治大便下血。

【附方】(1)治牛拉稀带血方(甘肃)。

仙鶴草 当归炭 荆芥炭 禹余粮 生地炭 生姜炭 阿胶
珠 黄芩 焦地榆 炒蒲黄 焦艾叶 白头翁 槐花 大黄
秦皮 白矾 青盐 百草霜
共研细末，混合灌之。

(2)治牛和馬紅痢方(湖北)。

仙鶴草 煎水灌服。

白芨（本草經）

【别名】白及、白給、連及草、紫兰根。

【主要产地】陕西、浙江、江西、安徽、江苏、福建、云南、四川、湖北等地。

【药用部分】本品是兰科多年生草本植物，入药用其干燥的块茎。全形略扁平，有叉状或爪状分叉，先端渐尖，微向下弯，长约7分至1寸余，厚约2—3分，外表呈灰黄色或黄白色，微有细致纵横的皱纹，块茎的顶部有茎的残基，微凸起，四周有根痕，质坚硬；断面为黄白色，微透明而有粘性。



图54 白芍

左、白芍原植物；右、药用部分外形：1. 爪状分叉，2. 茎的残基，3. 根痕。

【炮制】原药蒸软后，切片晒干，生用或研末用。

【性味和归经】味苦，性平无毒。入肺经。

【应用】本品能补肺止血，散瘀生新，疗疮止痛。主治衄血、恶

疮败疽、肺癰咳嗽、腸热下血、刀伤破損、扑伤疗肿等症。外敷治金疮癰肿，湯火伤等。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】白芨苦平，补肺生肌，定痛止血，散瘀消肿。

【配伍】配茵陈、梔子、甘草、黃連、防风、杏仁、阿膠（白芨散），治肺伤喘息，鼻流膿涕；配桔梗、枇杷叶、牛蒡子、川貝母、參三七，治咳嗽鼻流膿血；配金銀花、穿山甲、乳香、皂角刺，治癰疽疔疮、乳癰；配煨石膏，外用治刀斧破伤。

【附方】白芨散（蕃牧纂驗方）：治馬因踏虛、閃着筋骨、腰膀等处肿痛。

白芨 朴硝 木鼈子 芸苔子 苦葶藶 白芥子 川大黃
白蘇

共为末，用醋調裹痛处。

側柏叶（本草經）

【別名】扁柏叶、柏叶。

【主要产地】我国各地都有出产。

【药用部分】本品是松杉科（亦作柏科）常綠乔木側柏树的細枝及叶。干燥叶为細小鱗片状，生长在扁平的細枝上，排列紧密，寬約半分，有很多的分枝，外表呈綠褐色或灰綠色，質脆易碎，富有濃烈的香气。

【炮制】原药去梗，生用，或炒炭用。

【性味和归經】味苦澀，性微寒无毒。入肺、肝、大腸三經。

【应用】本品能清熱涼血，滋陰止血。主治吐血、衄血、下血、

尿血、风湿痹痛等症。对于无湿热者忌用。

【用量】馬和牛4錢至1兩；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】側柏叶寒，滋阴凉血，善止鼻衄，疗二便血。

【配伍】配生地黃、牡丹皮、白芍、黃芩、甘草(江西)，治牛鼻出血；配伏龙肝、桑白皮、椿白皮，可治泄瀉。

【附方】治牛尿血方(浙江)。

側柏叶 金銀花 梔子 蒲黃 阿膠 白扁豆 黃連 白茅根 血余
共煎水灌服。

茜草 (本草經)

【別名】血見愁、風車草、小活血、染緋草。

【主要产地】江苏之南京、鎮江、江浦，河南之禹县，陝西之宝鸡，以及江西、福建、安徽、山西等地。

【藥用部分】本品是茜草科多年生蔓狀草本植物，入藥用其干燥的須根。为細长圓柱形，显不規則的弯曲，頂端較粗大，有数个莖的殘基，下部有很多須根，全长約8寸至尺余，外表呈紫褐色或灰褐色，質硬而脆，容易折断；断面显淡黃赤色而較平坦。

【炮制】原藥洗去泥土，以水湿透后切片，晒干生用或炒炭用。

【性味和归經】味苦，性凉无毒。入肝經。

【应用】本品能退热凉血，生新止血，去瘀补中。主治心虛惊悸、腎虛尿頻、下血、瘀血、骨节疼痛、跌打損伤等症。对于尿瀉者忌服。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和猪2錢至4錢。

【附歌】茜草苦凉，解热凉血，去瘀生新，惊悸最捷。

【配伍】配地榆、黄芩、黄连，治肠热下血；配乳香、没药、桃仁、红花，治跌打损伤、肢节疼痛。

【附方】茜草活血散（四川）：治牛尿血及腰痛。

茜草 炙香附 川牛膝 补骨脂 續断 盐杜仲 全当归
木通 川芎 車前子 白茯苓 蚯蚓

共研細末，开水冲服。

按：茜草能凉无病之血，行已伤之血。主治衄血、下血、跌打损伤、骨节疼痛等症。时珍說：“通經脉，治骨节风痛，活血行血。”仲醇說：“本經言治疸；夫疸有五，此其为治，盖指蓄血发黄，而不专于湿热者也。瘀者血病，行血軟坚，則瘀自愈。”

地榆（本草經）

【别名】地于、酸赭、玉札。

【主要产地】广东、湖南、湖北、江西、江苏、广西、安徽、甘肃、浙江、陕西、河北等地。

【药用部分】本品是蔷薇科多年生草本植物，入药用其干燥的根。根略呈圆柱形，长约2至7寸，粗约3至5分，根头带有殘莖，作不整形的弯曲，下部多数分支，外表为深褐色或褐色，有断續不整的縱皺及少数横綫，質地坚韧，不易折断；断面为纖維性，呈淡黄褐色或淡黄赤色。

【炮制】原药用清水浸潤3至4小时，滤出，以湿布复盖悶透，切斜片或横切片，晒干，生用或炒炭用。最好在采取后乘新鮮洗淨泥土及除去須根后，就进行切片晒干，这样可以减少人力和浸潤的时间，同时亦易于干燥。

【性味和归經】味苦，性微寒无毒。入肝、腎、大腸、胃四經。

【应用】本品能收斂止血，涼血止痛。主治产后发热、血痢、衄血、尿血等症。外用治火伤。对于虛寒血症及下痢初期忌用。

【用量】馬和牛4錢至1两；羊和猪1錢至4錢；兔和鷄3分至6分。

【附歌】地榆苦寒，收斂止痛，鼻衄血痢，血热堪用。

【配伍】配白芍、烏梅、槐花米、蓬大海、黄芩、梔子、炒蒲黄、生地炭、焦山楂、砂仁、广木香、陈皮、茯苓、百草霜（河南），治馬牛下痢帶血；配牡蠣、車前子，治尿血；配槐花、防风、荆芥、厚朴、黄連、車前，治痢疾。

烏賊骨（本草經）

【別名】海螵蛸、墨魚骨、木魚骨、烏鰂骨。

【主要产地】福建、广东、浙江、江苏、山东等地的沿海地区。

【药用部分】本品是烏賊科軟體动物墨魚的骨質。干燥骨呈扁平椭圆形或长椭圆形，中間膨大，兩端較尖，長約4—5寸，寬約1



图55 地榆

左、地榆原植物；右、药用部分外形。

寸半至2寸。外表呈类白色，有角質化菲薄的邊緣，显黃白色，背面微隆起，被有坚硬的石灰質層，表面密布着顆粒状突起，腹面平直，質輕脆而疏松，折断面为白色。

【炮制】除淨皮肉和角質物，漂洗，晒干，炙酥用或研末用。

【性味和归經】味咸，性温无毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能通經絡，祛风湿，明目退翳，收瀉止血。主治疮瘍、目生翳膜、鼻衄、大腸下血、金疮出血、赤白帶等症。

【用量】馬和牛5錢至2两；羊和猪2錢至4錢。

【附歌】烏賊骨咸，收斂止血，明目退翳，风湿可祛。

【配伍】配冰片，治目翳；配白矾、乳香，治瘙痒不安。

血余（別录）

【別名】髮、人头髮、頭髮灰、血余炭。

【药用部分】本品是人的頭髮。炭呈焦炭样未定形塊，外表呈黑色而有光澤，滿布着大小的孔洞，質硬而脆，其碎屑內閃亮发光。

【炮制】将人头髮揀去雜質，放开水內，加石碱少許，泡去油腻，濾出，再放入清水內漂两天，晒干放鍋內，上以鉄鍋盖紧，四周用泥封固，勿令泄气，上盖之鍋底中放米少許，用文火緩緩燒至鍋底米成黃色为度。放冷，研末用。此外也可用紙包好，外裹以黃泥燒之，然后去泥研末用。

【性味和归經】味苦，性微温无毒。入心、肝、腎三經。

【应用】能消瘀止血，滋阴退热，通利二便。主治衄血、血痢、尿血、大小便不利等症。如配葯煎膏外用，可涼血生肌；燒灰吹鼻能止衄血。

【用量】馬和牛3錢至1两；羊和猪1錢至3錢。

【附歌】血余苦温，滋阴退热，治痢除淋，止血堪用。

【配伍】配滑石，治小便不利；配人中白、麝香，可治鼻衄；配焦蒲黄、焦柏叶、焦地榆、焦荆芥穗、焦黄柏，治血痢。

【附方】血余散（河北）：治马劳伤肺喘、呼吸困难。

血余 香油 蜂蜜 鸡蛋清 枯矾

以香油将头髮炸焦，同枯矾研成细末，再加鸡蛋清、蜂蜜混合灌服。

按：血余即人的头髮，因油垢甚多，故用时应以皂角水浸洗去其油垢使用。入药必须烧灰用或炒焦用，否则容易引起误嚥，产生不良的后果。此外，也可外敷疮肿。

藕节（本草经）

【主要产地】我国东南各省均有出产。

【药用部分】本品是睡莲科多年生草本植物莲的地下藕节。干燥品呈扁圆柱形，中间较细，其横切面中央有1个圆孔，边缘有9个孔，为放射形排列。节部直径约5分至寸余，节长约3—4分，外表呈暗褐色或紫褐色，有少数残留须根及根痕，横切面显黄白色，为粉质。

【炮制】削去须根，洗净泥土，晒干，生用或炒炭用。

【性味和归经】味涩，性平无毒。入心、肝、胃三经。

【应用】本品能化血止血，解热毒。主治咳血、衄血、尿血、血痢等症。

【用量】马和牛6钱至2两；羊和猪2钱至4钱；兔和鸡5分至1钱。

【附歌】藕节涩平，能解热毒，衄血尿血，血痢亦效。

【配伍】配益母草，治胎衣停滞；配生地黃、白茅根，治衄血；配地榆、車前、黃連，治血痢。亦作为引药用。

【附方】(1)治牛赤痢方(河南)。

当归 川芎 枳实 陈皮 荆芥炭 地榆炭 車前子 木通
滑石 茯苓 澤泻 黃連 生地炭 甘草 藕节
上药煎水灌服。

(2)治鼻衄方(陕西)。

生地黃 白茅根 焦山梔 生柏叶 天門冬 茜草根 甘草
鮮藕节
上药研成粉末，水冲灌服。

石灰 (本草經)

【主要产地】我国各地均产。

【药用部分】本品是石灰石封密中，經焚燒而制成的灰質。純粹的石灰，为白色的粉末或成塊，受大热亦不熔解，但发猛烈的白光，露置空气中，則漸漸风化，若注水于塊，則发热消化而崩坏。入药用风化而不夾細石者为良。

【炮制】將新燒石灰置金屬类鍋中，用清水傾在上面，即发霧生热，待其霧已散，則盖其鍋，待冷后，用鉄絲篩篩去雜質即成。

【性味和归經】味辛，性温有毒。

【应用】本品能生肌，杀虫，止血，消脹，散血定痛。主治肚脹腹痛、疽瘍疥癩、恶疮、金疮出血、黃牛和羊飲人尿中毒、水瀉血痢等症。在潮湿的地方，撒布石灰粉，有消毒与干燥的效用。

【用量】馬和牛 3 錢至 1 两；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 1 分至 3 分(制为石灰水用)。

【附歌】石灰辛溫，杀虫止血，疥癩腫毒，清熱有功。

【配伍】配血余炭、黃丹、瀝青等（駝經），外用治漏蹄；配硫黃，食鹽、百部等，治疥癩；配大黃等，用于創傷出血。

【附方】天疥癩軟膏（江西）：治家畜疥癩。

硫黃 食鹽 石灰 百部末 豬油

上藥共制成軟膏，塗搽患處。

按：石灰水制酸力很強，據南方各省民間醫生經驗，解牛飲人尿中毒效果良好。

表 31 理血藥歸納簡表

分 類	藥名	性 味 和 歸 經	功 用	用 量 (錢)		
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄
行 血 藥	荆山稜	苦平，入肝、脾	破血行氣，消積止痛	5—20	2—4	0.6—1
	莪 朮	苦辛溫，入肝經	行氣破血，消積化滯	5—20	2—4	—
	姜 黃	辛苦溫，入脾、肝	行氣破瘀，消腫止痛	5—15	1—2	0.2—0.5
	郁 金	苦辛甘寒，入心、肺、肝	破瘀行氣，開郁止血	5—15	1—4	0.1—0.5
	延胡索	辛苦溫，入肺、肝、脾	活血利氣，散瘀止痛	4—10	1—3	0.2—0.6
	川 芎	辛溫，入肝、胆、心包	順氣行血，破瘀養新	5—15	1—2	0.2—0.5
	丹 參	苦微寒，入心、肝	益氣活血，去瘀止痛	5—12	1—4	0.2—0.6
	赤芍藥	酸苦微寒，入肝、脾	散瘀活血，清熱消腫	5—15	1—4	0.2—0.6
	蒲 黃	甘平，入肝、脾、心包	行血消瘀，破血止血	5—10	1—4	0.2—0.5
	五靈脂	甘溫，入肝經	行瘀止痛，解毒治痢	5—16	2—4	—
藥	沒 藥	苦平，入肝經	散血行氣，止痛消腫	4—10	1—2	0.2—0.5
	乳 香	苦辛溫，入心、肝、脾	活血止痛，消腫舒筋	5—15	1—2	0.2—0.5
	牛 膝	苦酸平，入肝、腎	破血行瘀，除濕治痹	5—10	2—4	—
	紅 花	辛溫，入心、肝	破血活血，消腫止痛	3—10	1—2	—

(續上表)

分 类	药名	性味和归經	功 用	用 量(錢)		
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄
行 血	桃 仁	苦甘平,入心、肝	破血行瘀,潤燥滑腸	4—10	1—3	—
	益母草	辛苦微寒,入心包、肝	去瘀生新,活血养胞	5—15	1—4	0.2—0.5 (兔)
	血 竭	甘咸平,入心包、肝	散瘀生新,活血止痛	4—6	1—2	—
	行 芸苔子	辛温,入肺經	破气行血,散結消腫	5—20	2—4	—
	澤 兰	苦微温,入脾、肝	行血破瘀,散肿舒肝	4—15	1—4	0.2—0.5
	水 蛭	咸苦平,入肝、膀胱	破瘀散結,解毒消腫	3—5	0.5—1	—
	苏 木	甘咸平,入心、肝、脾	行血祛瘀,消腫止痛	5—10	1—2	—
	刘寄奴	苦温,入心、脾	破瘀行血,消腫止痛	5—15	2—3	0.4—0.8
	自然銅	辛平,入肝經	散血止痛,續筋接骨	5—15	2—3	—
	穿山甲	咸微寒,入肝、胃	散血通絡,攻疔排膿	4—10	1—3	—
药	馬鞭草	苦微寒,入肝、脾	破血消脹,杀虫疗癰	5—20	1—3	—
	酒	苦甘辛大热,入十二經	和血通絡,发散风寒	20—80	8—20 (羊)	—
	醋	酸苦温,入肝經	散瘀消腫,下气消脹	20—160	4—10	0.5—2
	紅 糖	甘温,入脾、胃	活血消食,止咳止痢	5—20	2—4	—
止 血	参三七	甘微苦温,入肝、胃	行瘀散血,消腫止痛	3—10	—	—
	仙鶴草	苦澁微温,入肺、脾、胃、大腸	补虛止血,收斂治痢	5—20	2—4	0.3—0.5
	止 白 芨	苦平,入肺經	散瘀止痛,补肺止血	6—20	2—4	0.2—0.5
	側柏叶	苦澁微寒,入肺、肝、大腸	涼血止血,清熱滋陰	4—10	1—3	0.2—0.5
	茜 草	苦涼,入肝經	去瘀止痛,退熱止血	5—20	2—4	—
	地 榆	苦微寒,入肝、腎、大腸、胃	收斂止血,涼血止痢	4—10	1—4	0.3—0.6
	烏賊骨	咸温,入肝、腎	收斂止血,明目退翳	5—20	2—4	—
	药 血 余	苦微温,入心、肝、腎	消瘀止血,滋陰退熱	3—10	1—3	—
	藕 节	澁平,入心、肝、胃	化血止血,清熱解毒	6—20	2—4	0.5—1
	石 灰	辛温	止血消脹,解毒杀虫	3—10	1—2	0.1—0.3

第八章

芳香开窍药

凡具有芳香气味、能开窍行气、辟穢攻邪的药物，就称为芳香开窍药。

本章药物主治神志昏迷的急症。神志昏迷可由高热、风痰壅塞、气滞郁结等许多原因所引起，亦可因大汗、大下、大吐、大失血、气衰等而产生。前者属于实症的闭症，可应用开窍药来救急，待患者回苏后，再随症用药；后者属于虚症，则禁用开窍药，否则，因元气大衰，将有造成虚脱的危险，应加注意。

本章药物如菖蒲、麝香、牛黄等，早为“神农本草经”所收载，作为药用。这类药大多数为芳香辛温，主入心、肝、肺三经，能调运气血，故能开窍，若配合得当，则功效更大。由于它们是芳香性的，遇热则气味容易消散，故不适于做成煎剂应用，亦不宜于长期服用。兹将各药分别叙述如下。

麝香（本草经）

【别名】当门子、元寸、元寸香。

【主要产地】本品主产于四川、云南、西藏、甘肃、宁夏、蒙古等

地，以云南产者为佳。我国麝香产量占全世界第一位。

【药用部分】本品是鹿科动物雄麝的麝香囊分泌物。所谓麝香囊乃雄麝脐部与阴莖之間皮內的一个腺囊，外有一層囊膜包之，称为香脐。全体呈椭圆形，直径約1寸多，中心有小孔，因多被填塞，故不显著，若割破皮膜，露出内部赤褐色的麝香，是柔软油潤顆粒状物，俗称散香，內中有时出現大顆粒者，俗称当門子。近嗅有恶臭，远嗅則极芳香。

麝香的真伪辨認法：取出麝香少許，用手捻之，如系真品，則富彈性而柔軟，揉之可成团，按之又成粉，如系伪品，則能揉搓成条，沒有彈性。

【炮制】剝去外皮，微研用。

【性味和归經】味辛，性溫無毒。入十二經。

【应用】本品能通關竅，開經絡，鎮心，安神，祛風。主治惊癇、心腹暴痛、昏迷、風痰、跌打損傷等症，外用可消瘡腫。因香竈耗氣，陰虛患畜和孕畜禁用。

【用量】馬和牛2分至1錢；羊和猪5厘至4分。

【附歌】麝香辛溫，通竅除風，昏迷暴痛，立即見功。

【配伍】配瓜蒂、藜蘆、半夏、胡椒、皂角等，共研為末吹鼻，治馬傷水；配谷精草、細辛、胡椒、瓜蒂、皂角等，共研為末吹鼻，治馬起臥症；配瓜蒂、硃砂、雄黃、青黛、皂角炭，共為末吹鼻（麝香散），治馬中風；配牛黃、雄黃、蟾酥、珠粉、冰片（雷氏六神丸），治咽喉腫痛。

【附方】麝香散（四川）；治牲畜扭閃跌傷。

麝香 梅片 乳香 沒藥 紅花 孩兒茶 硃砂 當歸尾
共為細末，沖酒灌服。

按：麝香味辛性溫，氣味芳烈，能通行十二經，開關利竅，無處不到，例如邪風入心，頃刻痰迷心竅，關竅閉塞，患畜眼翻口歪，肢軟無力站立，僵仆昏地不起，此時若用麝香香竅之性，自內達外，開通閉塞，即可邪出心清。因此，凡中惡昏迷、驚癇、風痰、竅閉不清之症，及跌打瘀血停積疼痛，癰瘡初腫，都能治之。但香竅走散，易于耗血傷陰，故患畜陰虛、胎娠者忌用。

菖蒲（本草經）

【別名】石菖蒲、九節菖蒲、菖蒲根、昌陽。

【主要產地】主产于浙江、江蘇、江西、四川、山西等地。

【藥用部分】本品是天南星科多年生草本植物，入藥用其干燥的根莖。菖蒲的品種很多，一般可分為石菖蒲、九節菖蒲和鮮菖蒲三種，茲將其藥用部分，分述如下：

石菖蒲：其干燥的根莖，長約5—6寸，闊約3分左右，呈扁圓形，多節，外皮為赤褐色，有微細的縱皺，根莖的下面，有時殘留短根或根的痕跡，質堅而體輕，折斷面呈粉白色，中心柱帶淡褐色，有特殊的刺激氣味。

九節菖蒲：根莖瘦小，長約7—8分至1寸，呈長圓形而兩端漸細，根節上光而無毛，結節明顯，外表呈棕黃至橙黃色，折斷面呈白色，多粉質，品質較好。

鮮菖蒲：亦稱鮮石菖蒲，江南多野生，葉叢生，狹長而細，可達尺許，其根莖長約3寸至6寸，有分根，根莖上的節，類似九節菖蒲，全草都可供藥用。

【炮制】石菖蒲可切片用或炒用；九節菖蒲原藥用；鮮菖蒲隨用隨取。



图 56 菖 蒲

左、石菖蒲原植物；中、石菖蒲药用部分外形：1.节，2.根的痕跡；
右、九节菖蒲药用部分外形：1.节，2.根的痕跡。

【性味和归經】味辛苦，性温无毒。入心、肝二經。

【应用】本品能开心孔，通窍，宣气逐痰，健脾行滞，解毒杀虫。
主治惊癇、癲狂、风寒湿痹、昏迷、咳逆上气、脾虚胃弱等症；外用可
治疥癬。

【用量】馬和牛 7 錢至 2 两；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 3 分
至 5 分。

【附歌】菖蒲辛温，通窍行滞，惊癇湿痹，杀虫治癬。

【配伍】配淡竹叶、葛根、郁金、蒼朮、綠豆等，治牛癲疫、头晕
肚痛。

【附方】(1)健脾散(元亨疔馬集):治馬患脾氣痛。

菖蒲 白朮 當歸 甘草 砂仁 澤瀉 厚朴 官桂 青皮
陳皮 干姜 白茯苓 五味子

上藥為末,姜、鹽、酒調煎沸,揚去火氣,帶熱灌之。

(2)菖蒲散(安驥藥方):治馬哮喘多驚、咽喉不利及吐涎沫鼻濕病。

遠志 人參 茯苓 地骨皮 谷精草 荊芥 薄荷 白礬
菖蒲

上藥為末,以蜜為引,沸湯浸,放溫,草后灌之。

按:菖蒲最早記載于“神農本草經”,一般多生長于泥溝地或人工栽培,所以又稱為泥菖蒲或家菖蒲。石菖蒲系記載于“本草綱目”,多生長于山谷溪澗的石頭上,所以又稱為石菖蒲。

菖蒲味辛苦,性大溫,能通利心、肝、脾三經。苦可燥濕,溫能辟寒,辛散邪結。由于風寒濕三邪痹症,多發生于四肢,而脾主四肢,因氣厚發熱能溫脾胃,脾濕既祛,故四肢濕痹自愈。

牛黃(本草經)

【別名】西黃、丑寶、心黃。

【主要產地】我國西北、東北、華北各地都有出產。

【藥用部分】本品系牛膽囊中的結石。呈卵圓形或橢圓形,大者如雞卵,小者如豆粒,外表呈淡黃褐色,或金黃色,平滑而有光澤,質輕而易破碎,斷面為黃褐色顆粒性,系由薄層重疊積累而成,易剝離,并常有灰白色小凹點,其氣清香,味微苦,入口則粘舌不落,質脆而不粘牙。進口的牛黃,品質較差。

【炮制】研成粉末,作丸散用,或外用。

【性味和归經】味苦，性平有小毒。入心、肝二經。

【应用】本品能开窍定惊，清热化痰，解毒。主治神志昏迷、痰迷癲癇、邪热狂乱、疔疮等症。对于无热和孕畜禁服。

【用量】馬和牛5分至2錢；羊和猪5厘至3分。

【附歌】牛黄苦平，开窍定惊，邪热疔疮，癲癇亦灵。

按：牛黄是牛胆囊中凝結的黄塊結石，性味苦平，功能与麝香相似，具有芳香开窍作用，往往二药同用于神昏窍闭的患畜。但二药又有显著的差别。牛黄偏凉而清热，麝香偏温而走窜，故麝香长于宣通經絡，缺乏清热的功能，而牛黄则有清热解毒作用，对癰肿疔毒，特别是对于咽喉口舌之間的肿痛或腐烂，功效甚佳。但因名贵价高，故兽医少用。

皂角（本草經） 附：皂角刺

【别名】皂莢、大皂。

【主要产地】我国各地都有出产。

【药用部分】本品是豆科落叶乔木皂角的干燥果实，种子和棘刺（皂角刺）亦作药用。

干燥成熟的皂角呈扁平长椭圆形，稍有弯曲，先端与基部略尖，长约8寸至9寸，宽约1寸左右，其果皮外層硬而脆，內層多纖維而不易折断，內藏有棕黑色的种子多粒，平滑光澤，皮厚而坚硬。經炒后則放出特殊气味。

皂角刺：呈細圓錐形，多分枝，长2至5寸，粗1至2分，其先端尖銳，外表呈紫褐色，內部为淡褐色。

【炮制】刷淨泥灰，煮熟，剝去硬皮，取肉，晒干用。如欲研末和作丸散，則煨存性用。皂角刺則切成斜片生用，或酒炒用。

【性味和歸經】皂角味辛咸，性溫有小毒、入肺、大腸二經。

【應用】本品能通竅，祛風痰，緩和五臟郁結，消脹殺蟲，下胞衣。主治胸膈脹滿、腹中堅痛、咳壅痰涎、中風口禁、咽喉痹塞、四肢發冷等症。但胎妊忌服。皂角刺能治惡瘡腫毒（破潰瘡禁用）。

【用量】馬和牛 3 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 2 錢。

【附歌】皂角辛溫，通竅散風，消脹化痰，刺治瘡腫。

【配伍】配牽牛子、郁李仁、芫花等，治馬糞結。

【附方】(1)治馬糞結方（農政全書）。

皂角燒存性用 大黃 枳殼 麻子仁 黃連 厚朴
共為末，清米泔調灌。若腸突出則加蔓荊子末同調。

(2)豬吹鼻藥方（廣西）：治豬不食消。

皂角 細辛 花椒 雄黃

共研成細末，用瓶裝好密封，勿使走氣。用時以藥粉盛入竹筒內或噴射筒內，吹入病豬鼻中。

按：皂角味辛散，其性暴烈，用吹喉鼻，則能通上下竅，如入腸胃，則理風濕痰喘，消脹殺蟲；如塗肌膚，則清風去癢，散腫消毒。皂角種類很多，形如豬牙者，稱為牙皂，功用稍有不同。皂角治濕痰較好，牙皂治風痰更佳。皂角刺，氣味辛溫，功效和主治略同皂角，主作外用，可直透患處、潰散癰疽及惡瘡。又皂角子煨存性用，可治大便燥結。

蟪蛄（衍義）

【別名】虫蘇。

【主要產地】河北、山東、江蘇、江西、四川等地，其他各省亦有

出产。

【药用部分】本品是蟾蜍科动物（蟾蜍俗称癞虾蟆）皮肤腺体的毒液，經加工制造而成。成品一般可分为东酥、片子酥、棋子酥三种，分述如下：

东酥：一般呈圆形餅状而边缘較薄，中央較厚而有孔，上面凸起，下面凹入，直径約 2 寸至 3 寸，全体呈茶褐色，如角質而不透明，嚼之則辛辣刺舌，微有特殊臭气。

片子酥：为圆形淺盘状而边缘高起，中央平坦，直径約 1 寸至 3 寸，全体呈茶褐色或紅褐色，如角質而半透明，質堅而脆，味同东酥而无臭气。

棋子酥：为扁圆形，状如圍棋子，直径 7 分至 1 寸，呈黑褐色，如角質而不透明，臭味同于东酥。

【炮制】将蟾蜍洗淨，用竹片括取眉角上的白浆，放在磁器里，（忌用鉄器，因浆遇鉄即变成黑色），立即进行加工，篩滤后涂在玻璃板上（片子酥）或特制的銅圈內（东酥）晒干，撕下即成，可以研末用或酒化用。

·【性味和归經】味辛，性温有毒。入胃經。

【应用】本品能解毒、散肿、止痛、利水、发汗。主治疮黄疔毒、咽喉肿痛、破伤风等症。但多作外用，內服以少量为宜。

【用量】馬和牛 5 分至 1 錢；羊和猪 5 厘至 3 分。

【附歌】蟾酥辛温，解毒止痛，能消諸黄，又止肿痛。

【配伍】配百草霜、雄黄、人中白、硼砂、明矾（吹喉散），治咽喉肿痛。

【附方】蟾酥 牛皮胶 米醋

上药入鍋內溶化，涂于疮黄的周圍。

樟腦（綱目） 附：樟葉

【主要產地】貴州、浙江、四川、福建、江西、廣東、廣西、台灣、安徽、雲南等地。

【藥用部分】本品是樟科常綠喬木樟樹的木部用升華法制得。精製品是白色透明的塊片或粗末。不易研成粉末，在空氣中則揮發，有濃烈甯透性氣味。

樟葉：單葉互生，為卵狀橢圓形，或卵圓形，系草質，前端急尖，全緣，基部鈍圓形，葉面深綠色，有光澤，葉背粉綠色，近基部出有三脈，中央主脈的側脈有3至4對，在主脈與側脈交互處，有小點隆起，即油腺點，葉柄與莖同色。

【炮制】原藥研末用（應加少量白酒），樟葉則用手揉軟後生用。

【性味和歸經】味辛，性熱無毒。入脾、胃、心三經。

【應用】樟腦能通關竅、利滯氣、殺蟲。主治中惡邪氣、腹痛、腹脹、濕毒瘡癢等症。

樟樹葉能利滯氣。主治宿食不消、臃脹、泄痢、胎衣不下等症。牛過食紫雲英（紅花草）所引起的臃脹，可用鮮葉搓軟分次塞入口中，使嚥下，效果佳良。

【用量】樟腦：馬和牛2錢至5錢；羊和豬4分至1錢；兔和雞1分至2分。

【附歌】樟腦辛熱，通竅利氣，胸腹痛脹，殺蟲除癢。

【配伍】配土鼈、蘇木、虎骨、當歸、紅花、木瓜、牛膝、蜈蚣、斑蝥、紅娘子、全蠍、白酒（甘肅），治骨節風濕、腰膝疼痛（外擦）。

【附方】治家畜因破傷生蛆方（河北）。

樟脑 冰片 硃砂 明矾 雄黄

共为細末，用香油調用。

冰片（唐本草）

【别名】龙脑香、龙脑、片脑、梅花片。

【主要产地】广东、南洋等地都有出产。

【药用部分】本品是龙脑香科乔木龙脑树的树脂经过提炼后的結晶塊片。呈灰白色，味芳香而辛涼。大如麦片者，称为大梅片，其色較白，有光澤；稍小的称为二梅片；細微如粟粒状的称为三梅或四梅，呈灰白色，气味較差。

此外，还有一种菊科植物大风艾，可提炼梅片。

【炮制】原药研末用。

【性味和归經】味辛苦，性微寒无毒。入肺、心、肝三經。

【应用】本品能通諸窍，散郁火，去翳明目，消肿止痛。主治心惊悸、风涎閉塞、惊癇痰迷、目赤翳膜、喉痹咽肿等症。如无实邪者禁用。

【用量】馬和牛 1 錢至 2 錢；羊和猪 3 分至 5 分。

【附歌】冰片辛寒，通窍散热，喉痹咽肿，目赤点眼。

【配伍】配硃砂、硼砂、元明粉等，吹敷患部，可治喉痹咽肿；配爐甘石、硼砂、銀珠、硃砂、熊胆、礞砂（退云散）用于点眼，可退翳明目。

按：冰片辛寒，气味芳烈，功能通窍散热止通。繆希雍說：“龙脑本經味辛苦，气微寒无毒，其香为百药之冠。凡香气之甚者，其性必温热。……气芳烈，味大辛，阳中之阳，升也散也。性善走窜开窍，无往不达，芳香之气，能辟一切邪恶。”

表 32 芳香开窍药归纳简表

药名	性味和归经	功用	用 量 (錢)		
			馬 牛	羊 猪	兔 鷄
麝香	辛温,入十二經	通关窍,开經絡	0.2—1	0.05—0.4	——
菖蒲	辛苦温,入心、肝	通窍健脾,惊癇湿痹	7—20	1—2	0.3—0.5
牛黄	苦平,入心、肝	开窍定惊,清热化痰	0.5—2	0.05—0.3	——
皂角	辛咸温,入肺、大腸	通窍散风,消脹化痰	3—10	1—2	——
樟脑	辛温,入胃經	拔毒止痛,消黄散肿	0.5—1	0.05—0.3	——
樟脑	辛热,入脾、胃、心	通窍利气,治疮杀虫	2—5	0.4—1	0.1—0.2
冰片	辛苦寒,入肺、心、肝	通窍散热,去翳消肿	1—2	0.3—0.5	——

第九章

祛寒藥

凡藥性溫熱，而具有祛除寒邪的功效者，稱為祛寒藥或除寒藥。

當寒邪侵襲致使畜體受傷時，一般有表、里的區別，如寒傷于表，即所謂傷寒表証，這時以用解表藥使其表邪發散為宜；如寒傷于里，常發生腸鳴泄瀉以及胸腹疼痛等症，這時可用祛寒藥以解除體內陰寒為宜。當體內陰寒極盛時，必然會引起陽衰，而陽衰則可能引起虛脫的後果。所以祛寒藥，也有宣陰助陽的作用，它不僅可防止脾腎陽衰，並且兼有理氣的作用，以使氣機通暢。由於本類藥物，性多溫熱燥烈，能傷陰灼津，故對於熱性病和陰虛者，宜禁忌應用。茲將比較常用的祛寒藥，分述于下。

肉桂（別錄） 附：官桂、桂心

【別名】桂皮、安桂。

【主要產地】廣東、廣西、雲南等地。

【藥用部分】本品是樟科常綠喬木，入藥用其樹干皮。乾燥的桂皮，多截成尺余的段落，兩邊向內卷曲，形成半筒形或板狀，粗約

1寸至2寸,厚約半分至1分;外表面呈赤褐色或灰褐色,較粗糙,內表面呈淡赤褐色或黃褐色,較平坦光滑;質硬而不易折斷,富有濃烈的芳香氣味。

肉桂是近樹根處的最厚樹皮,以無白斑、油質重、氣味濃厚者為佳;如干燥、油少而帶澀味者,品質較次。

官桂是皮薄色黃而少脂肉的桂皮。桂心,是去其外層之粗皮與內面之薄皮,而取中心者,又名中桂。條桂是樹枝的皮條,多卷成筒狀,其枝皮較薄,又名薄桂。蒙自桂,系產於雲南蒙自縣者,故名。



圖57 肉 桂

左、肉桂原植物； 右、肉桂皮的外形。

【炮制】將原藥刮去外層粗皮,刷淨,切成薄片,陰干用或研末用。

【性味和歸經】肉桂味辛甘,性大熱有小毒。入脾,腎二經。桂

心性味同于肉桂。入心、脾二经。官桂味较薄而性温。入肝、脾二经。

【应用】肉桂能补命門相火，除寒温中，止泻，逐沉寒痼冷，活血止痛，并能宣导諸药。主治脾胃虚寒、伤水冷痛、血脉不通、腰脊痹痛、四肢厥冷、肠冷泄泻、小便不利、癰疽疮疮下陷、阳萎精滑、下焦沉寒，死胎不下等症。

官桂主治上焦有寒，常用以调冷气。桂心多作为活血、补阳药。对于阴虚而阳盛者，以及孕畜忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两；羊和猪 1 錢至 3 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】肉桂辛热，善通血脉，温中逐寒，腰脊痹痛。

【配伍】配厚朴、当归、細辛、治冷伤脾泄。忌与生葱及石脂同用。

【附方】(1)桂心散(元亨疗馬集)：治馬飲冷过多，伤脾作泻。

桂心 厚朴 当归 細辛 青皮 牵牛子 陈皮 桑白皮
上药为末，童便为引，加温水调灌之。

(2)桂心散(元亨疗馬集)：治馬患吹颞(即乳头肿)。

桂心 牛蒡子 甘草炙

上药为末，猪脂細切、酒同煎，候温灌之。

按：肉桂辛甘大热，属純阳之药。因其气味清揚，有鼓舞血气之功，所以能补命門相火，温中逐寒，而又能窜上达表以通营卫。主治寒痰冷涎、心腹冷痛、腰脊痹痛、四肢厥冷等症。

肉桂既能通血脉，故能宣导諸药。但应用时多与他药配伍，如配吳茱萸、干姜、附子、党参，可治鼻冷、腹内冷痛及元气虚弱，配当归、牛膝、生地黄、乳香、沒药、桃仁，可治跌扑损伤及瘀血凝滞的

疼痛。

肉桂、附子性味功用基本相同，都能治下焦沉寒痼冷。但肉桂偏于血分而令汗出，故汗出亡阳之症不用；附子的作用，則偏于气分，对于汗出亡阳时，則用附子而不用肉桂。这就是二者的区别。

附子（本草經）

【别名】附片、白附片、黑附片、黄附片。

【主要产地】主产于四川、貴州、陝西等地。其他各处野生者亦多。

【药用部分】本品是毛茛科多年生草本植物，系烏头根旁附生的子根。一般經加工而切成厚片，規格不一：白附片色白而略透明；黑附片是不刮皮的附子切成的厚片，外皮呈黑褐色，內面为黃褐色；黄附片是刮去皮的附子切成的厚片，外表呈黃色。

【炮制】采收洗淨后，浸于盐水中，然后再按下述方法制为成品。生用有毒，应加注意。

白附片：先以盐附子用沸水煮約5—6分鐘，再用清水漂3至4小时，即可取出刮去外皮，切成薄片，再以清水漂之，每日換水一次，三日后濾出蒸約1小时半，然后晒干，以硫黃火熏成白色即成。

黄附片：选盐附子之圓大者，入沸水煮約半小时，撈出倒入清水內漂6小时，去皮，切片，再加入甘草、姜黃、童便，在清水內浸2至3日，然后再漂淨、蒸熟、烘干即成。

【性味和归經】味辛甘，性大热有毒。通行十二經。

【应用】本品能回阳通脉，温脾和中，逐风寒湿邪。主治表虛大汗、四肢厥冷、伤水冷痛、冷腸瀉、胃寒草少、风寒湿痹、拘攣疼

痛、水肿等症。妊娠忌服。

【用量】馬和牛4錢至1兩。

【附歌】附子辛热，逐风寒湿，温脾和中，回阳救逆。

【配伍】配桂枝、白朮、甘草，治汗出恶风；配肉桂，入命門益相火；配人参，能挽救散失之元阳；配生姜，能发散在表风寒；配白朮，能除寒湿；配甘草，能緩其热性。

【附方】(1)黑神散(司牧安驥集)：治腎冷拖腰。

烏蛇 附子 防风 牛膝 当归

共研末，和酒同服。

(2)治馬伤水起臥方(河北)。

附子 当归 木香 猪苓 澤泻 香附酒炒 茴香 枳实酒炒
厚朴 炮姜 木通 童便为引

共为細末，开水冲，候温灌，忌飲冷水。

按：附子功效甚多，但性热有毒，如果使用得当，收效較快，若是使用不当，則为害亦大。

由于附子功能是补火，所以还須防止涸水，因水涸則火无所附，就可能产生不良的后果，使阴阳俱伤。由此，必先辨清是阳危还是阴涸，如果是阳危則先以附子救其阳，次以地黄、芍药、党参、麦門冬等以滋其阴；若是阴涸則先救其阴，次救其阳，例如真寒假热，虽然皮肤发热，而口渴飲水又不甚急，呼吸正常或緩慢者，則須用附子、干姜、肉桂等救之；若是真热假寒，虽然四肢厥冷，而呼出气臭且次数快，口内发热，粪便燥結者，則不可用附子。元素說：“凡阴症虚阳上浮者，用姜附药宜冷服，热症用凉药可热服，亦有附子中杂凉药以为引者，皆在临症之变化焉。”这都是應該注意的事項。

干姜（本草經） 附：炮姜

【主要产地】見解表藥生姜項下。

【藥用部分】本品是老姜的干燥根莖。外表略扁平、多分叉，橫列如掌，有节，外皮呈灰白色或灰黃色，皺縮，各叉頂端均遺留有莖痕及芽痕，質硬而脆，容易折斷；折斷面顯黃棕色或淡黃色，有姜的特有氣味。

炮姜：是将干姜炮焦者，又称为姜炭，为不規則塊狀物。外表呈黑褐色，粉狀，質輕而易破碎，斷面呈淡黃色或黃褐色，有微弱的特殊氣味。

【炮制】将干姜濕潤切片，晒干生用。炮姜：将干姜濕潤，切成3至5分大小不等的塊狀，用黃土炮焦或炒成炭用。

【性味和归經】干姜味辛，性溫有毒。炮姜：味辛苦，性大熱無毒。入心、肺、脾、胃、腎、大腸六經。

【应用】干姜有散寒溫中，回陽通脈的功用。主治風寒咳嗽，泄瀉腹痛，傷水冷痛，反胃吐食，四肢厥冷，寒飲喘咳，風寒濕痹等症。炮姜：可治胃中寒冷，止泄止血等。

【用量】馬和牛4錢至1兩；羊和猪1錢至3錢；兔和雞1分至3分。

【附歌】干姜味辛，溫中發表，逐寒行血，均有功效。炮姜味苦，除胃寒冷，衄血下血，固守不走。

【配伍】配麻黃、五味子、半夏、細辛等，治寒飲喘咳；配胡椒、茴香、蔥白等，治冷痛。

【附方】(1)治馬冷痛方(內蒙古)。

干姜 古月(胡椒) 燒酒 鹽 蔥白 茴香炒

上药研细，开水冲服。

(3)治馬急性拉稀方(东北)。

干姜 党参 附子 白朮 甘草 桃仁 紅花

共研细末，温开水冲服，忌飲冷水。

按：生姜、干姜、炮姜，三者虽为一物，而在功能上稍有差异。

生姜性温，因體質未收，长于发散，功能温中散寒而止嘔，多用于外感风寒及胃中伤冷等症；干姜性热，因體質收縮，发散力减弱而偏于治里寒之症，故用以祛寒、温中、回阳；炮姜性味变为苦温，故缺辛散作用，专主温里，并有止血功能。因而有“生姜走而不守，干姜能走能守，炮姜守而不走”的說法。

干姜大辛大热，为阳中之阳，故在使用上須根据病情輕重緩急来配伍。如配甘草則性緩而純，配大枣其热則不上行，配伍味子則温肺止咳，配党参則温胃养气。又炮姜止血效果很好，但只适于寒証者，热証則不适用。

吳茱萸 (本草經)

【別名】吳萸、吳椒、吳芋。

【主要产地】江苏、浙江、广西、湖南、四川、江西、陝西、甘肃等地。

【药用部分】本品是芸香科落叶乔木，入药用其未成熟的果实。其干燥果实，全体呈扁球形，頂端开裂为五瓣，直徑約1分；外表粗糙而有細小的麻点，显灰綠色乃至灰褐色，下端帶有殘存的果柄或果柄痕迹，基部凹陷，有放射状裂痕；果实的各室中藏有橢圓形的細种子，富有特殊芳香气味，但若种子已散出者，則气味較差。

吳茱萸产于广西者，又名茶辣，品質最佳；产湖南常德者，又称

常吳萸，品質亦佳；产于四川、浙江、江西等地者，品質較次。

【炮制】將原藥去淨梗葉，過篩，以甘草水浸泡（吳萸萸 1 斤約用甘草 2 兩煎成甘草水），使泡開為度，濾出曬干，生用或炒用。

【性味和歸經】味辛苦，性溫有小毒。入肝、腎、脾，胃四經。

【應用】本品能祛風散寒，溫中燥濕，下氣開郁。主治冷腸泄瀉、頭重、傷水疼痛、脾胃虛寒。外治口舌生瘡。“師皇安驥集”記載：“骨節疼痛，感冒風寒，氣腫，用之良。”

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢。

【附歌】吳萸辛溫，散寒燥濕，腹冷寒痛，溫中止瀉。

【配伍】配木鼈子、蒼朮、花椒，治腰背緊硬；配官桂、炒鹽、生姜（河南），治馬傷水、不食水草。

【附方】萸萸散（元亨疔馬集）：治馬腰背緊硬、拽腰膀病。

吳萸萸 木鼈子 蒼朮 花椒 萸萸 草烏 狗脊 芫花

上藥為末，內服。醋、面、大蒜，共搗碎熬熟，貼于腰上，有效。

按：吳萸萸的主要功能，是溫中燥濕，祛風散寒。主治胃冷疼痛，冷腸泄瀉。如果入藥配伍得當，效果更佳。如配茴香、苦楝子、荔枝，則治疝氣腹痛；配干姜則止嘔；配茯苓治過食停滯；配陳皮、附子則治腹脹氣逆喘息。

丁香（開寶）

【別名】丁子香、鷄舌香、公丁香、母丁香。

【主要產地】廣東、西藏等地。

【藥用部分】本品是桃金娘科常綠喬木丁香樹的花蕾及未成熟的果實。其花蕾稱丁香或公丁香，未成熟的果實稱鷄舌香，又名母丁香，二者均供藥用。茲分述如下：

公丁香：花托呈扁方柱形，显深褐色，萼片略呈三角形，花蕾呈卵圆形，显淡褐色；质硬而脆，有特殊的芳香气味。

母丁香：果实呈卵圆形或椭圆形，外表呈黑褐色；其香气较公丁香为弱。

【炮制】将未开放的花蕾及未成熟的果实、烘干，原药用。

【性味和归经】味辛，性温无毒。入肺、脾、胃、肾四经。

【应用】本品能温脾暖胃，降逆止呕，暖腰肾，壮阳，止泻。治气冷腹痛、反胃吐食、冷肠泄泻、胃冷吐涎、虫积等症。“师皇安驥集”记载：“丁香皮，消腹脹，止大小腸痛，治寸白虫，化痰，馬咳嗽伤食用之。”“元亨疗馬集”记载：“丁香，温脾和中，馬多热时忌用。”

【用量】馬和牛3錢至1两；羊和猪3分至1錢；兔和鷄1分至2分。

【附歌】丁香性温，能除寒冷，温脾暖胃，降逆壮阳。

【配伍】配汉防己、当归、茴香、官桂、麻黄、川烏、延胡索、羌活（丁香散），治馬把腰；配青皮、車前子、木香、五倍子、訶子、石榴皮、甘草，治小猪下痢。

萆 薢（开宝）

【别名】萆菱，萆薢花。

【主要产地】广东。

【药用部分】本品是胡椒科多年生草本植物。入药用其未成熟的果穗。干燥未熟的果穗略呈圆柱形，长约1寸至1寸4分，粗约1至2分，外表呈灰黑色或灰褐色，质坚而脆，易折断，横断面可见果实围生在中轴上；果实外皮呈紫褐色，小如粟米，呈卵圆形，种子为淡黄色，有特异的芳香气味。

【炮制】采取后阴干，揀去梗，原藥用或醋浸用。

【性味和归經】味辛，性大温无毒。入胃、大腸二經。

【应用】本品能温中暖胃，行气止痛。主治胃冷吐食、伤水疼痛、腰痛、腸鳴泄瀉等症。凡脾肺有实热郁火者忌用。

【用量】馬和牛 3 錢至 6 錢；羊和猪 5 分至 1 錢；兔和雞 1 分至 2 分。

【附歌】藟撥性温，下气消食，暖胃温中，止瀉止痛。

【配伍】配細辛、牙皂、生半夏，治臟脹病或吹鼻用。

茴香（唐本草） 附：八角茴香

【別名】小茴香、谷茴、怀香。

【主要产地】山西、陝西、江西、四川、甘肅、黑龙江等地。

【藥用部分】小茴香是繖形花科多年生草本植物，入藥用其成熟的果实。干燥的果实呈长橢圓形，稍弯曲，两端較尖，长约 2 分余，寬約半分，外表呈黃綠色或黃褐色，一般有 5 条隆起的稜綫（偶有 6 条），而两边的 2 条特別隆起；有微弱特异的芳香气味。

八角茴香：又称大茴香、广大茴、八角。主产于广东、广西等地。是木兰科常綠乔木八角茴香树的果实。果实为蓇葖果，由 6 至 8、9 个排列成星形，放射状集于中軸上，蓇葖长短不齐，上面多有一裂縫，露出扁卵圓形的种子一粒，富有特殊的芳香气味。

另在木兰科植物中，有一种莽草的果实，与八角茴香相似，由于莽草有毒，切不可誤用，应予特別注意。

【炮制】小茴香：采后，揀淨莖叶，阴干或晒干，生用或盐水炒用。八角茴香：采后，晒干生用。

【性味和归經】味辛，性温无毒。入肝、腎、脾、胃四經。

【应用】本品能逐风祛寒，健脾开胃，暖腰肾。主治寒滞腹痛，腹部胀满，胃湿呕逆，冷痛等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 3 錢。

【附歌】茴香性温，能暖腰肾，驱风健脾，寒滞腹痛。

【配伍】配当归、芍药、厚朴、青皮、苦楝子、木通、牵牛、薄荷、延胡索(茴香散)，治馬腰背紧硬，拽腰膀病；配青皮、官桂、干姜，治水草不食。

【附方】茴香散(蕃牧纂驗方)：治馬外肾肿硬，如石如冰，牵拽后膀病。

茴香 知母 苦楝子 甘草 貝母 干姜 秦艽 官桂 梔子 青皮

上药为末，青葱、苦酒同煎，放温灌之。

艾叶(别录)

【别名】蕪艾、艾蓬、艾絨、灸草。

【主要产地】我国各地都有。

【药用部分】本品是菊科多年生草本植物艾的叶。干燥的叶多皱缩，叶背密披着灰白色的细茸毛，富有香气，以陈久者为佳。

【炮制】将原药晒干后，捣杵或以手搓擦成絨状，再筛去灰塵，生用或炒炭用。外科多以艾絨卷成艾卷作灸火用。

【性味和归經】味苦，性微温无毒。入肝、脾、肾三經。

【应用】本品能理血气，逐寒湿，暖子宫，止血，安胎。主治腹中寒痛、冷腸泄泻、衄血、下血、胎动不安等症。对于阴虚血热者忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和雞

3分至5分。

【附歌】艾叶苦温，逐寒去湿，理气安胎，灸用祛寒。

【配伍】配香附、吴茱萸、当归、白芍，治子宫虚冷、不孕症；配鲜荷叶、侧柏叶、鲜地黄，治尿血。

【附方】治尿血方（河北）。

鲜艾叶 鲜荷叶 侧柏叶 鲜生地

上药煎水，候温灌服。

按：艾叶外用做灸料，以其有温热之性，所以能祛寒而奏效。

艾叶与肉桂，都能走血分，治下焦沉寒痼冷，但肉桂味辛性温，辛能发散，故能行血而不能止血；而艾叶味苦性温，故能理血气而止血。

高良姜（别录）

【别名】良姜、蛮姜、大良姜。子名红豆蔻。

【主要产地】广东、广西、山西、福建、台湾、浙江、江西等地。

【药用部分】本品是姜科多年生草本植物，入药用其根茎。其干燥根茎呈分叉的圆柱形，粗约3至5分，外表为红褐色或暗褐色，有由叶鞘基部的痕所形成的环节，有时存有残茎，质坚韧而不易折断；断面显黄赤色，为纤维性，微有特殊的芳香气味。以广东产者为佳。

【炮制】水浸半日，滤出，闷透切片，晒干用。

【性味和归经】味辛，性温无毒。入脾、胃二经。

【应用】本品能温中散寒，破气止痛，健脾消食。主治反胃吐食、伤水冷痛、胃内停滞积食。

【用量】马和牛5钱至1两；羊和猪1钱至2钱；兔和鸡1分至

3分。

【附歌】良姜辛温，散寒温中，下气止痛，宿食能攻。

【配伍】配檳榔、豆蔻、白朮、蒼朮、甘草、黄耆、肉桂、附子(灵应散)，治牛宿草不轉。

【附方】后温散(元亨疗馬集)：治馬后寒冷拖后脚。

高良姜 白附子 吳茱萸 蒼朮 厚朴 白朮 白芷 細辛
上药为末，酒調煎沸，候温送入粪門广腸中，不住牵行，以抛粪带出白膿为驗，凡三次者愈。

草豆蔻 (別录)

【别名】草蔻、漏蔻、草豆仁。

【主要产地】我国南部各省及越南等地。

【药用部分】本品是姜科多年生草本植物，入药用其果实。干燥完整的果实，为暗綠色或淡黃色，大如龙眼，药用的大都除去了果皮，形微长，由多数大粒带灰棕色的种子集成，气味芳香，以形大、不破碎、色淡而有光澤者为佳。

【炮制】不加炮制，原药生用或打碎用。

【性味和归經】味辛，性温无毒，入脾、胃二經。

【应用】本品能温脾和胃，除寒燥湿，止咳化痰，下气消食。主治食滯、冷腸泄泻、脾胃虛寒、痰延积聚、伤水冷痛、反胃吐食等症。孕畜忌服。

【用量】馬和牛5錢至1两。

【附歌】草豆蔻温，除寒燥湿，破气消食，化痰止咳。

【配伍】配益智仁、檳榔、陈皮、砂仁、官桂、細辛、当归、厚朴、五味子、青皮、生姜、大枣(陝西)，治牛反胃吐草。



图 58 草豆蔻

左、草豆蔻原植物；右、药用部分外形。1. 果实外形及半剖面，2. 种子正侧面。

【附方】益胃散(元亨疗马集)：治马脾胃虚弱、脾寒打颤、脾不磨病。

草豆蔻 黄耆 甘草 厚朴 益智仁 姜黄 人参 陈皮
砂仁 泽泻

上药为末，姜、温酒同调灌之。

按：草豆蔻与草果，“别录”本合为一种，至明时“本草蒙筌”始别为二。其实二物形象相似，性质亦少差异，仅因产地不同而大小品质略有差别。时珍说：“草豆蔻草果虽是一物，然微有不同。今建宁所产草豆蔻，大如龙眼，而形微长，其皮黄白，薄而稜峭，其仁大如缩砂仁，而辛香气和。滇广所产草果，长大如诃子，其皮色黑，

厚而稜密，其子粗而辛臭，正如斑蝥之气。”

花椒（本草經） 附：椒目

【別名】川椒、蜀椒、巴椒、秦椒。

【主要产地】四川、陝西、江苏、河南、山东、江西、福建、甘肃、广东等地。

【藥用部分】本品是芸香科落叶灌木，入藥用其果实及种子。果名花椒，种子称椒目。分述如下：

花椒：果实呈类球形，直径約 1 分余，通常裂为二瓣，露出或散出黑色的种子，果实外表呈暗赤色或灰褐色，粗糙不平，有特异的芳香气味。

椒目：种子呈卵圆形或类球形，直径約 1 分，外表呈黑色而有光泽。

蜀椒，为产于四川者，外皮呈紫紅色，品質最好；产于陝西者称秦椒，較蜀椒为大，色較淡，品質較次；产于其他各地者，名土花椒，呈土黑色，味淡，多为外用。一般以果肉厚而开口者良，閉口者不可供藥用。

【炮制】花椒采集后，晒干，使开口，除去梗叶，生用。椒目：可将原藥微炒使出水气，乘热搗去壳用。

【性味和归經】味辛，性温有毒。入肺、脾、腎三經。

【应用】本品能散寒逐湿，温中扶阳，杀虫止痛，止嘔祛痰。主治咳逆上气、蛔虫、骨节疼痛、消化不良、伤水冷痛等症；外用治疥癩。椒目：能行水。主治水腫脹滿、腹水及自汗等症。

【用量】馬和牛 3 錢至 6 錢。

【附歌】花椒辛温，散寒除湿，消食杀虫，止咳止痛。

【配伍】配黃連、黃芩、干姜、白芍、烏梅、枳實。治寒冷下痢。

【附方】專治四時牛癰加減十三方第三方(元亨疔馬集)：止瀉。

花椒 胡椒 山藥 生地黃 黃蜡

上藥共為末，入麝香少許，用白米煮粥調灌之。

按：花椒內服能散寒除濕，溫中扶陽，殺蟲；外用又可治疥癩。許叔微說：“凡腎氣上逆，須以川椒引之……則安。”時診說：“此乃右腎命門氣分之藥，故能入肺散寒，治咳嗽。入脾除濕，治風寒濕痹、水腫瀉痢。入命門補火，治陽衰……久痢諸症。”戴元禮說：“凡嘔逆服藥不納者，必有蟲在膈間，加川椒十粒，自不吐，蟲見椒則伏也。”丹溪說：“椒屬火，有下達之能，久服則火自水中生，故服椒久，必被其毒。”因此，本品不可久用。

萆澄茄（開寶）

【別名】澄茄子、毗陵茄子。

【主要產地】我國南方各地均有出產。

【藥用部分】本品是胡椒科蔓生植物，入藥用其未成熟的果實。干燥果實略呈球形，外表呈灰褐色或黑褐色，具有網狀皺縮，其下端漸細，延長形成果柄；果皮堅厚，內含紅棕色球形種子一粒，富有油脂，有特異的芳香气味。

【炮制】去柄及葉用，或酒浸用。

【性味和歸經】味辛，性溫無毒。入脾、胃、膀胱三經。

【應用】本品能溫中散寒，開胃消食，下氣止嘔。主治腎經虛寒、後肢浮腫、反胃吐食、腹痛、膀胱冷氣、下痢等症。

【用量】馬和牛3錢至8錢；羊和豬6分至2錢；兔和雞1分至3分。

【附歌】萆澄茄温，散寒温中，肚腹脹痛，腎寒堪用。

【配伍】配茴香、肉蓯蓉、桂心、胡蘆巴、豆蔻等，治腎經痛；配朴骨脂、胡蘆巴、苦楝子、肉蓯蓉、肉豆蔻、厚朴、茴香、巴戟天、桂心、益智仁、檳榔(萆澄茄散)，治馬腎虛、后腿浮腫。

表 33 祛寒藥归納簡表

藥名	性 味 及 归 經	功 用	用 量 (錢)		
			馬 牛	羊 猪	兔 鷄
肉 桂	辛甘,大熱,入脾、腎	溫中逐寒,活血止痛	4—10	1—3	0.2—0.5
附 子	辛甘,大熱,入十二經	回陽通脈,逐風寒濕	4—10	—	—
干 姜	辛溫,入心、肺、脾、胃、腎、大腸	溫中發表,逐寒通脈	4—10	1—3	0.1—0.3
吳茱萸	辛苦溫,入肝、腎、脾、胃	去風散寒,溫中燥濕	4—10	1—3	—
丁 香	辛溫,入肺、脾、胃、腎	溫脾暖腰,壯陽止瀉	3—10	0.3—1	0.1—0.2
藁 本	辛大溫,入胃、大腸	溫中暖胃,行氣止痛	3—6	0.5—1	0.1—0.2
茴 香	辛溫,入肝、腎、脾、胃	逐風祛寒,健脾溫胃	5—20	2—3	—
艾 葉	苦微溫,入肝、脾、腎	理血氣,逐寒濕,止血安胎	4—15	2—4	0.3—0.5
高良姜	辛溫,入脾、胃	溫中散寒,健脾止痛	5—10	1—2	0.1—0.3
草豆蔻	辛溫,入脾、胃	除寒燥濕,止咳化痰	5—10	—	—
花 椒	辛溫,入肺、脾、腎	散寒除濕,殺蟲止痛	3—6	—	—
萆澄茄	辛溫,入脾、胃、膀胱	溫中散寒,肚腹脹痛	3—8	0.6—2	0.1—0.3

第十章

祛暑药

凡能解除暑热的药物，就称为祛暑药或清解暑热药。暑病是夏令时节许多疾病的总称。由于引起暑病的原因很多，所以暑热的症候非常复杂，例如烈日的直射，盛暑或剧役后的伤冷水，以及暑邪挟湿等，都能引起暑病的发生。因之，祛暑药的作用范围很广。凡有解表清热、利湿和中、芳香化浊等作用的药物，都可包括在内，但是这些药物的很大部分都有专章来叙述，可随症选用，适当配伍。这里仅将比较重要的药物，分述于后，其他可参考有关各章。

香薷（别录）

【别名】香薷、香茹、蜜蜂草。

【主要产地】浙江、江西、河北、湖北、广东、广西等地。

【药用部分】本品是唇形科一年生草本植物，入药用其茎叶。干燥的茎呈四方形，节上有对生的枝或叶，茎外表呈黄绿色或紫褐色，折之易断，叶多数已脱落，花穗细长，形如荆芥穗，全株有香气。

【炮制】将香薷从近根部割取，扎成小把，晒干；用时以水湿

潤，切細晒干，生用。

【性味和归經】味辛，性微温无毒。入肺、胃二經。

【应用】本品能发汗，清暑祛湿，利水消肿。主治伤暑发热恶寒、鼻衄、泄泻腹痛、水肿、小便不利等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 1 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 6 分。

【附歌】香薷辛温，清暑去湿，利水消肿，除煩解热。

【配伍】配厚朴，白扁豆，炙甘草等，治夏令伤暑、发热、恶寒煩燥、下泻腹痛等症；配白朮，治水肿。

【附方】(1)香薷散(元亨疗馬集)：治馬热症中暑。

香薷 黄芩 黄连 天花粉 当归 甘草 梔子 連翹
上药为末，童便、蜜、漿水同調灌之。

(2)治羊受暑热方(甘肃)。

香薷 厚朴 白扁豆 黄连
共为末，用水調匀，灌服。

(3)治牛、猪受暑发痧肚痛方(四川)。

香薷 黄连 黄芩 焦黄柏 梔子 知母 白朮 茯苓 蚯蚓 甘草

共为末，开水冲，温服。

按：夏季天气炎热，家畜剧烈劳役后，因休息时，牵系巷前簷下，被贼风吹闭毛孔，或喘息未停即下冷水浸身，热身突然遇冷而致毛孔闭塞，内热不得外泄，故发生口内发热、体表冰冷、口渴急飲、煩躁不安等症狀，此謂外受寒湿，内受暑热之症。但香薷辛温，功能清暑发散，利水去热，故为清暑之药。古人謂：“夏月之用香薷，犹如冬月之用麻黄。”由此可見香薷发散效力很强，故在受暑大

汗、口渴急飲時，不宜應用。

藿香（嘉祐）

【主要產地】我國各地均產，其中以廣東產者為佳。

【藥用部分】本品是唇形科多年生草本植物，入藥用其全草。一般分為廣藿香、蘇藿香兩種。

廣藿香：產於廣東，莖的橫斷面呈圓角四方形，粗約1分半至4分，長約3尺余，外表呈淡褐色或黃褐色，有茸毛，節上對生枝葉，葉多皺縮而具長柄，為綠褐色，兩面皆有茸毛，全株富有特異的香氣，品質較好。

蘇藿香：產於江蘇之蘇州，又名土藿香，莖呈綠黃色或綠褐色，四角有稜，粗約半分至1分，長約2至3尺，節上對生具葉柄的葉，多皺縮而無茸毛，外表呈暗綠色或綠黃色，花頂生，排成總狀花序，由於花柄短而密生，極似穗狀花序。全株有微弱的香氣，品質較次。

【炮制】將原藥去根，洒水濕潤，悶透，切碎晒干，生用。

【性味和歸經】味辛，性微溫無毒。入肺、脾、胃三經。

【應用】本品能升清降濁，清上焦熱，健脾止嘔，行氣化濕。主治夏傷暑濕、反胃吐食、胸腹脹痛、暑疫泄瀉、風濕水腫等症。

【用量】馬和牛4錢至1兩2錢；羊和豬1錢至4錢；兔和雞2分至6分。

【附歌】藿香辛溫，正氣溫中，開胃止瀉，胸腹脹痛。

【配伍】配紫蘇、厚朴、半夏、大腹皮、白朮、陳皮，治外感風寒、內傷濕熱、胸腹脹滿、泄瀉等症；配砂仁、木香、沉香、乳香，治胸腹疼痛。

【附方】治牛急性痧症方(浙江)。

藿香 木香 高良姜 細辛 神麴 青蒿 砂仁 肉豆蔻
芍药 甘草 焦蒼朮 怀牛膝

共为末,水調灌服。

按: 藿香辛香微温,能助脾醒胃,升阳降濁,为解四时不正之气的要药,故仲醇說:“治中暑吐泻,一言以蔽之,皆其升清气降濁气之功。”

白扁豆(別录) 附: 扁豆衣

【別名】沿籬豆、峨眉豆。

【主要产地】浙江、江苏、安徽等地。

【药用部分】本品是豆科一年生蔓草植物,入药用其种子。种子呈稍扁平的卵圆形,长约2分半至4分,宽约2分,厚约1分余,种皮呈黄白色而平滑,边缘的上端有种脐,剥去种皮,即露出乳黄色




图59 白扁豆

左、白扁豆原植物; 右、药用部分外形。

的种仁。以粒饱满色白而有光澤者为佳，黑扁豆不可供为藥用。

【炮制】生用或炒用。如将干燥的白扁豆，以开水浸泡，剥取种皮用，即称为扁豆衣。

【性味和归經】味甘，性微温无毒。入脾、胃二經。

【应用】本品能和中化湿，消暑解毒，暖脾止泄。主治暑湿泻痢、心煩不安、口渴食水等症。（扁豆衣功用相同）

【用量】馬和牛 6 錢至 1 兩 5 錢；羊和猪 2 錢至 5 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】白扁豆温，清暑除湿，暖胃和中，补脾止泄。

【配伍】配香薷、厚朴、甘草炙，治夏季伤暑。

【附方】治牛湿瘟方（江苏）。

炒扁豆 焦白朮 厚朴 茯苓 車前子 猪苓 广陈皮 澤
泻 木通 砂仁 青皮 甘草 荷叶

上为末，加水灌服。

按：在有河豚魚生长的地方，牛只往往因吃其粘在草上的卵子而引起中毒，白扁豆对此有解毒的作用。

木瓜（別录）

【別名】榧櫨、宣木瓜。

【主要产地】湖北、湖南、安徽、四川、山东等地。

【藥用部分】本品是蔷薇科落叶乔木植物木瓜的干燥果实。全体呈椭圆形，其果柄的一端稍窄，有凹入的果柄痕，长约2—3寸，粗約1—2寸，質坚硬，外表呈紫褐色或深褐色；两半剖面中心凹陷，呈赤褐色或赤黄色。以产于安徽宣城者为佳。

【炮制】将原藥浸泡，悶一日，放蒸籠內蒸軟，趁热切片，晒干，

生用或酒炒用。

【性味和归经】味酸馊，性温无毒。入脾、胃、肝、肺四经。

【应用】本品能理脾和胃、欬肺、平肝、利筋骨、祛湿热。主治泄泻、嘔逆、四肢湿痹、腰膝无力、水肿等症。

【用量】马和牛 4 钱至 1 两；羊和猪 2 钱至 4 钱；兔和鸡 4 分至 6 分。

【附歌】木瓜酸温，除湿舒筋，理脾和胃，止嘔止泻。

【配伍】配茴香、吴茱萸、甘草，治泄泻嘔逆；配牛膝、防己、羌活、防风、薏苡仁、干姜、附片，治风湿肿痛。

【附方】(1)治风湿病方(江西)：治牛水湿肿脚。

木瓜 牛膝 防己 薏苡仁 羌活 防风 干姜 附片 苍朮 五加皮 甘草炙 米酒为引

上药煎水，去渣，候温灌服。

(2)木瓜散(四川)：治牛猪反胃吐食，拉稀。

木瓜 茴香 吴茱萸 藿香 黄芩 焦黄柏 黄连 甘草 生姜为引

共为末，开水冲服。

按：木瓜味酸性温，气薄味厚，为治疗四肢筋脉不利的湿痹要




图 60 木瓜

左、木瓜原植物；右、药用部分外形(半剖面)：
1. 果柄痕。

藥。因濕侵肌肉則為濕痹，而木瓜溫能通肌肉之滯，酸澹能斂濡滿之濕，則濕痹自除。若配酒治久病，則功效更佳。由於其性酸澹，故初起有痰濕積滯等症，不可急用。王世雄說：“木瓜酸平調氣，和胃養肝，消脹舒筋，息風去濕，蜜漬酒浸，多食患淋，以酸收太過也。”

青蒿（本草經）

【別名】青蒿草、草蒿、香蒿。

【主要產地】我國各地均有出產。

【藥用部分】本品是菊科多年生草本植物，入藥用其乾燥的全草。莖長約3—4尺，最粗的部分可達3—4分，為圓柱形，具有縱稜綫，莖葉均無毛，上部分枝柔細，葉互生，呈灰褐色或黃褐色；莖硬而脆，折斷面中心髓部為白色，有特殊的芳香气味。果實甚小，如粟粒，為橢圓形，呈黃褐色。

本品有青蒿及黃蒿兩種，二者形態相似，在成長時期，頗難識別。青蒿葉甚細，莖瘦而硬，色青，雖屆深秋，仍然不凋，香氣頗濃。黃蒿的葉較粗，莖軟，色雖青，但入秋後莖葉則變黃色，香氣較薄，功效較差。

【炮制】將原藥去根洗淨，橫切成1—2分長的小段，曬干生用。

【性味和歸經】味苦，性寒無毒。入肝、胆二經。

【應用】本品能清暑退熱，除血中伏熱，明目，止痢。主治骨蒸勞熱、自汗、腹內脹滿、目赤、冷熱久痢、疥癩、惡瘡等症。搗細外敷金瘡，能止血及止痛。

【用量】馬和牛6錢至1兩6錢；羊和豬2錢至4錢；兔和雞4分至1錢。

【附歌】青蒿苦寒，清暑退热，明目止痢，杀虫消胀。

【配伍】配鳖甲、生地黄、麦門冬、五味子，治阴虛自汗，骨蒸劳热；配党参、麦門冬、生地黄、薏苡仁，治肺热、自汗或久热不退等症。

【附方】治牛患喘急肺燥病方(江西)。

青蒿 桔梗 黄芩 馬兜鈴 甘草 陈皮 檳榔 瓜藹 明矾 桑白皮 天門冬 蜂蜜为引

上药用水做成煎剂，候温灌服。

表 34 祛暑药归纳简表

药名	性 味 及 归 經	功 用	用 量(錢)		
			馬 牛	羊 猪	兔 鷄
香 蒿	辛微温,入肺、胃	清暑去湿,利水消肿	5—15	1—4	0.4—0.6
藿 香	辛微温,入肺、脾、胃	清热化湿,开胃止泻	4—12	1—4	0.2—0.6
白扁豆	甘微温,入脾、胃	清暑解毒,暖脾止泻	6—15	2—5	0.5—1
木 瓜	酸澹温,入脾、胃、肝、肺	理脾和胃,利筋骨,祛风湿	4—10	2—4	0.4—0.6
青 蒿	苦寒,入肝、胆	清暑退热,明目止痢	6—16	2—4	0.4—1

第十一章

祛 风 止 痛 药

凡能祛除留連肌表和凝滯經絡的风邪，并有調暢气血和止痛功能的藥物，都称为祛风止痛药。

牲畜感受风邪，多在剧烈劳役后，毛孔舒張，系于巷口簷前，使邪风乘虛而入，或因厩舍破旧，久受贼风侵襲所致。若风邪停留肌表，凝滯經絡，气血停聚不行，則产生痹痛。由于此类藥物大多是味辛性温，有祛除风寒、調暢凝滯气血、制止渾身疼痛的功能，因而在牲畜受风寒而发生痹痛时，可应用此类藥物来治疗。

贼风侵入肌表，其初期症状为肌肤顫抖，脉浮，鼻流涕，有汗无汗，四肢呆笨，此称表症，須用解表药治疗。若表邪未解，傳入肌肉，則毛焦肱弔，遍体頑麻。治疗时，解表药宜与祛风止痛药并用。如果日久风邪傳入筋骨經絡之間，則症状出現頸項强直，骨节疼痛，行走拘攣，把前把后，耳紧尾直，眼弔惊狂，口内垂涎，牙关紧閉，不食水草，此称为里症；这时除采用祛风止痛药外，还应配合活血通經的藥物，使患畜經通无阻，血和通行，則肢体关节疼痛就会随着消失。因此在临床上使用本类药物时，应注意选择应用。

羌活（本草經）

【別名】羌青。

【主要產地】四川、西康、陝西、青海等地。

【藥用部分】本品是繖形花科多年生草本植物，入藥用其干燥根。其外表呈褐色或黑褐色，長約3—4寸，粗約4—5分，為紡錘形，往往屈曲，根上部有層層環節狀突起而粗糙，質脆；折斷面稍呈纖維性。其根的頭部，形如蠶蛹狀的稱蠶羌。如肉部疏松色黃，外表淡褐色，心有菊花紋，香味濃烈者，其品質較佳；如根的上部分枝，下部細瘦，內部多空而松，心部无菊花紋者，品質較次。

【炮制】將原藥洗淨，潤濕，待心部軟化后，切成薄片晒干，生用。

【性味和歸經】味辛苦，性溫無毒。入膀胱、肝、腎三經。

【應用】本品能發汗解表，祛風止痛。主治肢體風濕痹痛、骨節腫脹、風濕腰膝痛、項僵背直、四肢拘攣等症。對於無風寒濕邪及陰虛火旺者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬1錢至4錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】羌活辛溫，主治表風，骨節腫脹，風濕痹痛。

【配伍】配防風、香附子、柴胡、肉桂、前胡、芍藥、人參、甘草（解肌散，師皇安驥集），治馬感冒風寒。

獨活（本草經）

【別名】玉活、獨搖草。

【主要產地】四川的資邱及巴東、雲南、河南、江西、陝西、甘

肅、安徽、浙江、內蒙等地。

【藥用部分】本品是繖形花科多年生草本植物，入藥用其干燥根。根的外層為灰褐色，皮縱皺，長約2寸多，粗約6—7分，有很多支根；橫切面呈褐色或淡灰褐色，質軟而韌，氣味芳香，但較羌活為弱。



图 61 獨 活

左、獨活原植物；右、藥用部分外形：1.支根。

【炮制】原藥洗淨濕潤，乘爛軟切片，晒干，生用或炒用。

【性味和歸經】味辛，性溫無毒。入肝、腎二經。

【應用】本品能發汗解表，祛風止痛。主治項僵腰直、口眼歪斜、肌肉顫動、四肢風濕痹痛、骨節腫痛等症。對於無風寒濕邪者及陰虛火旺者忌服。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬1錢至3錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】独活辛温，发汗解表，治诸中风，痹痛莫少。

【配伍】配羌活、防风、肉桂、泽泻、当归、黄柏、大黄、汉防己、桃仁、连翘(独活散)，治马五劳七伤、腰膝痛；配桑寄生、秦艽、当归、牛膝、杜仲、川芎、桂心、细辛等，治风寒湿痹。

【附方】独活寄生汤(江苏)：治耕牛麻脚风。

桑寄生 独活 秦艽 当归 生地黄 牛膝 甘草 茯苓
杜仲 党参 川芎 桂心 细辛
水煎，候温灌服。

按：羌活、独活虽属同科植物，实际上两者形态并不相同，气味也稍有差异，主治功能亦各有特点。羌活气味雄烈，性燥而散，功能发散表邪，故多用于表；独活气味较淡，性质亦较缓和，功能疗筋骨之间的风湿痹痛，故多用于里。

五加皮 (本草经)

【别名】香加皮、追风使、木骨、五叶木。

【主要产地】江西、福建、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、四川、广东、陕西、河北、山西、贵州及东北各省。

【药用部分】本品是五加科落叶灌木五加的干燥根皮。一般卷缩呈管状或半管状，长约2—3寸，粗约2—5分，外面平滑，呈暗褐色，内面呈黄白色，较平坦，有纵向纤维状丝纹，质稍硬，易折断，有香气。此种五加皮片大肉厚，称南五加，是常用的一种。另外在北方有一种杠柳根皮，皮褐色，无香气，系萝藦科落叶灌木，其根皮有毒，不可入药。

【炮制】剥取根皮洗净，晒干，切断，酒洗，生用或炒用。

【性味和归经】味辛，性温无毒。入肝、肾二经。



图 62 五加皮

左、五加皮原植物；右、药用部分外形。

【应用】本品能祛风湿，壮筋骨，止痛，补肾水。主治风湿痹痛、骨节水肿、四肢无力、冷痛、阳痿等症。对于无寒湿邪而有火者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 6 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和雞 5 分至 1 錢。

【附歌】加皮辛温，补虚强筋，祛风去湿，冷气腹痛。

【配伍】配牛膝、当归、川芎、桂皮、苍朮、玄参、麻黄（河南），治风湿疼痛。

【附方】治牛风湿病方（湖北）。

五加皮 杜仲 牛膝 山药 秦艽 当归 知母 薏苡仁
樟脑

共研細末，加谷酒和开水冲服。

按：风胜则筋骨拘攣，湿胜则引起脉沉、脉迟，寒湿则血脉凝滞，筋骨疼痛则肢体不易行动。五加皮辛苦而温，辛则发散，苦则壮骨益精，温则祛风胜湿，故肌肤之瘀血，筋骨之风邪，因湿去则骨壮，风去则筋强，而肢体风湿痹痛即可自愈。因此称五加皮为驱风去湿、强壮筋骨要药。

由于风湿痹痛所引起的原因与症状各有不同；故五加皮入药配伍也不同。如配苍朮、白朮、萆薢、菖蒲、薏苡仁、刺蒺藜、菊花、防风、羌活、独活、白藓皮、石斛，则可治风寒湿痹；如配續断、杜仲、牛膝、山茱萸、巴戟天、补骨脂，则可治肾虚寒湿腰痛；如配牛膝、木瓜、黄柏、麦門冬、生地黄、虎骨、薏苡仁、石斛、山药，则可治湿热痹痛。

白花蛇（开宝）

【别名】蕲蛇、百步蛇。

【主要产地】四川、贵州、湖北、河南、浙江、广西等地。

【药用部分】本品是响尾蛇科白花蛇的干燥尸体。商品多作螺旋形盘起，长约2尺至4尺，头略呈三角形（多已除去），背部呈淡褐色，密被鳞片，腹部剖开，露出脊背骨及腹腔内壁，质硬而韧；折断面为白色，有特殊腥气。

【炮制】将白花蛇干燥尸体，去头尾，酒浸三日，去皮骨，酒浸用或研末用。

【性味和归经】味甘咸，性温有毒。入肝经。

【应用】本品能透骨搜风，祛湿止痛，定惊癇，止抽搐。主治风湿痹痛、口眼歪斜、頸项伸直、腰膀寒痛、破伤风、揭鞍风、骨节痛风、恶疮等症。

【用量】馬和牛 3 錢至 5 錢；羊和豬 8 分至 2 錢。

【附歌】白花蛇溫，通治諸風，破傷揭鞍，腰膀痹痛。

【配伍】配烏蛇、蜈蚣、天麻、治項硬身直、破傷風、揭鞍風；配羌活、當歸、防風、五加皮、秦艽、天麻，治邪風口眼歪斜、骨節疼痛；配干蠍，治腦旋風。

烏蛇（開寶）

【別名】烏梢蛇、黑花蛇、黑風蛇、黑脊蛇。

【主要產地】江蘇、安徽、浙江、四川等地。

【藥用部分】本品是游蛇科爬蟲類動物干燥尸體。商品都是螺旋形盤起，長約 3—4 尺，頭圓尾尖，頸部較細，干燥後眼亦不閉，外表呈黑褐色，背有三稜如劍脊，肌肉甚厚，剖開腹部，露出脊骨及內部體壁，質堅韌，微有特殊腥臭氣味。

【炮制】酒浸或生用。

【性味和歸經】味甘，性平無毒。入肝經。

【應用】本品能祛風止痛，定抽搐，療驚癇。主治口眼歪斜、破傷風、抽搐驚癇、頸直腰硬、四肢麻木、疥癩等症。

【用量】馬和牛 3 錢至 8 錢；羊和豬 2 分至 3 錢。

【附歌】烏蛇甘平，療治諸風，風濕痹痛，疥癩亦用。

【配伍】配天麻、川芎、羌活、天南星、全蠍、殭蚕、蟬蛻、蔓荊子、旋復花、防風、細辛、藿香、沙參、何首烏、桑螵蛸、阿膠、升麻、獨活（千金散），治馬破傷風及諸風症。

【附方】（1）追風散（元亨疔馬集）：治牛腳風病。

烏蛇 全蠍 蟬蛻 厚朴 當歸 麻黃 川芎 烏頭 桂心
防風 白附子 天門冬

上为末,加酒灌之。

(2)烏蛇散(元亨疗馬集):治牛蹠脚风病。

烏蛇 全蠍 川芎 白附子 茴香 当归 牛膝 半夏
芍药 桂心

上为末,酒油同調灌之。

蒼朮 (政和)

【别名】赤朮、山精、茅朮。

【主要产地】江苏、河北、山西、湖北、河南、陕西、安徽、浙江、山东、辽宁、内蒙等地。



图 63 苍 朮

左、苍朮原植物； 右、药用部分外形。

【藥用部分】本品是菊科多年生草本植物，入藥用其干燥根。根呈不規則的屈曲，長約2—3寸，粗約4—5分，外表為黃褐色或暗褐色，有皺縮不平的結節，如連珠狀，旁有細根痕；折斷面為黃白色。富有特殊的芳香氣味。以產于江蘇句容縣茅山的蒼朮為佳，稱茅朮；產東北一帶者稱山蒼朮，品質較次。

【炮制】將原藥用米泔水浸潤，切片，以清水漂去油，生用或炒用。

【性味和歸經】味辛苦，性溫無毒。入脾、胃二經。

【應用】本品能健脾燥濕，利水發汗。主治脾胃虛寒，冷腸泄瀉、食欲不振、腹痛、小便不利、水腫、骨節疼痛、風寒濕痹、燥結等症。對於陰虛多汗者忌用。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和豬1錢至4錢；兔和雞4分至8分。

【附歌】蒼朮辛苦，健脾燥濕，利水止瀉，骨節疼痛。

【配伍】配蟬蛻、木賊草、黃芩、甘草（蒼朮散），治肝經積熱，眼生翳膜；配官桂、厚朴、茴香、青皮、陳皮、白朮、木香，治胃寒草慢；配茯苓、豬苓、澤瀉、能消腫利水。

【附方】（1）溫脾散（元亨疔馬集）：治馬傷水腹痛。

當歸 厚朴 青皮 甘草 益智仁 牽牛 細辛 蒼朮
共為細末，青蔥、苦酒調煎沸，揚去火氣，候溫灌之。

（2）蒼朮散（元亨疔馬集）：治馬內障眼，黃暈浸睛。

蒼朮 黃芩 當歸 白朮子 龍胆草
共為末，蜜、水同調，草后灌之。

按：蒼朮、白朮，均為脾胃要藥，但蒼朮辛苦，主為祛濕發汗，健脾消痰，補性則較差；白朮甘苦，主為補脾益氣，滋潤止汗，而祛濕

則較差。

蒼朮氣味雄厚，又有芳香辟穢的作用。我國南方多用以焚燒來預防疫病。據“養耕集”載：“牛欄門口，晝夜宜用安息香點之，欄中用蒼朮、沉香、丁香、楓子和糠艾以焚之。”這是古代一種簡易的防疫措施，也可說明我國獸醫早有以“防疫為主”的傳統。

秦艽（本草經）

【別名】大艽、秦膠、秦瓜、秦交。

【主要產地】陝西、甘肅、西康、雲南、四川、河南、河北、山西、內蒙等地。

【藥用部分】本品是爵床科多年生草本植物，入藥用其干燥根。長約5—6寸，粗細不等，外表有不整齊的皺縮及縱溝，呈淡黃色，枝根互相糾纏，氣香而有油質。產于陝西、甘肅等地的色黃、根粗、肉滿、無蘆頭者，品質較佳，稱西秦艽；色淡黃、肉薄質松、有蘆頭者，品質較次。

【炮制】原藥揀去蘆頭雜質，水潤半日，切片，晒干，生用。

【性味和歸經】味苦辛，性平無毒。入胃、大腸、肝、胆四經。

【應用】本品能祛風除濕，舒筋止痛，退熱養血。主治風濕痹痛、肺勞鼻膿、腸風下血、尿血、骨節疼痛、四肢拘急、水腫、大小便不利等症。對於下部虛寒及小便多者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和豬1錢至4錢；兔和雞4分至6分。

【附歌】秦艽苦平，祛風去濕，退熱消腫，止血止痛。

【配伍】配知母、百合、梔子、紫花、貝母、遠志、麥門冬、牡丹皮，治肺勞鼻膿。

【附方】(1)秦艽散(元亨疔馬集):治馬尿血。

秦艽 瞿麥 車前子 當歸 茯苓 芍藥 天花粉 蒲黃
梔子 甘草 大黃

共為末,竹葉煎湯調灌。

(2)秦艽散(元亨疔馬集):治馬肺熱渾身疥癢。

秦艽 當歸 芍藥 知母 貝母 桔梗 甘草 紫苑 白芷
梔子 麥門冬

上為末,蜜、生姜、薑汁同煎灌之。

按:秦艽味苦辛散,功能散風祛濕,退熱養血,舒筋止痛。主治風濕痹痛,肺病瘡疥,大便下血。為治風濕之要藥。沈金鰲說:“感受風寒發熱,遍身疼痛,必以秦艽治之。以其能散結除邪也。”

烏頭 (本草經)

【別名】川烏、烏喙。

【主要產地】各地均產,其中以四川、貴州等地為多。

【藥用部分】本品是毛茛科多年宿根草本植物,入藥用其干燥根莖。呈圓錐形,長約5分至1寸,根頭粗約2至4分,質地堅硬,外表黑褐色而有皺裂,內面呈白色;折斷面平坦,為粉質。

【炮制】將干燥根用生姜拌煮,取出燜軟,切片,晒干用。

【性味和歸經】味辛甘,性大熱有大毒。通行十二經。

【應用】本品能散風除寒,止痛。主治筋骨疼痛、風濕、四肢拘攣、骨節痛風、破傷風、陰疽癰毒、久不破潰或潰後不收口、跌打損傷等症。對於孕畜忌服。

【用量】馬和牛3錢至6錢;羊和豬5分至1錢。

【附歌】烏頭辛熱,溫經散風,跌打損傷,疏筋止痛。

【配伍】配附子、羌活、独活、天麻、全蝎，治风湿疼痛。

【附方】(1)追风散(元亨疗马集)：治马揭鞍风。

雄黄 乌头去蘖 白朮 川芎 細辛 白芷 蒼朮水浸 防风
上为末，温酒同調灌之。

(2)乌头散(蕃牧纂驗方)：治马伤冷气起臥。

草乌头 蛇床子 吳茱萸 木鼈子 狗脊 芫花 高良姜
蒼朮

上为末，用生姜、醋、面同熬敷之。

(3)乌头活血湯(四川)：治牛跌絆损伤。

川烏 草烏 杜仲 續断 牛膝 茜草 伸筋草 桃仁
紅花 骨碎补 广木香 刘寄奴

共为細末，酒为引，开水冲服。

按：乌头、附子功用基本相同，但稍有分別。乌头性較輕疏，散风去寒为胜；附子性較重滯，回阳补火为胜。所以在治疗上焦风痰寒湿，或托毒透膿，則多用乌头，生用其力尤大。若入补剂，則多熟用，因其性較緩。

藥本 (本草經)

【別名】西芎、土芎。

【主要产地】四川、江苏、江西、甘肅及广东之乐昌、城口等地。

【药用部分】本品是繖形花科多年生草本植物，入药用其干燥根。根呈不規則圓錐形，长约6—7寸，外表为灰褐色或黃褐色，密生疣状突起，上部粗而下部細，内部呈黃白色。有特殊的芳香气味。

【炮制】洗淨原药，扎紧淋水，待根莖柔軟后，切片，晒干用。

【性味和归經】味辛，性温无毒。入膀胱經。

【應用】本品能散風寒，除濕邪，解表，止痛。主治偏頭風、脊項強直、傷風發熱、風濕骨節痛、疥癩等症。對於陰虛內熱者忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 2 錢；兔和雞 2 分至 5 分。

【附歌】藁本辛溫，除風解表，頭風頸直，煎洗疥癩。

【配伍】配血竭、胡蘆巴、當歸、沒藥、白朮、木通、補骨脂、巴戟天、茴香，治馬產後胎風；配蒼朮、川芎、白芷、羌活、細辛、炙甘草、天麻（實用家畜疾病診療法），治頸項強直。

威靈仙（開寶）

【別名】鉄脚威靈仙、九階草、雞爪根。

【主要產地】廣東、福建、安徽、浙江、湖南、陝西、江西、廣西、河南、山東等地。

【藥用部分】本品是毛茛科多年生藤本植物，入藥用其干燥根。根的頭部丛生須根，長約 3 至 8 寸，粗約半分，外表呈黑色或黑褐色，質硬而脆，易折斷；斷面呈白色，為粉質。

【炮制】將原藥切碎，生用或酒炒用。

【性味和歸經】味辛咸，性溫無毒。入膀胱經。

【應用】本品有祛風濕，通經絡，消腫止痛的功用。主治風濕痹痛、痰涎壅膈、腰冷拖捍、四肢拘攣、骨節疼痛、水腫等症。對陽盛火旺及表虛有汗者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 1 錢至 4 錢；兔和雞 2 分至 5 分。

【附歌】威靈仙溫，主治風痹，腰拖寒痛，利水消腫。

【附方】治馬牛風濕腰胯痛方（河北）。



图 64 威灵仙

左、威灵仙原植物；右、药用部分外形。

羌活 独活 五加皮 香附 枳壳 烏药 沒药 穿山甲
防风 甘草 补骨脂

按：威灵仙辛温，功能祛风湿，通經絡，消肿止痛。主治风湿肿痛及麻木的实証。汪昂說：“此能治中风、头风、痛风、頑痹、黄疸、浮肿、二便秘、风湿痰气、一切冷痛。凡治痛风，大法宜順气消痰，搜风去湿，养血散瘀，不能仅以威灵仙竟全功也。”

葶藶（別录）

【別名】葶藶、苈藶。

【主要產地】浙江、四川、陝西、河南、湖南、江西等地。

【藥用部分】本品是薯蕷科多年生蔓草植物，入藥用其干燥塊根。呈不規則的圓柱形，有時分叉，多節，長約7—8寸，粗約5—6分，外表為土黃色，質堅硬；橫斷面呈黃白色或灰黃色，為粉質。

【炮制】將原藥洗淨泥土，切片晒干，生用。

【性味和歸經】味苦，性平無毒。入肝、胃二經。

【應用】本品能祛風除濕、理下焦宿水。主治腰脊痠痛、骨節痛風、尿閉等症。對於下部無濕及陰虛火熾者忌用。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和豬1錢至4錢；兔和雞5分至1錢。

【附歌】草薺苦平，祛除風濕，下焦虛冷，腰痛尿閉。

【配伍】配白芷、陳皮、厚朴、沒藥、茴香、當歸、自然銅、五靈脂、苦楝子（百補散），治牛腎傷病。

海桐皮（開室）

【別名】刺桐皮、木棉樹皮、古釘皮。

【主要產地】各地都有出產，其中以廣東博羅的產品為最好，以浙江、江蘇產量較多。

【藥用部分】本品是海桐花科落葉喬木海桐花的干燥樹皮。樹皮呈管筒狀卷曲，厚約半分余，質地堅韌，外表呈黑褐色或深褐色，粗糙，腹面呈灰黃色或暗黃色；折斷面呈纖維狀。

【炮制】將樹皮剝下後，切片晒干用。

【性味和歸經】味苦，性平無毒。入肝、腎二經。

【應用】本品能祛風去濕，止痛，治疥癩。主治腰膝風濕、骨節疼痛、腸熱下痢。外用治蹄傷及疥癩。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分至 8 分。

【附歌】海桐皮平，祛风去湿，风湿疼痛，并治蹄伤。

【配伍】配木槿皮、輕粉、蛇床子、大黃，治疥癩；配白芥子、五灵脂、芸苔子、木鼈子，治蹄伤。

【附方】治馬伤蹄方（元亨疗馬集）。

海桐皮 白芥子 大黃 五灵脂 芸苔子 木鼈子 甘草
共为末，用黃米煮粥調药，攤于布上，裹蹄。

白藓皮（本草經）

【别名】白羊鮮、地羊鮮。

【主要产地】四川、江苏、安徽、山东、河北等地。

【药用部分】本品是芸香科多年生草本植物白藓的干燥根皮和支根。根皮呈卷曲，皮的內面为黄白色，厚約 1 分，有微弱的香气。根头分枝，支根長約 1 寸，粗約 1 分半至 2 分半，下端丛生須根，細微弯曲，外表呈灰白色或黄褐色，質堅而脆，皮厚木部小，皮部与木部常裂开，皮層容易分离。

【炮制】将根皮抽去心，晒干、切片；支根不抽心，晒干，切片；生用。

【性味和归經】味苦，性寒无毒。入脾、胃、膀胱、小腸四經。

【应用】本品能除湿热，祛风邪，通骨节，利水消肿。主治风湿疼痛、风疮疥癩、产后风寒、四肢肿痛等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】白蘚皮寒，除濕去風，利水消腫，疥癩亦用。

【配伍】配防風、荊芥、石膏、黃芩、梔子、桔梗、白朮、當歸、川芎、連翹、金銀花，治馬疥癩。

伸 筋 草

【別名】石松、日影葛。

【主要產地】各地均有出產，以南方各省產量較多。

【藥用部分】本品是石松科多年生草本植物，入藥用其乾燥全草。長達數尺，有許多分支枝莖，葉小細長而尖，如鱗片狀，密生于莖上。

【炮制】將原藥晒干，切成5分至8分長，生用或酒浸用。

【性味和歸經】味苦辛，性溫無毒。入肝經。

【應用】本品能祛風去邪，活血通筋。主治肌膚風邪、四肢厥冷、氣衰力弱、跌打損傷等症。

【用量】馬和牛6錢至1兩5錢；羊和豬1錢至4錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】伸筋草溫，活血通筋，肌膚麻木，祛風止痛。

【配伍】配羌活、五加皮、牛膝、秦艽，治風濕軟腳。

【附方】(1)治牛軟腳黃(江西)。

羌活 獨活 木通 五加皮 細辛 秦艽 牛膝 乳香

伸筋草 甘草 南藤

共研細末，米酒為引，以開水沖服。

(2)伸筋活血散(四川)：治牛跌打損傷，筋骨疼痛。

伸筋草 牛膝 土鱉 續斷 茜草 桂枝尖 廣陳皮 川烏頭 桃仁 紅花 劉寄奴

共为末，白酒为引，开水灌服。

大 血 藤

【别名】血藤、見血飞、紅藤、大活血。

【主要产地】安徽、江西、湖南、湖北、四川等地。

【药用部分】本品是大血藤科多年生落叶藤本植物，入药用其干燥根和莖。莖长达数丈，外表呈褐色，粗糙，为类圆柱形，有縱条紋沟，質地坚韧，不易折断；断面不平坦，皮層呈棕褐色，中心部呈赤褐色，有菊花紋及多数小孔。

【炮制】将原药浸潤，切片，晒干，浸酒用或生用。

【性味和归經】味甘咸，性平无毒。入肝、心包絡二經。

【应用】本品

能祛风止痛，活血补虛。主治筋骨疼痛、风湿軟脚、血虛体弱、跌打損伤等症。

【用量】馬和牛 6 錢至 1 两 5 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄




图 65 大血藤

5分至1錢。

【附歌】大血藤平，主治風痛，跌打損傷，軟腳筋痛。

【配伍】配牛膝、木瓜、蒼朮、防風、桂枝、五加皮、細辛、威靈仙、烏藥、羌活、薄荷（江西），治牛風濕病。

蒼耳子（本草經名葇耳）

【別名】野茄、粘衣子。

【主要產地】各地均產，以江蘇、福建產量為多。

【藥用部分】本品是菊科一年生草本植物蒼耳的果實。一般呈
棗核形或紡錘形，中間膨大而兩端尖銳，長約3—4分，粗約1分半
至2分余，全體生有硬鈎刺，稀密不勻，外表呈灰褐色或黃褐色；橫
斷面有二室，每室有卵圓形種子一粒，外皮呈灰綠色，常與種仁分
離，種仁類白色，富含油脂。

【炮制】採實曬干，炒熟搗去刺用，或酒拌蒸用。

【性味和歸經】味甘，性溫有小毒。入肺經。

【應用】本品能散風發汗，消腫止痛，明目殺蟲。主治風寒、頭
重、四肢拘攣、風濕痹痛、濕疹瘙癢、目暈、鼻濕、頸項癰癰、瘡瘍疥
癩等症。

【用量】馬和牛4錢至1兩；羊和豬1錢至3錢。

【附歌】蒼耳甘溫，勝濕散風，消腫止痛，治瘡止癢。

【配伍】配辛荑、薄荷、白芷，治風寒頭重；配硫黃、雄黃，可外
用治疥癩。

【附方】治牛馬肩部磨爛方（河南）。

蒼耳子 硫黃 綠豆

共炙後，搗為細末擦之，數日後即愈。

表 35 祛風止痛藥归納簡表

藥名	性 味 和 归 經	功 用	用 量 (錢)		
			馬 牛	羊 猪	兔 鷄
羌 活	辛苦溫,入膀胱、肝、腎	发汗解表,祛風止痛	5—15	1—4	0.2—0.5
獨 活	辛溫,入肝、腎	发汗解表,風濕痹痛	5—15	1—3	0.2—0.5
五加皮	辛溫,入肝、腎	祛風去濕,補虛強筋	5—16	2—4	0.5—1
白花蛇	甘咸溫,入肝經	祛風止痛,抽搐驚癇	3—5	0.8—2	—
烏 蛇	甘平,入肝經	祛風治癇,風濕痹痛	3—8	2—3	—
蒼 朮	辛苦溫,入脾、胃	祛濕健脾,骨節疼痛	5—20	1—4	0.4—0.8
秦 朮	苦辛平,入胃、大腸、肝、胆	祛風去濕,消腫止痛	5—15	1—4	0.4—0.6
烏 頭	辛甘大熱,入十二經	散風止痛,風濕拘攣	3—6	0.5—1	—
藁 本	辛溫,入膀胱經	散風解表,止痛止癢	4—10	1—2	0.2—0.5
威靈仙	辛咸溫,入膀胱經	祛風通關,止痛消腫	5—20	1—4	0.2—0.5
革 薊	苦平,入肝、胃	祛除風濕,治腰痹痛	5—20	1—4	0.5—1
海桐皮	苦平,入肝、腎	祛風去濕,止痛治癇	5—20	2—4	0.5—0.8
白蘞皮	苦寒,入脾、胃、膀胱、小腸	去風除熱,利水消腫	4—10	2—3	0.2—0.5
伸筋草	苦辛溫,入肝經	祛風去邪,活血通筋	6—15	1—4	0.2—0.5
大血藤	甘咸平,入肝、心包絡	祛風止痛,跌打損傷	6—15	2—4	0.5—1
蒼耳子	甘溫,入肺經	散風發汗,止痛殺虫	4—10	1—3	—

第十二章

安神鎮惊藥

凡能定心安神、鎮惊祛风的藥物，称为安神鎮惊藥。

此类藥物的功能，主要是祛除风邪，泻火清痰，从而使心宁神安，正气复原，并能消狂乱，鎮惊悸。因此，在病畜出現眼斜嘴歪，頸項强直，腰脊痹痛，四肢拘攣，发热狂乱，心风癲邪，心煩不安，肌肤抽搐等症狀时，都可应用此类藥物来治疗。

茲将本章藥物按其功用主治，分为安神定心藥和鎮惊熄风藥两节分別叙述。

第一节 安神定心藥

柏子仁（本草經）

【别名】側柏子仁、柏实、柏肉。

【主要产地】全国各地均产，其中以广东清远为多。

【藥用部分】本品是柏科常綠乔木側柏的子仁。全体为倒卵形，长约1分左右，粗約半分，外面呈淡黄色，光滑，富含油脂。

【炮制】生用、炒用或研烂置草紙內压榨去油用（柏肉霜）。

【性味和归經】味甘，性平无毒。入心、脾二經。

【应用】本品能补心脾，潤肺暖腎，活血調气，宁神止汗，潤燥通便。主治体虛多汗、惊悸、大便秘結等症。外用治疥癩。对于下泻多痰者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 1 錢至 3 錢。

【附歌】柏子仁平，补心暖腎，宁神歛汗，活血調气。

【配伍】配人参、白朮、牡蠣、麻黄根、五味子、半夏，用于养血安神，退热止自汗。

【附方】柏子仁散(元亨疗馬集)：治駱駝疥癩。

柏子仁 赤石脂 烏头炮过

上药为末，好熬为膏，作餅子大，炙干杵末，油調搽上。

酸棗仁 (本草經)

【别名】山枣仁、棘实、羊枣仁。

【主要产地】辽宁、山西、山东、陝西、河南、河北、云南等地。

【药用部分】本品是鼠李科落叶小乔木植物，入药用其干燥种子。呈扁卵圆形，长约 1 分半，厚约半分余；种皮呈暗赤色或紫紅色，滑潤有光；仁为淡黄色而柔软，富含油脂。

【炮制】揀淨原药核壳，取仁生用或炒用。

【性味和归經】味酸甘，性平无毒。入心、脾、肝、胆四經。

【应用】本品能定心安神，补肝醒脾，歛汗强筋。主治煩燥不安、肝热神昏、心虛惊恐、口干津少、四肢痹痛、体虛自汗等症。对于有实邪郁火者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 1 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。



图 66 酸 枣

左、酸枣原植物； 右、酸枣仁外形。

【附歌】酸枣仁平，歛汗安神，体弱自汗，四肢痹痛。

【配伍】配川芎、知母、茯苓、甘草，治心煩不臥；配茯神、党参、白芍、麦門冬、五味子，治体虛自汗。

【附方】治牛馬煩燥不安（湖北）。

酸枣仁 川芎 当归 熟地 远志

煎水灌服。

按：酸枣仁味酸甘而潤，用为健脾、安神、滋养、宁心要藥。在功用上有生熟之分，生则能导虛热，故治肝热神昏、多臥少起等症；熟则收歛津液，故治胆虛不臥、体弱自汗等症。

远志（本草經）

【别名】醒心杖、志筒、志肉。

【主要产地】河南、山西、山东、江苏及东北各省。

【药用部分】本品是远志科多年生草本植物，入药用其根。干燥品是抽去木心的根皮，呈细长圆筒形或弯曲的皮片，顶端附有残留的茎，下端有支根的疤痕，长约1寸4分，直径1分至2分，外面粗糙，有皱纹，呈灰棕色，质脆而易折断。

【炮制】将原根抽除木心，晒干，生用或蜜炙用。

【性味和归经】味苦，性温无毒。入心、肾二经。

【应用】本品能镇心安神，散瘀化痰，消癰肿。主治痰壅咳嗽、心虚惊恐、癰毒蔓肿、心经伏热、小便不利等症。外用治金疮癰肿，对于心经实火者宜少用。

【用量】马和牛4钱至1两5钱；羊和猪1钱至2钱；兔和鸡2分至4分。

【附歌】远志苦温，通肾安心，痰壅咳嗽，消肿定惊。

【配伍】配茵陈、党参、茯苓、大青、黄连、地骨皮、防风、甘草，治心经伏热；配菖蒲、薄荷、党参、明矾、谷精草、荆芥、茯苓，治咳嗽多惊，吐涎沫。

【附方】远志散（元亨疗马集）：治马心经壅极，眼赤如砂，不食水草。

远志 人参 当归 茯苓 白芍 玄参 白芷 甘草 黄连
山药 木通

以上共为末，加切细的姜为引，灌服。

按：凡痰涎壅塞心窍，可致神昏惊悸，精神恍惚，站臥不宁；如痰湿壅滞经络，则气血受阻而成结肿。远志味苦而性温，苦能入心，气温行血，所以能消痰利窍，使心气开通，则神安自宁；又痰化则血行，故可消结肿。因此，远志为安神、化痰、消结肿的要药。

天竹黃（升寶）

【別名】竹膏、天竺黃。

【主要產地】廣東、廣西以及越南等地。

【藥用部分】本品是禾本科植物苦竹或淡竹節間生成的塊狀物。是因竹生病後分泌的液汁凝結而成的。形狀不定，大小不一，大的約5—6分，小的僅半分多，外表呈灰褐色或灰白色，質脆而輕，容易破碎，其斷面平坦，以色白半透明及質輕而粘舌者為佳。

【炮制】原藥篩去灰屑，入煎，或研成細末，做成丸劑或散劑用。

【性味和歸經】味甘，性寒無毒。入心經。

【應用】本品能涼心安神，除風熱，消痰壅。主治熱病昏迷、中風痰壅、驚搖等症。對於無實証時禁忌應用。

【用量】馬和牛3錢至1兩；羊和豬1錢至2錢；兔和鷄1分至5分。

【附歌】天竹黃寒，涼心除風，昏迷安神，眼吊口緊。

【配伍】配茯苓、蔓荊子、全蠍、黃連、淡竹葉等，祛風熱，治偏頭風等；配防風、人參、川芎、干地黃、紫參、麻黃、天麻、刺蒺藜、甘草、黑附子（定風散），治牛患腦中黃。

茯神（本草經）

【別名】抱茯神、茯神木、統神、松腹。

【主要產地】雲南、浙江、湖北、安徽及各省山中大松樹根的周圍。

【藥用部分】本品是中心有細松根穿過的白茯苓。一般多切成薄方塊，長約1寸5分，厚約1—2分，質堅而脆；亦有質堅硬的，

并殘留黃褐色的松根薄片，粗約2分至5分，称抱木神。

【炮制】同于茯苓炮制方法。

【性味和归經】味甘淡，性平無毒。入心、肺、腎、脾、胃五經。

【应用】本品能寧心安神，鎮驚止痛。主治心虛驚悸、心痛、小便不利、水腫等症。“元亨疔馬集”說：“茯神鎮心。”

【用量】馬和牛6錢至1兩4錢。

【附歌】茯神甘平，寧心安神，心虛多驚，心痛不寧。

【配伍】配硃砂、雄黃(茯苓散)，治馬黑汗風；配黃芩、黃連、梔子、甘草、遠志、防風、黨參、硃砂、麻黃，治心痛；配硃砂、黃連、黨參，治心熱風邪。

龙齿(本草經)

【主要产地】主产于山西、山东、四川、广西、河北、河南等地，其他各地亦产之。

【药用部分】本品是古代脊椎动物的齿牙化石。为破碎的条状固体物，其破碎面粗糙而不平，呈灰褐色或棕褐色，質脆易碎，舐之則粘舌。

【炮制】煨用或生用。

【性味和归經】味濇，性涼無毒。入心、肝二經

【应用】本品能定心安神，清熱鎮驚。主治狂熱驚亂、馬受物驚、癱攣癲癇、心痛不安、泄痢膿血、公畜精滑；外用可生肌斂瘡。

【用量】馬和牛6錢至2兩。

【附歌】龙齿濇涼，寧心安神，心熱驚狂，心痛不寧。

【配伍】配烏賊骨，治外傷出血；配桂枝、大棗、牡蠣、蜀漆(即常山的苗)、生薑、甘草，治火邪驚狂，起臥不安。

按：龙齿、龙骨均为古代脊椎动物的化石，龙齿性重而質較粗，龙骨性純而細膩；龙齿能宁心安神，治狂热惊急、心痛不宁等症。龙骨则为固澇收斂要药，有止痢澇精、收汗定喘的功用；此为两者的区别。

硃砂（本草經）

【别名】丹砂、辰砂。

【主要产地】湖南、四川、辽宁、云南、貴州、河北、湖北等地，其中以湖南辰州出产者为佳，故名辰砂。

【原药形态】本品是金岩屬汞矿类的丹砂，有天然和人工制品两种。天然产品为淡紅色而透明的結晶，长达1分左右，質重堅脆，易劈裂研碎；人工产品为朱紅色如砂粒状的結晶。以不夹杂黑白的砂粒，且用手指捻搓而其色不染手者为佳。

【炮制】揀淨硃砂內的小鉄塊，研碎后水飞除淨油，然后取其极細的粉末应用，不宜見火。

【性味和归經】味甘，性微寒有毒。入心經。

【应用】本品能定心安神，鎮惊，解毒。主治心热风邪、心黄狂走、胆脹心惊、肝黄乱跳、破伤风、揭鞍风等症。

【用量】馬和牛1錢至2錢；猪3分至5分。

【附歌】硃砂甘寒，定心安神，心风癲邪，解毒除风。

【配伍】配茯神、黄連、人參、远志、独活，治心气黄；配雄黄、麝香、皂角、芸苔子（硃砂散），吹鼻治破伤风；配茯神、人參、防风、远志、郁金、黄芩、黄連、梔子（鎮心散），治馬心风黄；配乳香、樟脑、独活、胡黄連、菊花、荆芥、滑石、羌活、防风，治牛胆脹。

【附方】硃砂散（元亨疗馬集）：治馬心热风邪。

硃砂 茯神 黃連 人參

為細末，豬胆汁同調灌之。

按：硃砂能寧心安神，為鎮驚寧心要藥。由於入安神藥用途較廣，常須配合他藥應用。如海藏說：“同遠志、龍骨等養心氣，同當歸、丹參等養心血，同枸杞、地黃等養神，同厚朴、川椒等養脾，同南星、川烏等祛風。”

琥珀（別錄）

【別名】血珀、丹珀、明珀、紅松脂、香珀、物象珀。

【主要產地】雲南、廣東、廣西、河南、遼寧、陝西、新疆等地。

【原藥形態】本品是松杉科植物松樹的樹脂，埋藏地內年久變化而成石樣的物質。為半透明不整齊的固體塊狀物，大小不定，呈紅褐色或朱紅色，表面粗糙，質地輕脆，燒之發白煙，帶有松脂的芳香味。

【炮制】將原藥研成粉末用。

【性味和歸經】味甘，性平無毒。入心、肝、肺、膀胱四經。

【應用】本品能定心安神，散瘀利水，療金瘡，生肌肉，明目去翳。主治心熱風邪、腎痛、尿血淋漓、風濕腫痛、跌打瘀血等症。

【用量】馬和牛3錢至5錢；羊和豬1錢至1錢5分。

【附歌】琥珀甘平，定心安神，明目去翳，利水通淋。

【配伍】配瞿麥、黃柏、澤瀉、茯苓、知母，治膀胱積熱，小便淋滴。

【附方】琥珀散（四川）：治牛內傷勞役過度，便少帶血。

琥珀 黃柏 香附 茜草 牛膝 杜仲 續斷 藿香 補骨脂 骨碎補 茯苓 當歸 川芎

共为細末,开水冲服。

第二节 鎮惊熄風藥

天麻 (本草經名赤箭)

【別名】定風草、御風草、石箭、明天麻。

【主要产地】四川、西康、云南、貴州、湖南、陝西等地。

【藥用部分】本品是兰科多年生草本植物，入藥用其干燥根莖。根莖的中部較膨大，两头漸小，呈紡錘形，長約2寸至4寸，粗約1寸左右，外表呈灰白色或黃白色，稍透明，皺縮粗大，有縱橫的細紋沟，質地堅重如石，不易折斷，折斷面似大理石狀，呈黃白色，中心疏松，有特异的气味。

【炮制】將原藥水浸爛透，火炕軟切片，炕干或晒干，生用或煨熟用。

【性味和归經】味辛，性溫無毒。入肝經。

【应用】本品能祛風解表，鎮驚悸，壯筋骨。主治四肢拘攣、風寒濕痹、中風驚癇、眩暈倒地、破傷風、幼駒四六風、羊角風、揭鞍風等症。對於陰虛者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩；羊和猪1錢至2錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】天麻辛溫，解表除風，強筋活血，陰虛禁用。

【配伍】配天竹黃、防風、黃藥子、知母、大黃、黃連、黃耆、干地黄、貝母、郁金、桔梗、黃芩、甘草(天麻散，蕃牧纂驗方)，治馬心風奔走；配黨參、茯苓、川芎、荊芥、何首烏、防風、甘草、薄荷、蟬蛻，治脾虛中風。

【附方】天麻散(元亨疗马集):治马破伤风。

天麻 白附子炮 蝉蜕 天南星 烏蛇酒浸去骨 半夏 防风
藿香 川烏炮 蔓荆子 全蠍炒

加麝香 硃砂 膩粉等另研。

上为末,入麝香、硃砂、膩粉拌匀,温酒調灌。

按:天麻辛温而燥,凡风痰入于經絡、肢体麻木、四肢拘攣等症,以其辛散祛风鎮痙,温經行血,燥湿化痰,故用之疗效良好。“元亨疗马集”記載:“是药皆治病,灌风却用蛇,防风并半夏,最急是天麻。”东垣說:“肝虛不足者,天麻川芎以补之。”故天麻为风症要药。

钩藤 (別录)

【別名】钩钩、吊钩藤、钩藤钩、双钩耳。

【主要产地】广西、广东、江西、福建、浙江等地。

【药用部分】本品是茜草科蔓状灌木钩藤枝条上的干燥钩棘。



图 67 钩 藤

左、钩藤原植物； 右、药用部分外形：1.单钩，2.双钩。

鈎似鈎魚鈎狀，對生在枝節的兩側叫雙鈎，生在枝節一側的稱單鈎，外表呈赤褐色，平滑，質地堅硬。以赤褐色者為佳，另有一種呈淡黃色者最次。

【炮制】選取嫩鈎，曬干生用。

【性味和歸經】味甘，性微寒無毒。入肝、心包絡二經。

【應用】本品能祛風清熱，平肝鎮驚。主治頭風眼吊、眩暈頭低、發熱不寧、傷風感冒、破傷風、小兒四六風等症。對於無風熱及實火者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和雞 5 分至 8 分。

【附歌】鈎藤甘寒，平肝定驚，清熱除風，功效可稱。

【配伍】配白僵蚕、荊芥、全蠍、茯苓、天麻、明雄、硃砂、黃連、細辛，治幼駒風症。

【附方】治幼駒四六風方（陝西）。

鈎藤 白僵蚕 荊芥 全蠍 茯苓 天麻 薄荷 川大黃
車前 明雄 硃砂 黃連 姜半夏 細辛 甘草 竹葉
燈芯為引。

初患即服此方，可連灌二付；早期治療，效果較好。

天仙子（本草經）

【別名】蕘蓉子、牙疼子、發狂草。

【主要產地】廣東、甘肅、東北各地。

【藥用部分】本品是茄科多年生草本植物蕘蓉的乾燥種子。全株為扁圓形乃至圓盤形、稍長，或扁橢圓形、略短，間或作腎臟形，呈褐色或灰褐色。

【炮制】天仙子 10 两，以头醋 1 盞（約合原市称 10 两）煮干为度，再用黄牛乳汁浸一宿，至第二日乳汁变黑，即是真品；晒干搗篩用。

【性味和归經】味苦，性寒有毒。

【应用】本品能宁心安神，鎮惊止痛。主治癲狂、喘息、胃痛、肉痹拘急、流涎、自汗、脱肛等症。多食令动物狂走，須慎用。孕畜忌服。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两；羊和猪 1 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 6 分。

【附歌】天仙子寒，定痛鎮惊，宁心安神，癲狂效良。

【配伍】配黃連、黃芩、广木香、茯神等，治心热发狂；配杏仁、天門冬、麦門冬、款冬花、百部、萊菔子等，治喘咳。

【附方】治牛心热发狂方（四川）。

天仙子 广木香 茯神 黃連 黃芩 款冬花 夏枯草为引
同煎候温灌服。

按：天仙子有毒，誤投或过量，則可引起中毒。牲畜中毒的症状；初期如酒醉而步行蹣跚，咽燥，至后期則瞳仁散大，狂乱急奔。此时可急用甘草汁解之，或用綠豆、升麻等葯物解毒。

中国葯学大辞典載天仙子即蜈蚣之古籍別名，又“元亨疗馬集”中載有：“蜈蚣通腸，萆薢子治瀉，天仙子解热。”又該書載有“天仙散，治馬腹脹方”，方中天仙子所指何物，尙难肯定。但根据本草綱目及其他文献記載，天仙子即萆薢子。

蜈蚣（本草經）

【別名】天龙、百足虫、螂蛆、蜈蚣。

【主要产地】我国南方各地均有出产。

【药用部分】本品是蜈蚣科节肢动物蜈蚣的干燥尸体。体形扁平细长，长约4至6寸，宽约3—4分，躯干约由21个体节组成，头部呈红色或红褐色，有触角一对，背面呈暗绿色而发光，腹部为黄褐色而带绿光；第一体节有顎脚及步脚，其他各体节各有步脚一对，最后一节步脚延长如尾。有一种臭味。

【炮制】去头足，生用或炒用。

【性味和归经】味辛，性温有毒。入肝经。

【应用】本品能驱风散结，亦能截风，定惊解毒，消除瘀血。主治破伤风、揭鞍风、口噤、肢体风湿痛风、幼畜脐风、恶血积聚、金疮肿毒、蛇咬伤、结肿等症。孕畜忌服。

【用量】马和牛1钱至4钱；羊和猪2分至5分。

【附歌】蜈蚣辛温，散结驱风，腰硬口紧，解毒定惊。

【配伍】配天麻、天南星、蔓荆子、半夏、全蝎、防风、羌活、藿香、蝉蜕、升麻（河北），治破伤风。

【附方】黄雀园（元亨疗马集）：治牛虫子入耳。

黄雀粪 细辛 冰片 蜈蚣 蛇蜕皮

上药共为末，每服冷水丸，如鸡头大，淡盐汤灌耳内，内服，立见效。



图 68 蜈 蚣

左、蜈蚣外形；右、蜈蚣生药。

按：蜈蚣辛温有毒，屬阳之毒虫，善能制蛇，故有解蛇毒的功能。又辛能发散，温能行血散結，故能驅風散結，定惊解毒。但此药有毒，用量宜慎重，否則会造成中毒現象。若中蜈蚣毒，可急用蚯蚓、桑白皮或白盐解之。

全蠍（开宝）

【别名】蠍子、全虫、蚰蚸、伊祚、主簿虫。

【主要产地】河南、陝西及华北各地。

【药用部分】本品是蠍科节肢动物全蠍的干燥尸体。长约1寸至1寸8分，头胸部略作梯形，由七环节組成，前端有鉗角一对及脚須一对，背部塌陷皺縮，下面有步脚四对，头胸部及前腹部的背面呈兰褐色，腹部呈黄褐色，后腹部細长，由六环节組成，呈淡黄褐色，尾梢的毒刺为黄白色，而弯刺的尖端則呈棕黑色，体表常現白色，类似食盐結晶，質脆易断。有特异臭味。

【炮制】漂淡去刺，晒干生用。

【性味和归經】味甘辛，性平有毒。入肝經。

【应用】本品能驅風逐邪，鎮惊。主治眼目歪斜、风湿痹痛、幼畜四六风、破伤风、揭鞍风、筋攣抽搐等症。

【用量】馬和牛4錢至1两；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄2分至4分。

【附歌】全蠍辛平，主治中风，揭鞍破伤，主配防风。

【配伍】配防风，治歪嘴风；配天南星，治中风；配天南星、半



图69 全蠍

夏、天麻、麻黃，治急慢風症。

【附方】全蠍驅風散(四川)：治小牛四六風及各種風症。

全蠍 防風 天麻 菊花 殭蚕 蟬蛻 鈎藤 荊芥 天南星 藿香 半夏 竹葉

煎水，候溫灌服。如治破傷風，加麝香、蜈蚣。

按：全蠍甘辛性平而有毒，功能祛風解表，定驚散癰，主治風滯于經絡的破傷風、揭鞍風、風濕痹痛等症。用整身者稱全蠍，宜去足焙；用其尾稱為蠍尾，力尤猛峻。汪機說：“破傷風宜以全蠍，防風為主。”

白殭蚕（本草經）

【別名】直殭蚕，死冰，天虫、殭蟻子。

【主要產地】浙江、江蘇、四川、安徽及育蚕地區均產。

【藥用部分】本品是家蚕蛾科昆蟲的病蚕干燥尸体。虫体呈圓筒形，扭曲皺縮，長約1寸至1寸5分，粗約1分半，外表呈灰白色或灰褐色而帶有白霜，質堅硬，不易折斷；折斷面為黃白色，內夾雜明膠狀的透明塊。

【炮制】除去蚕絲，洗淨，晒干，用酒炒成黃色，或用細砂加熱炙成黃色用。

【性味和歸經】味咸辛，性平無毒。入心、肝、脾、肺四經。

【應用】本品能祛風解表，鎮驚化痰。主治口緊流涎、咽喉腫脹、中風咬牙、風熱驚悸、破傷風、四六風、癱瘓、皮生疥癩等症。對



圖 70 白殭蚕

1. 頭； 2. 尾。

于血虚而无风寒病邪者忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 3 錢；兔和鷄 5 分至 7 分。

【附歌】殭蚕咸平，鎮惊除风，咽喉腫脹，治四六风。

【配伍】配桑叶、鈎藤、菊花、黄芩、硃砂，治高热惊癇、抽搐；配明矾、姜汁，治喉痺喉风。

【附方】殭蚕驅风散(四川)：治小牛四六风。

白殭蚕 荆芥 防风 白芷 陈皮 杏仁 紫苑 鈎藤
款冬花 天麻 百部 桂枝 淡竹叶
水煎，候温灌服。

蛇蛻 (本草經)

【别名】蛇蛻皮、蛇皮、蛇壳、龙衣。

【主要产地】我国各地皆产。

【药用部分】本品是各种蛇蛻下的干燥皮膜。呈圓筒薄紙状，質甚輕而易破碎，呈半透明的灰白色，有特殊紋理和微腥气。

【炮制】酒洗阴干，炒焦用或生用。

【性味和归經】味咸甘，性平无毒。入肝經。

【应用】本品能祛风、定惊，退目翳，灭疥癩。主治喉风、目翳、恶疥癩、結肿疼痛、惊癇、腸风下血、疮內生蛆等症。

【用量】馬和牛 2 錢至 5 錢；羊和猪 5 分至 1 錢；兔和鷄 1 分至 3 分。

【附歌】蛇蛻咸平，除风定惊，喉风目翳，治癩杀虫。

【配伍】配知母、貝母、黄芩、大黄、荆芥、川芎、明矾、朴硝，治喉风；配石灰，解砒毒。

表 36 安神鎮驚藥歸納簡表

类别	药名	性味和归經	功 用	用 量(錢)			
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄	
安神定心藥	柏子仁	甘平,入心、脾	补心潤肺,活血調气	5—20	1—3	—	
	酸枣仁	酸甘平,入心、脾、肝、胆	定心安神,补肝强筋	5—20	1—4	0.2—0.5	
	远 志	苦温,入心、腎	鎮心安神,消痰散肿	4—15	1—2	0.2—0.4	
	天竹黄	甘寒,入心經	凉心安神,消痰除风	3—10	1—2	0.1—0.5	
	茯 神	甘淡平,入心、肺、腎、脾、胃	宁心安神,鎮惊止痛	6—14	—	—	
	龙 齿	瀉凉,入心、肝	宁心安神,清熱鎮惊	6—20	—	—	
鎮驚藥	硃 砂	甘微寒,入心經	定心安神,鎮惊解毒	1—2	0.3—0.5 (猪)	—	
	琥 珀	甘平,入心、肝、肺、膀胱	定心安神,散瘀止痛	3—5	1—1.5	—	
熄風藥	天 麻	辛温,入肝經	祛風解表,鎮惊壯筋	5—10	1—2	0.2—0.5	
	鈎 藤	甘微寒,入肝、心包絡	熄風清熱,平肝鎮惊	5—20	2—4	0.5—0.8	
	天仙子	苦寒	宁心安神,鎮惊止痛	5—10	1—4	0.4—0.6	
	蜈 蚣	辛温,入肝經	驅風散結,定惊解毒	1—4	0.2—0.5	—	
	全 蠍	甘辛平,入肝經	祛風解表,定惊散痹	4—10	1—3	0.2—0.4	
	白僵蚕	咸辛平,入心、肝、脾、肺	祛風解表,鎮惊化痰	4—20	2—3	0.5—0.7	
鎮驚藥	蛇 蛻	咸甘平,入肝經	除風退翳,定惊灭癩	2—5	0.5—1	1—3	

第十三章

平肝明目藥

凡能清除肝邪、消退眼目翳障的藥物，称为平肝明目藥。

肝藏血，外应于目。当肝受病邪侵襲后，特别是受风热外邪，眼目則表现出紅赤腫脹、暈障、怕光羞明、流淚不止等症狀。由于此类藥物，能祛除肝經病邪，消退眼瞼赤腫，外用点眼还有退除云翳的功能，因而当牲畜患有肝經风热、眼腫流淚、内外眼障、云翳遮睛、怕光羞明时，常以此类藥物来配方治疗。

木賊草（嘉祐）

【別名】木賊、木宅草、鏗草、笔管草。

【主要产地】陝西、山西、四川、江苏、浙江及东北等地。

【藥用部分】本品是木賊科常綠多年生草本植物木賊的干燥全草。莖中空，呈圓筒形，長約2尺余，粗約1—2分，外表粗糙，呈淺黃綠色，有平行縱稜綫8—30条；每隔1—3寸即有一节，节間有短筒形的叶鞘，高約2分余，基部为暗褐色，邊緣呈細鋸齒样，質薄而脆，易破碎；莖的頂端有毛笔头狀的子囊穗，高約2分，口嚼有如砂礫的感覚。

【炮制】洗淨泥土，剪掉黑色根部，去節切斷，曬干，篩去碎屑，生用。

【性味和歸經】味甘微苦，性平無毒。入肝、胆、肺三經。

【應用】本品能明目退翳，疏風發汗，止血利水。主治目疾流淚、翳膜障眼、腸風血痢、小便不利、水腫等症。凡陰虛火旺者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 3 錢；兔和雞 3 分至 5 分。

【附歌】木賊甘平，主退云翳，明目利水，腸風下血。

【配伍】配蒼朮、蟬蛻、黃芩，治肝經積熱，眼生翳膜；配黃芩、玄參、天竹黃、車前子、青葙子、石決明、甘草、大黃，治肝黃；配青葙子、石決明、決明子、石膏、龍胆草、玄精石、黃芩（難效散），治牛肝腸風痛。

按：木賊的形態類似麻黃，而升散功能也稍近似，但麻黃味辛性燥，專開腠理而使發汗；而木賊甘苦性平，入肝胆二經血分，能驅風散熱，使血上通于目，故為退翳明目之藥。



圖 71 木賊草

谷精草（開寶）

【別名】戴星草、文星草、流星草、鼓槌草。

【主要产地】我国各地水稻田中均产。

【药用部分】本品是谷精草科一年生草本植物，入药用其干燥的全草。长约6—7寸，外表呈黄绿色，每一茎的顶端生一个球状花序。外层有许多总苞片，为淡黄绿色，有鳞片状膜质多枚，内部是白色的小花。

【炮制】洗净阴干，扎成束或切断生用。

【性味和归经】味辛甘，性微温无毒。入肝、胃二经。

【应用】本品能清散风热，明目退翳。主治肝经风热、目生翳膜、畏光流泪、小便不利、喉痹等症。宋苏頌说：“可喂马令肥，主虫癞、毛焦病。”凡无风热者忌用。

【用量】马和牛6钱至2两；羊和猪4钱至5钱；兔和鸡4分至8分。

【附歌】谷精草辛，明目退翳，羞明流泪，解除肝热。

【配伍】配龙胆草、知母、黄柏、栀子、黄连、石决明、决明子、桔梗、甘草、青葙子、郁金、密蒙花、木香、白羊肝（泻肝散，中兽医诊疗经验第二集），治马内障眼；配闹羊花、蘆薈、甜瓜蒂、丁香、麝香、皂角（追虫散，安骥药方），治马虫癞病。

按：谷精草辛甘而微温，其质轻清，专行上焦，直抵头顶，故能疎散头巅风热、目疾生翳。



图 72 谷精草

石决明（別錄）

【別名】石厥明、九里螺、海蚌壳。

【主要产地】广东、福建、台湾及沿海各地。

【药用部分】本品是鲍科单壳类软体动物鲍鱼去净肉的干燥贝壳。呈卵圆形，长约3寸至5寸，宽约2寸至4寸，螺旋部甚小，背部弯曲，一侧边缘处生一列疣状突起和短管状的小孔，约10至20个，壳顶钝圆，高出壳面，壳面为绿褐色，内面为青白色，有珍珠样的光泽，质坚硬，不易破碎。

【炮制】洗净煎煮阴干，煨用或打碎生用。

【性味和归经】味咸，性平无毒，入肝、肺二经。

【应用】本品能祛风清热，明目退翳，利水。主治内障眼、外障眼、目翳遮睛、尿淋等症。凡脾胃虚寒及无实热者忌用。

【用量】马和牛6钱至1两5钱；羊和猪2钱至5钱；兔和鸡4分至8分。

【附歌】石决明平，清热退翳，青盲内障，利水通淋。

【配伍】配大黄、黄连、郁金、黄芩、栀子、没药、黄药子、黄耆、白药子、决明子，治肝经积热、白翳遮睛；配决明子、甘草、蕤仁、黄连、黄柏、秦皮、栀子（决明散，安驢药方），治马眼内青白晕、眼肿流泪。

【附方】泻肝散（元亨疗马集）：治马内障眼、黄浑凌睛。

石决明 草决明 龙胆草 旋复花 栀子 青葙子 郁金
黄连 甘草

上药为末，细切白羊肝加入，水同调拌匀，草饱灌之，隔日再灌。

决明子 (本草經)

【别名】草决明、金豆儿、馬蹄决明。

【主要产地】我国各地均产,以安徽、江苏产量較多。

【药用部分】本品是豆科一年生草本植物草决明的干燥种子。

呈长圓形的粒子,长约1分半,寬約1分,其一端斜向短尖凸出,为臍点,另一端显馬蹄形而微凹,为靨点;臍点与靨点間有一条暗黄色沟縫,外層呈綠褐色或棕色,光滑而皮薄;种仁显暗褐色,質地坚硬。

【炮制】晒干揀淨莢壳,生用或炒用。



图 73 决 明

左,决明原植物; 右下,药用部分外形(决明子)。

味咸,性平无毒。入肝,腎二經。

【应用】本品能补肝虛,泻肝风热,明目,潤腸通便。主治內障眼、外障眼、目赤流泪、青盲云翳、大便燥結等症。冷腸泄泻者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两; 羊和猪 2 錢至 4 錢; 兔和鷄 5 分

至1錢。

【附歌】决明子平，入肝除風，云翳眼障，潤腸便通。

【配伍】配黃耆、大黃、梔子、郁金、黃芩、黃連、沒藥、石决明、白朮子、黃朮子(决明散)，治馬肝經積熱、白翳遮睛；配龍胆草、青葙子等，治肝經風熱。

【附方】治肝經風熱(新牛馬經)。

决明子 石决明 龍胆草 青葙子 荊芥 防風 甘草 車前子 白茯苓

研末和溫水沖服。

密蒙花(開寶)

【別名】水錦花。

【主要產地】湖北、湖南、四川、陝西等地，以湖北資邱、老河口所產者為佳。

【藥用部分】本品是馬錢科常綠小喬木植物密蒙樹的乾燥花。花冠略彎曲，呈筒形，長約2—3分，基部較小，先端膨大，粗約1分，分為四裂，全體密被淡黃白色短柔毛，毛質閃亮，質輕，縱切花筒可見到花柱頂端亦有短柔毛，雄蕊的花粉囊為長圓形，顯褐色。

【炮制】將原藥酒浸一夜，候干，蜜拌蒸，晒干用。

【性味和歸經】味甘，性平微寒無毒。入肝經。

【應用】本品能潤肝明目，退雲翳。主治目赤流淚、羞明畏光、青盲雲翳、內障眼、外障眼等症。

【用量】馬和牛6錢至1兩5錢；羊和豬1錢至2錢；兔和雞2分至6分。

【附歌】密蒙花平，明目退翳，青盲障眼，目赤肿痛。

【配伍】配菊花、石决明、谷精草、玄参、黄芩、黄柏、枸杞(福建)，治牛眼红白翳。

【附方】蒙花散(四川)：治牛马眼生膜。

密蒙花 白菊花 柴胡 青皮 枯黄芩 木贼草 夜明砂
谷精草 焦黄柏 刺蒺藜 夏枯草
共为末，开水冲，候温灌服。

蕤仁 (本草經)

【别名】蕤核、白梭。

【主要产地】陕西、河南等地。

【药用部分】本品是蔷薇科灌木植物蕤木的干燥种子仁。种子长约2分余，厚约1分余，呈肾脏形，一端尖锐，另一端凹陷，种壳呈棕色，坚硬如木质，有脉状的皱纹；种仁显白色，其表层有棕色的薄膜，子叶肥厚，有一小胚芽。

【炮制】先捣除种壳，再将种仁先用热水浸去皮尖，分作两片，再加朴硝、木通、甘草三药同煮，然后取出本品晒干用。

【性味和归经】味甘，性温无毒。入心、肝、脾三经。

【应用】本品能清热，养血，明目，散结。主治骨眼、目赤流泪、翳膜遮睛、鼻衄、胸腹结气等症。

【用量】马和牛5钱至1两5钱；羊和猪2钱至4钱；兔和鸡2分至7分。

【附歌】蕤仁甘温，清热明目，目赤流泪，散结止衄。

【配伍】配石决明、决明子、黄连、黄柏、秦皮、栀子、菊花、龙胆草(蕤仁散)，治马两眼白蒙。

青葙子（本草經）

【別名】青囊子、还瞳子、野鷄冠。

【主要产地】我国各地田野間均产，以南方各地产量較多。。

【藥用部分】本品是莧科一年生草本植物青葙的种子。呈腎形或扁圓形，中間較厚，邊緣稍薄，一側微凹入，外表呈黑色，光亮而平滑；內仁为粉質，呈白色。

【炮制】晒干花穗，搓下种子，篩除杂屑晒干，生用。

【性味和归經】味苦，性微寒无毒。入肝經。

【应用】本品能清肝火，散风热，明目退翳，强筋骨，杀疥虫。主治肝經风热、骨眼、內障眼、外障眼、眼肿流泪、青盲、目翳、疥癩等症。凡瞳仁散大者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 两；羊和猪 1 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】青葙子苦，祛风明目，眼障生翳，身癢疥痒。

【配伍】配决明子、龙胆草、石决明、蟬蛻、木賊草、黃連、蒼朮、甘草、黃芩、郁金、防风、菊花（青葙子散），治馬眼肿。

【附方】洗肝散（蕃牧纂驗方）：治馬眼內有青白暈并眼肿、泪出、肝热。

青葙子 石决明 草决明 井泉石 石膏 龙胆草 旋复花
防风 菊花 黃連 甘草 黃芩

共为末，猪胆汁、蜜、白矾、浆水同調，草饱灌，隔日再灌。

秦皮（本草經）

【別名】梣皮、苦树皮、檮木皮、盆桂皮、石檀皮、苦櫪皮。

【主要产地】陕西、河南、山西、辽宁、青海等地。

【药用部分】本品是木犀科落叶小乔木植物，入药用其干燥树皮，一般多向内卷合成筒形，皮厚约半分余，外表为土褐色，有斜纵的条纹及钝稜，稜脊稍光泽，呈赤褐色，腹面显赤褐色而平坦，质地坚韧，横折不易断，易纵裂开，裂开而现纤维性。



图 74 秦 皮

左、秦皮原植物；右、药用部分外形：1. 斜纵的条纹及钝稜线。

【炮制】将原药洗刷干净，切断、晒干，生用。

【性味和归经】味苦，性微寒无毒，入肝、胆二经。

【应用】本品能清肝热，退目翳，利水，瀉腸。主治眼目红肿、羞明怕光、青翳白膜、风湿痹痛、肠热下痢等症。

【用量】马和牛 5 钱至 2 两；羊和猪 2 钱至 4 钱；兔和鸡 3 分至 5 分。

【附歌】秦皮苦寒，清肝热病，退翳利水，瀉腸止痢。

【配伍】配黃連、烏賊骨、硼砂、丁香、蕤仁、黃丹，治眼青白暈；配梔子、菊花、龍胆草，治眼生白霧。

【附方】治眼生白霧方（貴州）。

秦皮 蕤仁 甘草 梔子 菊花 黃芩 龍胆草 黃柏
石決明 決明子

共為末，加蜂蜜、豬胆為引，草后用溫開水沖服。

熊胆（唐本草）

【主要產地】西藏、四川、雲南、黑龍江、吉林等地。

【藥用部分】本品是熊科脊椎動物熊的乾燥胆汁凝塊。為扁平長卵形，塊狀或板狀，長約4寸至7寸，寬約3寸，厚約1分，上端漸小，並有用綫扎口的痕迹，外層為赤褐色，顯半透明的皮囊，質堅韌，剖開囊膜，內面有帶赤褐色半透明的胆汁凝塊，或黑褐色不透明的胆汁塊狀，質脆易碎。赤褐色的品質較佳，黑褐色的次之。

【炮制】將新鮮熊胆陰干後，放在兩塊薄木板夾上扎好，待乾燥，研末或開水溶化用。

【性味和歸經】味苦，性寒無毒。入心、肝、胃三經。

【應用】本品能清熱明目，殺蟲解毒。主治目赤腫脹、濕熱疔黃、腹痛、泄瀉等症。外用點眼，能退目翳。凡無實熱郁火者忌用。

【用量】馬和牛2錢至5錢；羊和豬4分至8分。

【附歌】熊胆苦寒，清熱平肝，目赤腫脹，外用點眼。

【配伍】配冰片，治赤目障翳。

【附方】治一切外傷（化膿生肌）方（河北）。

熊胆 血竭 淨輕粉 孩兒茶 乳香 沒藥 硼砂 米珠
麝香 硼砂 硃砂

共为細末，敷抹伤处。

夜明砂（本草經）

【别名】蝙蝠糞、天鼠屎、伏翼屎、飞鼠屎、石肝、黑砂星。

【主要产地】我国南方各省均产。

【药用部分】本品是蝙蝠科翼手类动物蝙蝠的干燥粪便。外表为黑褐色，呈两端尖的顆粒状，由多数微細片状細屑組成。屑片中有絹絲样光澤，通常粗約1分余，最大不超过2分，質輕松，有微臭气。

【炮制】揀淨篩去杂质泥土，晒干，焙用。

【性味和归經】味辛，性寒无毒。入肝經。

【应用】本品能清热活血，明目退翳。主治雀盲、内外眼障、目翳、头面癰肿、肺毒生疮等症。

【用量】馬和牛5錢至1两5錢；羊和猪1錢至2錢；兔和雞2分至7分。

【附歌】夜明砂寒，泻肝治盲，明目退翳，散癰消疮。

【配伍】配梔子、知母、白朮子、貝母、天花粉（夜明砂散），治馬肺生毒疮；配石决明、决明子、望月砂，治雀盲；配白菊花、銀花、紅花、刺楸皮、柴胡、青皮、木賊草、黄芩、牡丹皮、生地黃、龙胆草、夏枯草，治牛馬内外眼障。

刺蒺藜（本草經）

【别名】白蒺藜、七厘、旁通、屈人。

【主要产地】河南、湖北、山东、江苏、陕西、甘肃、安徽等地。

【药用部分】本品是蒺藜科一年生蔓性草本植物，入药用其果

实。果实由4至5个果瓣集合而成，多数分裂，每一果瓣呈斧状三角形，长约2分余，斧形的背面隆起，生许多短硬刺，多向外伸出，外表呈黄绿色或绿褐色，果皮坚厚，内藏卵状三角形种子2—3粒，色白，表面皱缩。

【炮制】原药炒黄，放白内忤去刺，筛净用。

【性味和归经】味苦，性温无毒。入肝、肺二经。

【应用】本品能平肝散风，泻肺胜湿，除风热，明眼目，破积聚。主治肝经风热、目赤多泪、瘀血积聚、乳汁不通、咳逆伤肺、肺风瘙痒、喉痹、尿血、肿痛等症。

【用量】马和牛6钱至1两5钱；羊和猪2钱至4钱；兔和鸡2分至5分。

【附歌】刺蒺藜温，平肝去热，除翳明目，泻肺渗湿。

【配伍】配菊花、蔓荆子、决明子、连翘、青箱子，治肝肾虚热生风，目赤多泪；配当归尾、菊花、木贼草、大黄、黄连、决明子，治肝热眼晕。

【附方】(1)治肝经热方(安徽)：治牛肝热眼晕、眼皮肿胀疼痛、流泪，生膜样眼屎。

刺蒺藜 当归尾 菊花 木贼草 大黄 黄连 决明子
生地黄 荆芥 龙胆草 青箱子 玄参 蝉蜕为引。

上药共研细末，温开水冲服。

(2)治肝热传眼方(甘肃)：治牛马肝热生风、外传于眼、睛生白膜、流泪不止、眼肿等。

刺蒺藜 木贼草 青皮 谷精草 黄芩 柴胡 蝉蜕 石决明
煨 决明子炒 青箱子 密蒙花 焦栀子

上药共研为末，温开水冲服。

按：刺蒺藜与沙苑蒺藜(即潼蒺藜)是两种不同的植物，不可混用。沙苑蒺藜是豆科多年生草本植物黄耆的种子，性甘温而无毒，入肝、肾二经，为补肾益精药，主治腰痛、精滑。

表 37 平肝明目药归纳简表

药 名	性 味 和 归 经	功 用	用 量 (钱)				
			马 牛	羊 猪	兔 鸡		
木贼草	甘苦平，入肝、胆、肺	明目退翳，发汗利水	5—20	2—3	0.3—0.5		
谷精草	辛甘微温，入肝、胃	清散风热，明目退翳	6—20	4—5	0.4—0.8		
石决明	咸平，入肝、肺	散风清热，明目退翳	6—15	2—5	0.4—0.8		
决明子	咸平，入肝、肾	泻肝风热，明目润肠	5—20	2—4	0.5—1		
密蒙花	甘平微寒，入肝经	润肝明目，主退云翳	6—15	1—2	0.2—0.6		
蕤 仁	甘温，入心、肝、脾	清热养血，明目散结	5—15	2—4	0.2—0.7		
青箱子	苦微寒，入肝经	清肝胆火，明目退翳	5—10	1—4	0.2—0.5		
秦 皮	苦微寒，入肝、胆	清热退翳，利水瀉腸	5—20	2—4	0.3—0.5		
熊 胆	苦寒，入心、肝、胃	清热平肝，治目赤肿	2—5	0.4—0.8	—		
夜明砂	辛寒，入肝经	泻肝治盲，明目退翳	5—15	1—2	0.2—0.7		
刺蒺藜	苦温，入肝、肺	平肝去热，除翳明目	6—15	2—4	0.2—0.5		

第十四章

补 养 药

凡能补气血、助阳养阴、主治虚证的药物，就称为补养药。虚证是元气亏损，肾命不足的总称，主发于久病、重病、大泻或大出血之后，以及饲养失调，公畜配种过多等。虚证按其病性，可分为气虚、阳虚、血虚、阴虚四类；补养药按其功能可分为补气药、助阳药、补血药、养阴药等四类。

气虚者常见精神不振，四肢倦怠，脉行迟细等症，应使用补气药；阳虚者常见畏寒发战，脾虚大便泄泻，小便频数，阳萎举而不坚，垂缕不收等症，宜用补气助阳药；血虚者常见口色苍白，心虚脉迟等症，宜用补血安神药；阴虚者常见津液干枯，虚热自汗等症，宜用养阴药。

气血和阴阳，是互相关连的，如气虚常兼血虚，血虚又常引起阴虚，阴虚常包括气虚，气虚又常引起阳虚。故实际上没有单是一种虚证出现的。而药物的功能亦是一样，助阳药大多有补气的功效，养阴药大多有补血的功效，此外，还有气血两亏，阴阳俱虚之证，所以补养药的功能和主治，必须全面的互相连系，灵活掌握，才能结合实际上的应用。

在病邪未除,不宜应用补养药;但是正气过虚,亦可以扶正去邪的方法,适当地运用。凡有补气、助阳和补血作用的药物,大多属于温热药,对于阴虚火旺者应禁用;具有养阴作用的药物则性多寒凉,所以对于阳虚阴盛、脾胃虚弱者,不宜应用。

在临床上由于补气助阳药与补血养阴药经常配伍应用,而又各有其不同的功效,故分节叙述之。

第一节 补气助阳药

人参(本草经)

【别名】人蔘。

【主要产地】本品主产于吉林省长白山区抚松、通化、辑安、桦甸、宽甸子等处及朝鲜北部金铜山区,近年来已采用人工的方法栽培。

【药用部分】本品是五加科多年生草本植物,入药用其根。东北人参可分为野山人参及园参二种:

野山人参:干燥根呈纺锤形,中间略膨大,下部常有分支,形状屈曲,有的略似人形,全长约5寸至8寸,中间粗约3分至5分,外表呈黄白色,栓皮多已剥去;上端有细长的根茎(俗称芦头),根上部密生细横皱,但下部横皱较稀,支根有时现纵皱,质硬而脆;横断面为黄白色,平坦而有明显成层的环纹。

园参:是人工栽培品,其根亦呈纺锤形,但较短而直,中间粗约5分至6分,芦头较短而粗,其他同于野山参。

人参以生长年多,个体坚实粗大,皱纹细密的野山参为最好,园参较次。

【炮制】将原药切片用或研细用。

【保管】密闭，置阴凉干燥处，不可晒；如发现体软，应即放入石灰缸中密封保存，以免失效或虫蛀。

【性味和归经】味甘微苦，性温无毒。入脾、肺二经。

【应用】本品能大补元气、益血生津、宁神定惊。主治肺虚喘甚、脾虚泄泻、五劳七伤、口干自汗、惊悸等症。反藜蘆。对于实证者忌用。

【用量】馬和牛 3 錢至 7 錢。

【附歌】人参甘温，大补元气，益血生津，助阳补虚。

【配伍】配沙参、玄参、丹参、贝母、麦门冬、天门冬、知母、甘草、紫苏子、馬兜鈴、苦参（人参散，蕃牧纂驗方），治馬肺燥、皮痒；配茯苓、远志、防风、麦门冬、薄荷、甘草、冰片、牛黄（人参散，安驥药方），治馬心經伏热，非时惊狂倒地。

【附方】止渴人参散（安驥药方），治馬发热、貪水、草慢病。

人参 茯苓 川黃連 葛根 烏梅 甘草 石膏 蘆根
共为末，蜜水同煎沸，放冷，先用新汲水飲了后灌之。

按：人参虽是虚证的补药，因其价格昂贵，而家畜用量又大，故一般都用党参代替。又因其作用主要是补气，而气血又是相互依存，气依附于血，血依气才能畅行，所以失血虚脱，气亦随之而脱，此时若单用补血药，往往缓不济急，必须采用大补元气以固脱的方法，所谓“有形之血不能速生，无形之气所当急固。”就是这个含意。

党参（从新）

【主要产地】山西、甘肃、河南、陕西、四川、河北等地。

【药用部分】本品是桔梗科多年生蔓性草本植物，入药用其

根。呈圆柱形或紡錘形，一般长约4至6寸，粗约2至6分，外表呈土黄色或淡黄褐色，常有縱皺及横褶，頂端密布着多数莖的殘基及芽痕，質軟；横断面不平坦，外層皮部呈淡黄褐色，中心木部为黄白色，有特殊的气味。

【炮制】将原药湿润，切片，或切成半寸长的小段，晒干生用或蜜炙用。

【性味和归經】味甘，性平无毒。入肺、脾二經。

【应用】本品能补中益气、生津止渴、和脾胃、除煩热。主治脾胃虛弱、毛焦身瘦、四肢倦怠、肺劳咳嗽、气虛煩渴等症。反藜蘆。凡实证者忌用。

【用量】馬和牛6錢至2两；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】党参甘平，止渴生津，补中益气，和脾有力。

【配伍】配白朮、茯苓、甘草、白扁豆、陈皮，治脾胃虛弱，谷草不化，或吐或泻等症。

【附方】(1)治胎衣不下方(山西)。



图 75 党 参

左、党参原植物；右、药用部分外形：
1. 莖的殘基，2. 芽痕，3. 横褶。

党参 当归 黄耆 炙龟板 海金砂 大黄 川芎 滑石
柞木枝 莪朮 紅花 天花粉 麻油
上药煎水内服。

(2)党参散(河北):治子宫脱。

党参 当归 川芎 黄耆 荆芥穗 陈皮 防风 升麻 白
朮 艾叶 紅花 甘草 白酒
上药研末,用开水冲,候温加酒灌服。

按:党参味甘性平,功能补中益气,潤肺生津,为兽医常用的补药,因其作用能健脾而不燥,滋胃而不湿,潤肺而不犯寒凉,养血而不偏滋膩,且鼓舞清阳振动中气,而无剛燥之弊,因而为治疗牲畜虛証的要药。

黄耆 (本草經)

【别名】黄芪、綿芪、正小皮、北芪、庫倫芪、建芪。

【主要产地】主产于陝西、河北、四川、甘肅,其中以东北庫倫及山西綿上出产的为最好。

【药用部分】本品是豆科多年生草本植物,入药用其根。干燥根呈圓柱形,通常多截成长約1至2尺的段落,外表呈灰褐色,有縱皺或縱沟,多数微現絞轉,有不明显的皮孔,質輕松而硬,折断面外層皮部显灰白色,为纖維性,中央木部为黄白色,二層間呈淡褐色环,有裂隙自中心呈放射状发出,无特殊气味。

【炮制】将原药洗净,湿润后即切成斜薄片,生用、炒用,或蜜炙用。

【性味和归經】味甘,性温无毒。入肺、脾二經。

【应用】本品能补气固表,止汗利尿,益脾胃,除虛热,托疮生




图76 黄耆

左、黄耆原植物；右、药用部分外形及横切面：

1. 纡轉的縱皺，2. 皮孔，3. 放射狀裂隙。

肌，排膿止痛。主治表虛自汗、脾虛泄瀉、虛勞羸瘦、水腫尿少、虛喘、瘡瘍久潰不斂等症。凡內有積滯實証、外有表邪及胸膈脹滿、腸胃滯積者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和雞 4 分至 6 分。

【附歌】黃耆甘溫，補氣固表，脾虛泄瀉，托瘡排膿。

【配伍】配青皮、茯苓、黃柏、人參、蒼朮、升麻、澤瀉、甘草、生地黃（益氣黃耆散），治馬草慢，四肢虛腫無力；配白朮、陳皮、當歸身、升麻、柴胡、人參、甘草（補中益氣湯），治內傷及陽虛外感。

按：黄耆甘温，补益中气，因其专走皮肤肌肉，故有固表止汗作用。它不仅能治表虚自汗，脾虚泄泻之症，并能治肌肉之癰，經脉之疽，由于癰疽日久，正气衰微，致三焦之气不温肌肉，则为久败疮黄。黄耆助三焦正气以温肌肉，故可治之。癰疽未潰，化血为膿，痛不可忍，黄耆补气助阳，阳气化血而排膿，膿排则痛止。元素說：“黄耆甘温純阳，其用有五，补諸虛不足一也，益元气二也，壮脾胃三也，去肌热四也，排膿止痛，活血生血，内托癰疽，为疮家聖药五也。”

黄耆虽为固表要药，往往是同他药配伍应用，如配桂枝、白芍、防风、甘草，可治伤风表虚自汗；如配蒼朮、生地黄、牛膝、黄柏，则治湿毒生疮；配白芷、白芨、甘草、金銀花、皂角刺，则能排膿止痛。

山药（本草經）

【别名】薯蕷、淮山、怀山药、汀山、光条、毛条。

【主要产地】河南、山西、山东、河北、江西、湖北、福建、广西、湖南等地。

【药用部分】本品是薯蕷科多年生藤本植物，入药用其根。呈圆柱形，中間略膨大，两端較小，通常切成长約4至5寸的段落，除去栓皮，外表粉白光洁，平滑而細膩，有淡褐色斑点，質重而堅；橫断面平坦，为雪白粉質。以个体肥大，色白多粉而細膩者較好。

【炮制】将原药以清水浸，一日換一次清水，待其中心部潤透軟化，切成圓片或斜片，生用或炒黄用（注意保存，防止发霉及虫蛀）。

【性味和归經】味甘，性平无毒。入脾、胃、肺、腎四經。

【应用】本品能益肺腎、清虛热、健脾胃、扶虛弱。主治体虛羸瘦、虛劳咳嗽、腎虛腰痛、阳虛精脫、煩热口渴、五劳七伤、泄泻久痢。

等症。外用可生搗敷癰疮，消肿硬。凡有实证湿热者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 5 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】山药甘平，补中益气，健脾壮肾，泄泻久痢。

【配伍】配蓮肉、白朮、萆薢、地骨皮、槟榔、羌活、独活（补肾通气散，师皇安驥集），治馬腎虛腰痛、尿淋瀝；配党参、白芍、黄耆，治劳伤。

【附方】治牛、馬慢性衰弱，腸胃病，消化不良等症方（湖北）。

山药 地黄 白朮

煎水灌服。

按：本品性味甘平，不寒不燥，功能益肺腎，清虛熱，健脾胃，扶虛弱，故能治瘦弱無力，泄瀉久痢，腸弱不固，腎虛腰痛，精滑，虛咳等症，也是補益虛損要藥之一。但病畜脾虛濕盛者忌用。

白朮（本草經）

【別名】冬朮、野于朮、野朮、天生朮。

【主要产地】湖南、湖北、浙江、江西、山西、安徽等地。

【药用部分】白朮是菊科多年生草本植物，入藥用其根。干燥根形長而肥大，處處有塊壘狀的突起或連珠狀支根，屈曲不整，長約 1 寸至 3 寸，粗約 5 分至寸許，外表呈灰褐色，上端有莖的殘基，下部稍膨大，有多數斷續的縱皺及溝紋，質硬而脆，其橫斷面為黃白色或淡褐色而不平坦，往往有小孔洞。富有芳香气味。

【炮制】將原藥以溫水或米泔水浸透，切片，晒干，生用、土炒或面炒用。

【性味和归經】味甘苦，性微溫而無毒。入脾、胃二經。

【应用】本品能健脾补中，燥湿益气，温胃消食，化痰利水，进食安胎。主治中气衰弱，脾虚泄泻，伤水冷痛，寒湿痰涎，四肢湿肿，水肿，表虚自汗，胎动不安等症。对于阴虚燥渴及草料积滞者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 4 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 6 分。



图 77 白 朮

左、白朮原植物；右下、药用部分外形。

【附歌】白朮甘温，暖胃消食，燥湿化痰，安胎和中。

【配伍】配陈皮、芍药、茯苓、厚朴、葛根、甘草（益中散，师皇安驪集），治馬下痢；配黄耆、白芍、能止汗；配茯苓、桑白皮、防己、射干、槟榔、泽泻，治水肿。

【附方】(1)白朮散（元亨疗馬集）：治馬胎动不安。

白朮 当归 川芎 人参 甘草 砂仁 熟地黄 陈皮
紫苏 黄芩 白芍 阿胶

上药为末，生姜、水同煎沸，候温灌之。

(2)白朮散（元亨疗馬集）：治牛患脾病。

白朮 蒼朮 紫苑 牛膝 麻黃 厚朴 當歸 藁本

以上為末，用酒煎沸溫服，灌之見效。

(3)治小豬下奶屎(仔豬白痢方)(廣西)。

白朮 枳殼 厚朴 白豆蔻 甘草

上藥煎水給母豬吃或混入粥內給小豬吃，如痢帶黃色時，可加入百合、龍胆草。

按：白朮甘苦而微溫，善能燥濕，健脾補中，功效勝於蒼朮。主治表虛自汗，心腹脹滿，寒濕痰涎，脾虛泄瀉，胃虛積食，四肢濕腫，胎動不安等症。元素說：“除濕益氣，和中補陽，消痰逐水，生津止渴，止瀉痢，消足脛濕腫，除胃中熱，肌熱，得枳實消痞滿氣分，佐黃芩，則安胎清熱。”但上述的生津止渴，似與燥濕之性相矛盾，其實這裡所謂口渴，是由於脾虛不能輸布津液，津液不能上承而渴的病症，與陰虛燥渴的病症，有本質上的不同。

甘草（本草經）

【別名】粉甘草、靈草、蜜草、國老。

【主要產地】陝西、山西、甘肅、內蒙以及東北等地。

【藥用部分】本品是豆科多年生草本植物，入藥用其根和根莖。呈圓柱形，通常多切成長約1至2尺的段落，粗約3分至6分，外表栓皮呈紫褐色或黑褐色，往往帶有裂紋與屈曲的縱皺紋及溝槽，質地堅硬；橫斷面為纖維性而平整，呈鮮黃色，皮層與木部中間有形成層環紋，常有眾多裂隙放射狀散出。若削去外皮的稱為“白粉草”，其外表呈鮮黃色或淡黃色而較平坦，且常有縱裂隙。

甘草以外皮呈紫褐色，緊密細致，質堅實而重者為上品。另有一種苦甘草，外表呈深黃色，質較硬，味苦，不可供藥用。

【炮制】将原药去皮，水潤透后切片，生用或蜜炙用。

【性味和归經】味甘，性平(炙后微温)无毒。通行十二經。

【应用】本品能补脾胃，泻火清热，解毒止渴，調和諸药；但泻火宜生用，温中宜炙用。主治：炙用治脾虚泄泻、胃热口渴、肺虚咳嗽，生用治咽痛、疮黄肿毒、幼畜胎毒等症。反大戟、芫花、甘遂和海藻。

【用量】馬和牛 4 錢至 2 两；羊和猪 1 錢至 3 錢；兔和鷄 2 分至 1 錢。

【附歌】甘草甘平，調和諸药，生泻炙补，解毒良好。

【配伍】配葶藶、桔梗、貝母、板藍根、猪苓(凉肺散，蕃牧纂驗方)，治馬肺喘及非时热喘；配人参、白朮、茯苓，治一切阳虚气弱；配玄参、牛蒡子、桔梗、黄芩，治咽喉肿痛。

【附方】(1)治鷄泄泻方(兽医国药及处方)。

甘草研末明矾

先将明矾加水溶解后再与甘草混合，灌服。

(2)治馬慢肝黄方(司牧安驥集)。

甘草 防风 川羌活 黄連 黄药子 青葙子 砂糖
綠豆为引，煎服。

(3)治馬慢腸黄方(司牧安驥集)。

甘草 大黃 黄药子 黄連 猪脂 炒盐 豆豉
共为末，加温水灌服。

按：甘草味甘性平，功能补脾和中，潤肺止咳，清热解毒，为緩和調补要药。尤其是調和百药，使不同性質之药能協調一致发挥作用，是其他諸药所不能及的，所以有国老之称。例如麻黄之开泄，必得甘草以监之；附子之燥烈，必得甘草以制之；若走窜药配

之，則可斂其鋒，攻下藥配之，則可不傷于峻猛。汪昂說：“甘草有補有瀉，能表能里，可升可降，味甘，生用氣平，補脾胃不足而瀉心火；炙用氣溫，補三焦元氣而散表寒。入和劑則補益，入汗劑則解肌，入涼劑則瀉邪熱，入峻劑則緩正氣，入潤劑則養陰血，能調和諸藥，使之不爭，生肌止痛，通行十二經，解百藥毒。”

甘草的應用範圍很廣，往往是同他藥配伍應用，如配黃耆、防風，能運毒走表；配紫花地丁、金銀花、菊花、夏枯草、貝母、益母草、白芨、白芷，可治一切疔腫；配黃連、木通、赤芍藥、生地黃，能瀉心經有余之火；配麥門冬、蘇子、枇杷葉，能下肺氣；配黨參、肉桂、干姜，則能溫中。

大 棗（本草經）

【別名】干棗、紅棗、棗。

【主要產地】陝西、甘肅、河南、河北、山東、江蘇、福建、安徽等地。

【藥用部分】本品是鼠李科落葉喬木，入藥用其果實。呈橢圓形，長約6分至1寸，粗約5至6分，外表呈赤褐色或紫紅色，有顯著的皺褶，質柔軟，果肉顯淡褐色，疏松而油潤，核如橄欖形，兩端尖銳，長約3至4分，質地堅硬，種仁顯類白色。

【炮制】原藥生用，或蒸透後，剝去皮核，搗如泥用。

【性味和歸經】味甘，性溫無毒。入脾、胃二經。

【應用】本品能補脾益氣，養胃和中，調和氣血，和解百藥，潤心肺，治勞傷虛損。主治脾虛泄瀉、心腹邪氣等症。多作為引藥應用。

【用量】馬和牛8錢至2兩；羊和豬2錢至5錢；兔和鷄5分

至1錢。

【附歌】大枣甘温，补脾益气，养胃生津，調和营卫。

【配伍】配枸杞子、补骨脂、肉蓯蓉(兽医中药类編)，治公畜阳萎。

按：大枣治病，主为調和营卫，輸布津液，暢通气血，即扶正逐邪。在古今方中，多加姜、枣为引，乃取其药性純而使疗效更佳，士瀛說：“里不足者以甘补之，形不足者温之以气，大枣甘温，能补脾胃而津液自生，則十二經脉自通。”

肉蓯蓉(本草經)

【别名】大云、淡大云、肉松容、仲容、寸云。

【主要产地】四川、陝西、山西、山东、河南、河北、甘肃、宁夏等地。

【药用部分】本品是列当科一年生寄生性草本植物，入药用其全草。其根莖呈扁圓柱形，稍弯曲，长约4寸至9寸；粗約1至2寸，外表密被着赤褐色或黃褐色的鱗片叶；横断面呈深褐色，有暗黃色或深褐色屈曲的紋理，中心部常現空洞。

【炮制】采集后用盐漬，称“咸蓯蓉”，以便保存；如再以清水漂洗，蒸熟晒干，称“淡蓯蓉”；原药切片用。

【性味和归經】味甘酸咸，性温无毒。入腎經。

【应用】本品能滋腎壯阳，补中益精，潤燥滑腸，主治腰膝寒痛、五劳七伤、公畜阳萎、精滑、垂縷不收、母畜不孕、燥結等症。凡泄瀉及腎内有热者忌用。

【用量】馬和牛5錢至2两；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】菴蓉甘温，滋肾壮阳，补中益精，润燥滑肠。

【配伍】配补骨脂、山茱萸，治阳萎无力；配当归、地黄、鹿胶、麦門冬，治母畜不孕；配萆澄茄、白附子、苦楝子、当归、槟榔、豆蔻、肉桂、茴香、木通（菴蓉散），治馬肾败，垂縷不收。

杜仲（本草經）

【别名】思仲、思仙、綿杜仲。

【主要产地】四川、貴州、河南、湖北、湖南、广西、安徽、甘肃、陝西、浙江、福建、云南等地。

【药用部分】本品是杜仲科落叶乔木，入药用其干燥的树皮。




图 78 杜 仲

左、杜仲原植物；右、药用部分外形：1. 外表面，2. 沟纹，3. 内面，4. 白色牵絲。

其皮呈微彎曲的板片狀，通常切成長約尺余的長條，外表呈灰褐色或黑褐色，有斷續縱長的溝紋，內面呈紫褐色，平滑而質脆；折斷后有顯著的銀白色牽絲，彈性及拉力很強。

【炮制】原藥以清水浸一夜，切成絲或長方形的塊狀，晒干，生用或鹽炒用。

【性味和歸經】味甘微辛，性溫無毒。入肝、腎二經。

【應用】本品能暖腰腎，強筋健骨，破滯氣，潤肝燥，補肝血，益精氣，安胎。主治腎冷拖腰、四肢痠痛、下焦虛冷、筋骨寒痛、胎動不安等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和雞 4 分至 1 錢。

【附歌】杜仲甘溫，暖腰補腎，強筋健骨，安胎亦效。

【配伍】配桑寄生、續斷、山茱萸，治腰脊疼痛；配續斷、枸杞子、牛膝、菟絲子，治腎虛腰痛，下部軟弱無力。

【附方】治牛風濕痹方（湖北）。

杜仲 牛膝 山藥 秦艽 當歸 五加皮 知母 薏苡仁
樟腦 谷酒

共研細末，溫開水沖服。

按：杜仲味甘微辛，其氣溫平，甘溫能補，微辛能潤，故能入肝補腎，謂之“子能令母實”。因肝主筋，腎主骨，腎充則骨強，肝充則筋健，故為健筋骨，補腰腎的要藥。李言聞說：“腰痛不已，屬腎虛。痛有定處，屬死血，往來走痛，屬痰。腰冷身重，遇寒便發，屬寒濕。或痛或止，屬濕熱。而其原本于腎虛，以腰者，腎之府也，論治本，俱可用杜仲，加佐使以治其標可也。”

續断 (本草經)

【别名】六汗、川續断、接骨。

【主要产地】四川、湖北、河北、广东等地。

【药用部分】本品是山蘿卜科多年生草本植物，入药用其干燥根。略呈紡錘形或圓柱形，稍弯曲，长约3—4寸，粗約2—3分，外表呈褐色或灰褐色，有不規則的皺縮，質硬而脆，折断面不平坦，內部显藍褐色，散布有少数黄色的斑点。




图79 續断

左、續断原植物；右、药用部分外形；1. 皺縮(縱沟紋)。

【炮制】水浸片刻，濾出爛透，切片晒干，生用，酒炒或鹽水炒用。

【性味和歸經】味苦辛，性溫無毒。入肝、腎二經。

【應用】本品能補肝腎，續筋骨，通血脈，利骨節，止痛生肌，益精安胎。主治筋骨折斷、瘀血積滯、腰脊疼痛、尿血、癰瘍疔毒、產後諸病、乳癰、骨節腫痛等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和雞 2 分至 6 分。

【附歌】續斷苦溫，接骨續筋，功補肝腎，止痛益精。

【配伍】配獨活、桑寄生、杜仲，治腰膝痠痛；配當歸、桃仁、川芎、牛膝、肉桂、延胡索，治跌打損傷，筋骨疼痛。

【附方】(1)續斷散(司牧安驥集)：治馬黑疔疮。

續斷 晚蚕砂 干姜燒灰 皂角燒存性

上藥為末，醋打面糊調勻藥末，塗之。

(2)接骨方(甘肅)：治骨頭折斷。

續斷 石膏 乳香 沒藥

上藥研末，加童便為引，溫開水沖服

(3)用于牛、馬安胎及預防小產方(湖北)。

續斷 杜仲 白朮 當歸

上藥煎水，候溫灌服。

按：續斷、杜仲均有補益肝腎的作用，治療腰痛、腳軟等症，二者常配伍使用。但是續斷苦溫，用于通理血脈，續筋骨，治跌打損傷較好；而杜仲甘溫，溫補偏勝，則常用為腎虛腰痛及安胎藥。

續斷功能補益筋骨，破瘀生新，故常配他藥用于金疮折跌及胎疾的治療，仲醇說：“欲行血理傷，當與當歸、牛膝、肉桂、延胡索同

用。欲止血療崩中補不足，則與阿膠、地黃、麥冬、杜仲、人參、山茱萸、枸杞子、黃耆、五味同用。欲安胎則與涼血補血順氣藥同用。欲療金瘡，則與金瘡藥同用。”

補骨脂（開寶）

【別名】破故紙、故脂、婆固紙、故芷。

【主要產地】四川、廣東、河南、江西、安徽等地。

【藥用部分】本品是豆科一年生草本植物，入藥用其干燥成熟的種子。為呈腎臟形或卵圓形的小粒子，不規則而扁平，長約1分至1分半。寬約1分，外表呈暗褐色或黑褐色，有細微的顆粒狀皺縮，中心微凹，質稍堅硬；種仁呈淡黃褐色，含有油脂，具有濃厚的芳香气味。

【炮制】將原藥鹽水炒或酒浸，打碎用。

【性味和歸經】味辛苦，性大溫無毒。入脾、腎、心包三經。

【應用】本品能暖腰補腎，強壯筋骨，補命門相火。主治氣血兩傷、脾虛泄瀉、腎寒尿多、五勞七傷、公畜陽萎精滑、腰膝寒痛等症。對於尿血、糞結者忌用。

【用量】馬和牛4錢至1兩2錢；羊和豬2錢至4錢；兔和雞3分至6分。

【附歌】補骨脂溫，助陽固精，腰膝寒痛，鹽酒炒用。

【配伍】配厚朴、胡蘆巴、茴香、肉豆蔻，治腎冷、腰膝痛；配肉豆蔻、五味子、吳茱萸，治脾腎虛弱、泄瀉；配牛膝、骨碎補、桂心，治腰膝痛。

【附方】（1）治馬放空遺精方（山西）。

補骨脂 五味子 黑杜仲 巴戟天 菟絲子 續斷 肉蓯蓉

刺蒺藜炒 山药炒 党参 酒知母 酒黄柏

以上共为末,开水調和,待温灌服。

(2)破故紙散(元亨疗馬集):治馬內腎痛,难起难臥。

血竭 延胡索 补骨脂 胡蘆巴 沒药 青皮 甘草 烏药
当归 茴香 陈皮 肉桂 白朮 牵牛 苦楝子 吳茱萸
共为細末,葱、酒同煎沸,入童便,空草灌之。

按:古人認為动物生化之源在火,若体内心包之火与命火相火互通,則元阳坚固,骨髓充实,如果火衰不旺,則骨髓空虚,精液脱滑,泄泻相繼发生,血脱气陷諸症亦会随着而起。补骨脂辛苦大温,能补命門相火,火旺則有暖腰补肾,强壮筋骨的作用,因而同他药配伍,可治上述諸症。

益智仁 (开宝)

【别名】益智子、脾主智、益智。

【主要产地】广东、四川等地。

【药用部分】本品是姜科多年生草本植物,入药用其果实內的种子。干燥种子密集呈紡錘形或橢圓形,两端尖銳,長約1寸半,粗約8至9分,外表呈灰色或灰褐色,有縱皺或小疣点,內部藏灰褐色的多数种子,彼此互相密接,分离的种子呈扁平类圓形,有数个鈍角稜,長約1分余,微粗糙,扁平的一面有小凹窩,呈橙黄色,質坚硬而不易打碎,富有芳香气味。

【炮制】将原药打碎生用,或盐水炒用。

【性味和归經】味辛,性温无毒。入脾、心、腎三經。

【应用】本品能益气安神,健脾和胃,温中暖腎,壯元理虛。主治反胃吐食、中焦虛寒、脾寒胃冷、逆气腹痛、腸虛泄泻、腎虛多尿、

公畜精滑等症。凡屬燥热及精亏水涸者忌用。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄4分至1錢。

【附歌】益智辛温，健脾和胃，壮元理虛，补中益气。

【配伍】配槟榔、肉豆蔻、桂心、厚朴、当归、芍药、木香、五味子、白芷、細辛、青皮、枳壳（益智散），治馬五劳七伤、騎損起臥、头垂向地、鼻冷；配人参、干姜、陈皮、藿香，治反胃吐食；配厚朴、豆蔻，治腹脹便泻；配烏药、山药、治腎虛多尿。

【附方】益智散（元亨疗馬集）：治馬翻胃吐草。

益智仁 肉豆蔻 五味子 广木香 槟榔 草果 細辛 青皮 当归 厚朴 川芎 官桂 砂仁 白朮 芍药 白芷 陈皮 甘草

上为末，以枣、姜、酒同煎沸，候温灌之。

骨碎补（开宝）

【别名】毛姜、申姜、石毛姜、碎甫。

【主要产地】安徽、广东、四川、河北、河南、浙江等地。

【药用部分】本品是骨碎补科多年生隱花植物，入药用其根莖，新鮮的根莖呈不規則的扁圓柱形，長約2—3寸，寬約4—5分，外表密被着赤褐色或褐色披針形的鱗片毛，有实叶脫落的殘基；折断面呈黃白色，散布有纖維狀物。

【炮制】去莖叶，洗淨切片用，或炒去毛用。

【性味和归經】味苦，性温无毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能行血止血，强筋补骨，益腎固精。主治跌打损伤、骨折、五劳七伤、腎虛久泻、四肢风湿疼痛等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】骨碎補溫，強筋補腎，行血接骨，去毒定痛。

【配伍】配全當歸、紅花、防風、天南星、白芷、水蛭炒、乳香、沒藥、血竭、牛膝、續斷、自然銅、連翹、木通（加味五虎丹，山西），治跌打損傷、四肢腰脊疼痛；配乳香、沒藥、血竭、五靈脂、烏賊骨、桑白皮、大黃、紫荊皮（湖北），治拐腳。

巴戟天（本草經）

【別名】巴戟、巴吉、巴戟肉、不凋草、巴棘、三蔓草。

【主要產地】四川、廣東、廣西、江西等地。

【藥用部分】本品是茜草科多年生藤本植物，入藥用其根及根莖。呈扁圓柱形，有連珠狀，彎曲，皺縮，多切成長約 2—3 寸的段落，粗約 2 分至 5 分。外表呈灰色或灰褐色，彎曲處的皮部往往橫裂而露出中心木部的褐色纖維束，質地堅硬；橫斷面呈黑褐色或紫褐色，皮部常與中心木部脫離。微有特異的氣味。

【炮制】將原藥用清水浸潤，抽去心，切段曬干，生用。

【性味和歸經】味辛甘，性微溫無毒。入腎經。

【應用】本品能暖腰溫腎，祛風濕，壯元陽，強筋骨，補氣益精。主治腰膝疼痛、神昏不安、風濕、筋骨痠軟、腰膝疼痛、公畜陽萎、精滑等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】巴戟甘溫，暖腰溫腎，疏風去濕，陽萎亦行。

【配伍】配胡蘆巴、補骨脂、八角茴香、苦楝子、滑石、海金砂，治

把腰抽腎抱膀；配茵陈、苦楝子、茴香、当归、沒药、胡蘆巴、补骨脂、自然銅醋制（又方茴香散，安驢药方），治馬小腸冷气痛。

【附方】（1）巴戟散（元亨疗馬集）：治馬腎痛后脚难移。

巴戟天 茴香 檳榔 肉桂 陈皮 肉豆蔻 肉蓯蓉 苦楝子 补骨脂 胡蘆巴 木通 青皮

上药为末，青葱、温酒、小便同調，空草灌之。

（2）治牡牛、馬阳萎症方（湖北）。

巴戟天 枸杞子 补骨脂 山茱萸 山药

上药煎水，候温灌服。

菟絲子（本草經）

【别名】火燄草、野狐絲、金錢草、金絲草、无根藤。

【主要产地】各地均产，其中以东北、河南、安徽、江苏、广西等地产量为多。

【药用部分】本品是旋花科多年生寄生性藤本植物，入药用其种子。呈卵圆形，一端稍尖，长约半分，外表呈灰褐色或橙褐色，粗糙而质硬；内部种仁显淡褐色。

【炮制】将原药簸去杂质，洗净，晒干，生用或盐水炒用，或以面和水煮，制成“菟絲餅”用。

【性味和归經】味甘辛；性温无毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能补肝温腎，壮元阳，坚壮筋骨，补不足，益精髓，明目。主治腰腎虛冷、精滑、腰膝疼痛、腎虛目昏、小便淋漓、大便泄瀉、尿血、流产等症。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两。

【附歌】菟絲子温，补髓益精，强筋坚骨，能温腰腎。

【配伍】配杜仲、蛇床子，治腰痛久不愈；配五味子、車前子、枸杞子、复盆子，用于强壮固精。

【附方】治馬腰痛久不愈方（元亨疗馬集）。

杜仲炒去絲 菟絲子 蛇床子

以上共为細末，加飞盐、滾酒調勻，揚去火气，带热灌之。

虎骨（別录）

【別名】大虫骨、威骨。

【主要产地】西藏、西康、云南、貴州、四川、湖南、江西、安徽及东北各省。

【药用部分】本品是猫科老虎的骨骼，以头骨和前肢脛骨为佳，脚掌骨及肋骨次之。春夏猎取的骨色黄，冬季猎取的骨呈紫褐色。四肢骨粗而壮，关节膨大，質地致密而坚重；横断面的骨髓富含油脂，新鮮的油脂較多，經久的油脂較干，显露出一絲瓜絡样的髓質，油具微弱特殊的芳香气味，无腥臭气。

【炮制】用香油炸酥，或炒炙成黄色，乘热醋淬或酒浸用，或熬制成虎骨胶用。

【性味和归經】味辛，性温无毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能追风，定痛鎮惊，强筋壮骨。主治筋骨毒风、风湿腰痛、惊癇、五劳七伤等症。对于血虛火盛者忌用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 两。

【附歌】虎骨辛温，入骨追风，强筋壮骨，风湿痹痛。

【配伍】配木瓜、川芎、牛膝、当归、五加皮、續断、桑枝，治筋骨拘攣疼痛；配当归、沒药、漏蘆、荷叶、紅花、自然銅、补骨脂、胡蘆巴、龟板、骨碎补、連翹、血竭、芍药，治母畜产后惊风；配犀角、远

志、梔子，治中风抽搐。

【附方】(1)大七伤散(元亨疗马集)：調理羸牛瘦馬添膘。

知母 貝母 汉防己 青皮 陈皮 干姜 虎骨 芍药 当归
炒 瓜蒌 桔梗 川大黄 豆蔻 人参 补骨脂 茯苓
甘草 茴香 茵陈 益智仁 广木香 白芷 槟榔 官桂
加水与猪脂煎沸，灌服。

(2)治馬腰癱腿換方(河北)。

虎骨 茴香 独活 川芎 巴戟天 当归 蒼朮 槟榔 枸
杞 杜仲炭 牛膝 甘草
共为細末，加黃酒和溫開水冲服。

海馬 (拾遺)

【别名】水馬。

【主要产地】广东海南島及福建沿海等地。

【药用部分】本品是海龙科硬骨魚类动物，入药用其干燥尸体。长约5—6寸，雄的色青，雌的色黄，側面視之，其身如虾，头首如馬，有喙下垂，全体有硬皮，成环节状，腹部稍粗，尾細长。

【炮制】将新鮮海馬晒干，炕燥，生用。研末用时，需用細砂拌炒，炒酥后，篩去細砂研末。

【性味和归經】味甘，性溫無毒。未載归經。

【应用】本品能暖腎、壯陽、催產、消瘀。主治難產、陽萎、產后血滯、瘀血疼痛、疔疮腫毒等症。孕畜忌用。

【用量】馬和牛3錢至1兩。

【附歌】海馬甘溫，消瘀止痛，壯陽催產，血滯亦功。

【配伍】配參三七、当归、川芎、熟地、白芍、杜仲、五加皮、續斷、

牛膝、红花、桃仁、骨碎补、自然铜、乳香、没药(陕西),治跌打损伤。

【附方】治牲畜跌撞损伤方(四川)。

海馬 蟬蛻 參三七 自然銅 火煨、童便淬三次 土鼈 牛膝
伸筋草 桃仁 紅花 川烏 草烏 乳香去油 沒藥去油 刘
寄奴 木通 归尾

共为末,白酒引,温开水冲服。

第二节 补血养阴药

当归(本草經)

【别名】白当归、干归、归身、归尾、全当归、油当归。

【主要产地】甘肃、四川、云南、河南、陕西等地。

【药用部分】本品是繖形花科多年生草本植物,入药用其根。一般分根头与支根两部分,全长約5寸至7寸;根头部膨大,粗約7分至寸余,外表呈黄褐色或灰褐色,質地堅脆,易折断;主根粗而短,其下部分出多数支根,粗約3分,細长屈曲,为黄褐色,有不規則的縱皺,質柔韌,不易折断,橫切面皮層較厚,自中心部有放射狀綫紋散出,富有特异的芳香气味。

【炮制】将原药刷净塵土,噴水湿润,候中心部軟化后,切片晒干,生用,酒浸或炒炭用。

【性味和归經】味甘辛,性温无毒。入心、肝、脾三經。

【应用】本品能补血活血,潤燥滑腸,温中止痛,破瘀生肌。主治胎娠諸病、血虛劳伤、跌扑损伤、中风汗閉、下痢腹痛、筋骨痛等症。当归头能止血,身能养血,尾能行血,全用和血。凡腹痛而有血热时忌服。




图 80 当 归

左、当归原植物；右、药用部分外形：1.头根，2.支根。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 6 分。

【附歌】当归甘温，养血归經，扶虚益損，退热滋阴；归头止血，养血用身，尾能行血，和血全用。

【配伍】配乳香、沒药、血竭、鶴虱（定痛散），治馬跌扑損伤筋骨疼痛；配大黃、芍药、甘草、枇杷叶、天花粉、黃药子、牡丹皮（止痛散），治肺气把膈疼痛；配沒药、乳香、血竭、玄参、知母、川芎、五灵脂、青皮、知母、延胡索、自然銅（当归散），治負重劳伤太过，毛焦羸

瘦。

【附方】(1)当归散(蕃牧纂驗方):治馬脾胃冷、伤水痛、因成泄瀉之病。

当归 厚朴 陈皮 青皮 白牵牛炒 益智仁 赤芍药

以上七味为末,水、生姜擦細,煎沸,空草温灌之。

(2)补益当归散(安驥药方):治母馬产駒后腰膀痛及腰膀无力,并惡血連日不止,或盛閃着腰膀,兼肉顫負痛。

当归 芍药 海带 漏蘆 沒药 荷叶 紅花 連翹 龟板
虎骨 胡蘆巴 补骨脂 甜瓜子 血竭 自然銅 骨碎补

上药十六味为末,酒、小便同調灌之。

按:当归味甘性温,功能补血活血,調气破瘀,所以应用范围很广。由于当归能补养全身,故內則五脏以健,外則肌肉以长,一切因血不足而成虛劳寒热可愈,因血不清而生之黃癰疽疔可消,因跌打损伤之气血凝滯而疼痛者可止。特别是母畜胎娠的疾病,其效更佳,这是因为当归可調血养胞,催情怀孕;在胎前可补血生新而养胎;产后可去瘀生新定痛的原故。

当归应用范围虽广,但因炮制后及同他药配伍而有所不同,如姜制后,可兼治痰;酒浸后活血,盐水炒則下行。如配党参、黄耆、白朮,則气血并补;配香附、烏药、木香,則气血并行;配牵牛、大黃、甘遂,則破气行水;配生地黄、白芍,能涼血;配茯神、酸枣仁,能安神等。

熟地 (本草經)

【別名】熟地黄。

【主要产地】河南、四川、浙江、江苏等地。

【药用部分】本品是玄参科多年生草本植物，入药用其根茎，经过蒸煮后晒干而成，全体呈黑褐色，为纺锤形，长约2寸至3寸，直径约8分至寸余，有纵横皱缩，并有疣状突起，而且弯曲不齐，质柔软；切断面为深黑色，中心部可以看到光亮的油脂状块，粘性很大。

【炮制】将生地黄用米酒拌蒸，九蒸九晒，待变成黑色而使体质转软后，切片用或用小量砂仁拌炒用。

【性味和归经】味甘，性微温无毒。入心、肝、肾三经。

【应用】本品能滋肾养阴，补血生精。主治血虚、胎产诸病、肝肾阴亏、阴虚咳嗽、气喘、五劳七伤、腰膝疼痛等症。

【用量】马和牛5钱至2两。

【附歌】熟地甘温，滋肾补血、五劳七伤，胎病虚咳。

【配伍】配生地黄、荆芥、参三七、当归、黄耆，能补血；配芍药、当归、川芎，治一切血虚；配山茱萸、山药、牡丹皮、茯苓、泽泻，治腰痛、精滑。

【附方】(1)预防母猪小产方(四川)。

熟地 当归 川芎 人参 白朮 茯苓 甘草 大枣 苏叶
共煎水常喂母猪。

(2)牛产后补血药方(江西)。

熟地 白芍 当归 川芎 白朮 茯苓 甘草炙 砂仁
香附 党参 延胡索

上药研末，用米酒并开水调匀灌服。

按：熟地是地黄经蒸制而成，由于经过蒸制，其色味俱变，性凉也转变为温，所以功能补血，并有滋补肝肾阴虚的作用，治疗各种血虚症。但熟地性质粘稠，有碍胃肠的功能，所以在应用时，往往配砂仁同用，或拌砂仁末炒制，这就是借砂仁的辛温香窜性味，以

解熟地的粘稠。

何首烏 (开宝)

【别名】首烏、地精、夜合、赤葛、夜交藤。

【主要产地】江苏、安徽、广东、广西、河南、江西、福建、四川等地。

【药用部分】本品是蓼科多年生藤本植物，入药用其块根。呈不整形块状，大小不定，外面呈赤褐色，质坚硬，不易破碎，有皱纹，凹凸明显，其横断面为暗褐色，有如云状的纹理。



图 81 何首烏

左、何首烏原植物；右、药用部分及横切面。

【炮制】将原药洗净泥土，切片晒干，生用。或将原药加黑大豆汁煮至黑色为度，晒干至七成时切片，再晒干用。

【性味和归经】味苦甘濡，性温无毒。入肝、肾二经。

【应用】本品能补血祛风，补肝肾，滋肾水，壮筋骨，敛精气，养血气。主治肾虚精滑、腰脊疼痛、癰肿、冷气肠风、身体羸瘦、皮枯毛焦等症。

【用量】馬和牛5錢至3兩；羊和猪3錢至5錢；兔和鷄5分至1錢。

【附歌】何首烏溫，益腎固精，養血益肝，壯筋祛風。

【配伍】配熟地、山茱萸，補肝腎；配牛膝、杜仲，治腰膝軟弱；配人參、當歸、陳皮，治氣血虛弱。

【附方】猪的催肥方(古今秘苑)。

貫眾 何首烏 大麥芽

上藥研末，每日將藥混飼料中給予（宰前半个月服用，小猪不可用）。

按：何首烏味苦甘澀而溫，功能滋補肝腎，補血養血。因肝主血，腎主精，由于何首烏的滋補，精血則會旺盛，精血旺則能堅強筋骨，長肌潤皮毛，故為滋補催肥之藥。

阿膠（本草經）

【別名】驢皮膠、驢膠、阿井膠、阿膠珠。

【主要產地】各地均有熬制，其中以山東制者為佳。

【藥用部分】本品是驢皮煎熬而成的膠質，凝固後作藥用。一般為板狀長方塊片，長約1寸半，寬約1寸，厚約1—2分，外表呈黑褐色或黃褐色，為半透明或不透明，平滑而有光澤，質甚硬；斷面有玻璃樣光澤。以冬季熬取者為上品。

【炮制】原藥用，或以蛤粉炒成阿膠珠用。入煎時宜溶化沖服。

【性味和歸經】味甘，性平無毒。入肺、肝、腎三經。

【应用】本品能养血安胎，补血益气，滋阴润燥，清热止血，润肺养肝。主治虚劳咳嗽、肺癰鼻膿、衄血、便血、腰腹疼痛、血虛風痛、腸風下痢、胎前产后諸病。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】阿胶甘温，滋阴潤肺，养血益气，清热止血。

【配伍】配馬兜鈴、牛蒡子、杏仁，治肺虛火盛的咳嗽；配蒲黃、生地黄，治衄血；配艾叶、当归、地黄、芍药、川芎，治母畜胎前下血。

【附方】(1)阿胶粥(师皇安驥集)：治馬肺病、鼻內出膿、草慢。

阿胶捶碎 糯米 蘆根 郁金 甘遂 升麻 紫苑 黄芩
和硝

以上共为細末，加蜜、油調勻，灌服。

(2)治肺热、肺伤咳嗽、喘息有音、鼻流膿方(貴州)。

阿胶 白芨 茵陈 梔子 黃連 防风 杏仁 甘草 瓜蒌
仁

共为細末，温开水冲服。

石斛 (本草經)

【別名】金釵、环釵、金釵石斛、金石斛、金釵斛、霍石斛。

【主要产地】四川、貴州、广西、安徽、浙江、湖北、江西、福建、湖南、台湾等地。

【药用部分】本品是兰科多年生常綠草本植物，入药用其莖。其干燥品可分为下列 3 种：

1. 霍山石斛：长约 1 尺左右，为条細长的鉄皮鮮石斛，一般烘干成黄色；若以 5—6 分长的最短嫩芽，經蒸制盘結而成龙头凤尾

的形状者，称綠毛楓斗，若制成耳环形者，则称为耳环石斛。

2. 黄草斛：是較老的鉄皮石斛，經烤制而成，条长约1尺余，有稜节，色金黄而光亮，質地堅实。

3. 干金釵：莖扁，长达約1尺左右，寬約2—3分，厚約4—5厘，有稜节，外皮呈金黄色。

【炮制】鮮品可去根剪断入煎；干燥品須洗淨潤透，然后切成小段（綠毛楓斗、耳环石斛原药用），入药宜先煎。

【性味和归經】味甘淡微咸，性寒无毒。入肺、胃、腎三經。

【应用】本品能滋阴散热，养肺下气，益胃生津，去痹止痛，补五脏虛劳。主治热病伤津、自汗、病后虛热、四肢痹痛等症。

【用量】馬和牛5錢至2两；羊和猪2錢至4錢；兔和鷄4分至7分（鮮者加倍量）。

【附歌】石斛甘寒，益气除热，滋阴益胃，生津止渴。

【配伍】配連翹、天花粉、鮮生地、麦門冬、桑叶，治湿熱；配黄芩、地骨皮、梔子、麦門冬，治胃中燥热、伤津口渴；配白芷、柴胡、芍药、当归、肉桂、半夏（金釵草散，安驥药方），治头低难抬。

【附方】石斛散（四川）：治猪清水喉（即喉风）。

石斛 天花粉 黄連 黄芩 黄柏 大黃 山豆根 射干
桔梗 玄参 麦門冬 甘草
上药煎水，去渣候温灌服。

白芍（本草經）

【別名】白芍药、金芍药、东芍药、杭白芍。

【主要产地】浙江、四川、安徽、貴州、陝西、甘肅等地，以浙江杭州产者为佳。

【藥用部分】本品是毛茛科多年生草本植物，入藥用其干燥的根。根呈圓柱形，長約5寸至7寸，粗約6—7分，外面有縱裂，呈褐色或淡褐色，質堅實，橫斷面呈灰白色，甚致密，木質部可見到淡褐色的放射綫，微有芳香气味。



图 82 白 芍

左、白芍原植物； 右、藥用部分外形及橫切面：1.縱裂，2.木部，3.皮部。

【炮制】將原藥用溫水浸泡半日，濾出置燜罐內，待至中心部柔軟，切成薄片晒干，生用，酒炒或麸炒用。

【性味和归經】味苦酸，性微寒無毒。入肝、脾、肺三經。

【應用】本品能瀉肝安脾，清熱利腸，養血斂陰，和血散瘀，安胎。主治腹痛、瀉痢、腰肋疼痛、虛熱自汗、小便不利、寒熱積痛、脾虛腹痛、瘀血壅腫及胎前產後諸病。此外，也有用為豬的催肥藥。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和豬2錢至4錢；兔和雞4分

至7分。

【附歌】白芍酸寒，通和血脉，能收能补，泻肝平热。

【配伍】配当归、羌活、没药、血竭、荷叶、白药子、甜瓜子(芍药散)，治马膈前痛；配细辛、高良姜、丁香皮、砂仁、桂心、没药、巴戟天、青皮、陈皮、黑附子、香附子(芍药散)，治马吐粪；配甘草，治腹痛、四肢攣急。

按：白芍系芍药去粗皮炮制晒干的药物，其酸味经炮制后则减少，转为苦酸之味，若酒炒则补阴，配白朮则补脾，配川芎泻肝，配人参补气、配当归补血，配黄连止泻痢，配姜、枣则温经散寒，配肉桂、干姜治冷痛，配黄连、黄芩治热痛，配槟榔、使君子治虫积腹痛，配大黄、牡丹皮、桃仁能破坚逐瘀，配菊花、刺蒺藜则治肝热目痛。但对于食伤腹痛用之无效。

枸杞子（本草经）

【别名】枣杞、苦杞。

【主要产地】我国各省均产，其中以宁夏、甘肃产者为佳。

【药用部分】本品是茄科蔓生落叶灌木，入药者为枸杞的干燥成熟果实。呈椭圆形或卵圆形，长约2—3分，直径约1分余，果皮呈紫红色或鲜红色，表面有皱缩，内藏多数淡黄色肾脏形的扁平种子。产宁夏、甘肃者粒长圆，色鲜红，子少而味甜者较好。

【炮制】采集后，除去果柄，晒干生用。

【性味和归经】味甘，性平无毒。入肺、肝、肾三经。

【应用】本品能补肝肾，润肺燥，坚筋骨，益精气，除风明目。主治肾虚腰痛、精滑、目昏睛暗、流眼泪、腰脚软而无力、心虚等症。对于脾虚有湿及有外邪实热者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢。

【附歌】枸杞甘平，补肝滋腎，益髓添精，明目除风。

【配伍】配杜仲，治腎虛腰痛；配地黄、五味子、地骨皮、百部、枇杷叶，治虛勞咳嗽；配当归、补骨脂、骨碎补、茴香、茯神，治腎虛精滑。

【附方】治馬腎虛精滑方(河北)。

枸杞子 当归 补骨脂 生姜 茴香 茯神 远志 柏子仁
菟絲子 复盆子 黄柏 天門冬 熟地 五味子
上药为末，开水冲，候温灌服。

女貞子 (本草經)

【别名】冬青子、女貞实、貞木、蜡树。

【主要产地】我国各地均产。

【药用部分】本品是木樨科常綠乔木女貞的果实。干燥果实呈橢圓形，长约 2—3 分，直径约 1—2 分，外表呈紫黑色或黑藍色，有不規則的网状皺縮，果皮軟而薄，果肉显黃赤色，为顆粒性，种子呈黑褐色，为橢圓形，質較軟；种仁呈黃白色而油潤。

【炮制】将原药去淨梗叶，蒸熟晒干，盐水炒用。

【性味和归經】味甘苦，性平无毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能补肝腎，强腰脊，安五脏，除热，明目。主治腎虛精滑、阴虛发热、腰脚軟弱无力、眼目昏暗等症。凡脾胃虛寒泄瀉者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 兩；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】女貞甘平，补肝益腎，强腰健脚，明目滋阴。

【配伍】配熟地、澤泻、山药、山茱萸，治虛弱。

【附方】女貞散(四川)：治牛腎虛腰冷精滑，四肢无力。

女貞子 肉蓯蓉 桂枝 巴戟天 龙骨 金櫻子 白扁豆
芡实 山药

共研細末，白酒为引，开水調勻，候溫灌服。

山茱萸 (本草經)

【別名】蜀酸枣、酸枣皮、茱萸肉、山萸肉。

【主要产地】浙江、安徽、河南、山东、山西等地。

【药用部分】本品是山茱萸科落叶小乔木，入药用其除去种子的干燥果实。呈长椭圆形而稍扁，长约4—5分，粗约3分余，果皮显紫紅色，表面多皺紋而有光澤，中心部有除去种子剖开的裂縫。以杭州产者，皮肉較厚，色較鮮艳，酸味大，而且无核者为佳。

【炮制】将原药剝去核，以黃酒浸后，蒸透，至成紫褐色为止，晒干用。

【性味和归經】味酸澆，性微溫無毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能溫補肝腎，澆精止汗，逐寒通竅，養血助陽。主治公畜陽萎精滑、風寒濕痹、腰膝疼痛、小便頻數、頭風痛、鼻塞不通、自汗等症。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和豬2錢至4錢；兔和鷄5分至1錢。

【附歌】山茱萸溫，益髓澆精，溫補肝腎，除腰膝痛。

【配伍】配熟地、山药、牡丹皮、茯苓、澤泻，治腎虛腰痛；配五味子、党参，治表虛自汗；配金櫻子，治精滑；配复盆子、桑螵蛸（湖北），治多尿症。

按：山茱萸酸濇而温，功能滋阴助阳，养血濇精，为常用滋补强壮药。好古说：“止小便利，秘精气，取其味酸濇以收滑也。”

胡麻仁（别录）

【别名】脂麻、巨胜、狗虱、芝麻。

【主要产地】我国各地均产。

【药用部分】本品是胡麻科一年生草本植物，入药用其种子。呈扁平长卵形，顶端尖，基部钝圆，长约1分半，呈棕色、黑色或白色，滑润而有光泽，含有多量的油脂。



图83 胡 麻

左、胡麻原植物； 右、药用部分外形。

【炮制】原药生用，或脱去皮炒用。

【性味和归经】味甘，性平无毒。入肺、脾、肝、肾四经。

【应用】本品能补益肝肾，益气力，长肌肉，添髓，养血润燥，止痛。主治肠燥秘结、劳伤体瘦、牛百叶干燥等症。凡大便滑泄者忌用。

【用量】馬和牛 1 两至 5 两；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】胡麻甘平，調中益气，潤养五脏，长肉添髓。

【配伍】配食盐，可以使生猪长肥。

【附方】(1)麻仁解毒湯(四川)：治猪热病大便秘结不通。

胡麻仁 黃連 大黃 黃芩 焦黃柏 梔子 知母 陳皮
厚朴 枳实 木香 馬鞭草

以上十二味煎水，去渣，候温灌服。

(2)棧鷄易肥法(农政全書)。

以油和面，捻成指尖大塊，日与十数枚食之；又以做成硬飯同土硫黃研細，每次与五分許，同飯拌勻，喂数日即肥。

表 38 补养药归纳簡表

类别	药名	性味及归經	功 用	用 量(錢)		
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄
补 气 助 阳 药	人 参	甘苦温，入脾、肺	大补元气，益血补虚	3—7	—	—
	党 参	甘平，入肺、脾	补中益气，生津止渴	6—20	2—4	0.2—0.5
	黃 耆	甘温，入肺、脾	补气固表，脾虚泄泻	5—20	2—4	0.4—0.6
	山 药	甘平，入脾、胃、肺、肾	补中益气，清热健脾	5—20	2—5	0.5—1
	白 朮	甘苦温，入脾、胃	和中調气，燥湿化痰	5—14	2—4	0.4—0.6
	甘 草	甘平，入十二經	补脾潤肺，調和諸药	4—20	1—3	0.2—1
	大 枣	甘温，入脾、胃	补脾益气，养胃生津	8—20	2—5	0.5—1
	肉蓯蓉	甘酸咸温，入肾經	补中益精，潤燥滑腸	5—20	2—4	0.2—0.5

(續)

类别	药名	性味及归经	功用	用 量(錢)			
				馬 牛	羊 猪	兔 鷄	
补 气 助 阳 药	杜 仲	甘辛温,入肝、肾	补肝肾,强筋安胎	5—20	2—4	0.4—1	
	續 断	苦辛温,入肝、肾	补益肝肾,續筋止痛	5—20	2—4	0.2—0.6	
	补骨脂	辛苦大温,入脾、肾、心包	温腰补肾,强壮筋骨	4—12	2—4	0.3—0.6	
	益智仁	辛温,入脾、心、肾	壮元理虚,健脾暖肾	5—15	2—4	0.4—1	
	骨碎补	苦温,入肝、肾	益肾行血,补骨固精	5—10	1—3	0.5—1	
	巴戟天	辛甘微温,入肾	温暖腰肾,补气益精	4—10	1—3	0.2—0.5	
	菟丝子	甘辛温,入肝、肾	补益精髓,腰膝壮阳	4—10	—	—	
	虎 骨	辛温,入肝、肾	强精壮骨,风湿痹痛	4—10	—	—	
补 血 养 阴 药	海 馬	甘温	壮阳暖肾,催产消瘀	3—10	—	—	
	当 归	甘辛温,入心、肝、脾	补血活血,温中止痛	5—20	2—4	0.2—0.6	
	熟 地	甘微温,入心、肝、肾	滋肾养阴,补血治虚	5—20	—	—	
	何首烏	苦甘温,入肝、肾	补肝滋肾,养血壮筋	5—30	3—5	0.5—1	
	阿 胶	甘平,入肺、肝、肾	补血潤肺,益气安胎	5—20	2—4	0.4—0.1	
	石 斛	甘淡咸寒,入肺、胃、肾	养肺下气,清热滋阴	5—20	2—4	0.4—0.7	
	白 芍	苦酸微寒,入肝、脾、肺	养血敛阴,泻肝清热	5—20	2—4	0.4—0.7	
	枸杞子	甘平,入肺、肝、肾	补肝益肾,潤肺明目	5—20	2—4	—	
	女貞子	甘苦平,入肝、肾	补益肝肾,除热明目	5—20	2—4	0.5—1	
	山茱萸	酸温微温,入肝、肾	温补肝肾,澆精止汗	5—20	2—4	0.5—1	
	胡麻仁	甘平,入肺、脾、肝、肾	补肝益肾,养血潤燥	10—50	2—4	0.5—1	

第十五章

固 瀉 藥

凡有固脫和收瀉作用的藥物，就称为固瀉藥。

“脫”就是指滑脫，如脫肛、子宮脫出、滑精、二便不禁等，都可应用固脫藥来治疗。

“瀉”就是有固脫、收斂的作用，所以多用于便血、泄瀉、大出汗、痰咳、反胃等症。

本类藥物按其作用可分为两大类：即瀉腸止瀉藥和斂汗瀉精藥。应用时須視家畜體質的情况，如虛弱者要配合补養藥来应用。又当表邪未解或里邪未清时，也不宜应用，以免引起留邪而变为重症，茲按其作用分为二节来叙述。

第一节 瀉腸止瀉藥

訶子（唐本草）

【别名】 柯子、訶黎勒、隨風子。

【主要产地】 主产于广东、广西、印度等地。

【药用部分】 本品是使君子科落叶乔木訶黎勒的干燥果实。形

如橄欖，呈卵圓形而兩端稍尖，長約1寸至1寸2分，粗約5—6分，表面呈灰黃色，有多數皺紋，質甚堅硬、不易破碎；其果肉呈灰黃色，中心部分有灰黃色的核仁。



图84 诃子

1. 皺紋

【炮制】用水潤透后，剖开，剝去核以面糊包裹煨用，或酒浸蒸用。

【性味和归經】味苦酸而帶澀，性溫無毒。入肺、大腸二經。

【应用】本品能澀腸止痢，止血，斂肺調氣，溫脾脏，開胃腑。主治冷瀉久痢、脫肛、腸風下血、子宮出血、虛咳、胸膈滯氣等症。對於咳嗽、痢疾初起時禁用。

【用量】馬和牛5錢至1兩2錢；羊和猪1錢至2錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】诃子苦溫，澀腸止痢，調氣溫脾，并治脫肛。

【配伍】配黃柏、黃芩、槐花米、山藥、麥門冬等，治拉稀帶血；配木香、肉桂、當歸等，治虛寒脫肛；配陳皮、干姜、蕎麥粉，治久痢。

【附方】治牛拉稀帶血方（河南）。

诃子 麥門冬 黃芩 槐花米 山藥 知母 黃柏 木通
猪苓 澤瀉 車前子 甘草

上藥共研為末，酌加柿樹皮為引，水煎，灌服。

烏梅（本草經）

【主要产地】浙江、四川、福建、江西、云南等地。

【药用部分】本品屬薔薇科落叶亚乔木，入药用其未成熟果实，經熏蒸而成。干燥品呈皺縮不整球形，外面呈焦黑色，其核呈棕

黃色而堅硬。



图 85 烏 梅

左、烏梅原植物；右、药用部分外形。

【炮制】將未成熟的果实，放入蒸灶內熏制而成。一般去核用肉，生用或炒炭用；或湯浸，洗去黑烟，炙用。

【性味和归經】味酸澇，性溫無毒。入肝、脾、肺三經。

【应用】本品能欬肺澇腸，止痢，生津，除熱，殺虫。主治久咳瀉痢、瀉血、虛勞煩渴、蛭虫等症。外用可蝕贅肉。忌用于表証及里實証。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】烏梅酸溫，欬肺澇腸，止痢殺虫，止渴生津。

【配伍】配黃連、訶子等，可治幼畜奶瀉；配干柿、黃連、姜黃、

訶子肉(烏梅散),治幼駒奶瀉。

【附方】增減烏梅湯(中兽医研究所):治羔羊痢疾。

烏梅去核 訶子肉 姜黃連 干柿餅 黃芩 郁金 黑焦楂
神麴 猪苓 澤瀉

紅糖為引,水煎,候溫灌服。

按:烏梅性味功用,大多與五味子相同。但烏梅酸瀉而溫,入脾肺為主,能瀉腸、斂肺、生津、殺蟲,故主治久咳瀉痢、虛勞煩渴及蟻蟲等症;而五味子味兼辛咸,以入肺腎為主,除治喘咳下痢外,又能治自汗、精滑等症。這是二者的不同之處。

石榴皮 (別錄)

【主要產地】我國各地都有,其中以廣東產量較多。

【藥用部分】本品是安石榴科落葉小喬木石榴的果皮;樹皮和根皮亦作藥用。其乾燥果皮向內彎曲,大小不一,外面呈暗紫褐色,里面呈淡黃色。

【炮制】將果皮洗淨,剝去里面隔膜及種子,曬干,生用、炒用或炒炭用。

【性味和歸經】味酸瀉,性溫無毒。入肺、腎、大腸三經。

【應用】本品能瀉腸,止痢,殺蟲,止血。主治瀉痢、脫肛、精滑、便血等;也可驅除扁蟲、蟻蟲。但有實邪者禁用。

【用量】馬和牛 6 錢至 1 兩 6 錢;羊和豬 1 錢至 2 錢;兔和雞 4 分至 6 分。

【附歌】石榴皮酸,瀉腸止痢,驅蟲固精,脫肛也效。

【配伍】配黃連、黃柏、干姜、當歸等,治冷痢;配烏梅、使君子、鶴虱、山椒、檳榔等,治蟻蟲及扁蟲症。

【附方】(1)治拉稀带血方(河南)。

石榴皮(果皮) 西瓜皮

以上研末,和温开水中灌服。

(2)治扁虫方(新牛馬經)。

石榴皮 貫众 檳榔 南瓜子(新鮮的搗成泥状)

以上研末,和水中灌服。

肉豆蔻 (开宝)

【别名】肉果、玉豆叩。

【主要产地】主产于热带,我国广东亦有出产。

【药用部分】本品是肉豆蔻科常绿乔木,入药用其除去种皮的干燥种子。呈卵圆形,长约8分至1寸,粗约6—7分,外皮呈土灰色或褐色,有多数网状皱纹,质甚硬;横切面有象大理石样的花纹,富有香气。




图 86 肉豆蔻

左、肉豆蔻原植物； 右、药用部分外形：1. 蒴果，2. 种子外形，3. 种子横切面。

【炮制】用面糊包裹,放入炭火中煨熟,使肉豆蔻油分析出;或用砂炒炮去油后,除去外层包裹的面粉,即称为肉蔻霜,或称肉果

霜，可研末用。

【性味和归經】味辛，性溫無毒。入脾、胃、大腸三經。

【應用】本品能暖胃消食，化痰順氣，固腸止痢。主治久瀉冷痢、腹痛、痰壅、胃弱等症。但對於熱瀉熱痢和病初時忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 2 錢；兔和雞 2 分至 5 分。

【附歌】肉蔻辛溫，久瀉冷痢，化痰順氣，功效稱奇。

【配伍】配當歸、白朮、陳皮、厚朴、砂仁等，治冷痢。

【附方】(1)豆蔻散(元亨疔馬集)：治馬停留宿水偷渡病。

肉豆蔻 白芍藥 當歸 苦楝子 葶澄茄 甘草 砂仁
陳皮 肉桂 青皮 細辛 厚朴

上藥為末，青葱，溫酒同調灌之。

(2)治牛馬消化不良腹瀉方(陝西)。

肉豆蔻 茴香 厚朴 陳皮 當歸 枳殼 青皮 砂仁
檳榔 肉桂

上藥研末，用開水調勻，候溫灌服。

按：肉豆蔻、白豆蔻、草豆蔻、砂仁、益智仁等，其藥性、功用大同小異，其中以肉豆蔻果實較大，氣味藥力較厚。宗奭說：“多服則泄氣，得中則和平。”丹溪說：“溫中補脾，曰華子稱其下氣，以脾得補而善運化，氣自下也，非若陳皮，香附之駛泄，觀此，則肉豆蔻之下氣、下濁，仍有補益脾胃之功，與陳皮，香附之破氣，自不同也。”

禹余糧 (本草經)

【別名】白余糧、自然谷、余糧石。

【主要产地】主产于广东、浙江、江苏等地。

【原药形态】本品是铁矿中的产物，为黄褐色不整形块，壳厚约1—2分质甚坚硬，敲碎后内部有赭褐色细末，以无砂者为佳。

【炮制】将原药碾碎为粉，水飞晒干用。

【性味和归经】味甘澇，性微寒无毒。入胃、大腸二经。

【应用】本品能固澇下焦，泻热止痢。可治久痢不止、腹部气脹。

【用量】馬和牛5錢至1两5錢；羊和猪2至4錢；兔和鷄2至5分。

【附歌】禹余粮甘，固澇下焦，泻热止痢，均有功效。

【配伍】配赤石脂、白芍、茯苓、当归、苍朮、澤泻、甘草（兽医中药类編），治牛馬热痢。

赤石脂（本草經）

【别名】陶土、高嶺土、五色石脂。

【主要产地】福建、山东、河南、山西、陝西等地。

【原药形态】本品为紅褐色、土样的塊，容易碎，以細膩粘舌者为佳。

【炮制】研粉水飞用，或火煨水飞用。

【性味和归经】味甘咸而澇，性温无毒。入胃、大腸二经。

【应用】本品能固腸收斂，厚腸胃，除水湿。主治赤白久痢、白帶、脫肛、腹痛泄泻、馬患疮黃肿毒以及难产等症。恶大黃、松脂。

【用量】馬和牛5錢至1两5錢；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄2分至5分。

【附歌】赤石脂温，固腸除湿，赤白久痢，外用疮肿。

【配伍】配猪苓、澤瀉、青皮、陳皮、牽牛子、茯苓、肉桂、茴香、蒼朮、厚朴、干姜、甘草，治水瀉；配黃連、木賊草（猪經大全），治猪脫肛紅腫干燥。

【附方】天仙子散（元亨疔馬集）：治駝御瀉不止。

炒盐 白矾 生姜 天仙子 赤石脂 赤黍米

以上六味，用醋一处同熬，飢灌之。

伏龙肝（別录）

【別名】灶心土。

【原藥形态】本品为燒草木灶底中心的焦黃土，因久經火燒，所以硬如石塊，其外赤而中黃，或呈紫赤色。

【炮制】入煎时用絹布或紗布包裹，煎后篩濾，沉淀后倒出用其水煎藥。

【性味和归經】味辛，性温無毒。入脾、胃二經。

【应用】本品能調中止血，收斂消腫。主治嘔吐冷涎、反胃吐草、吐血、难产、冷痢、便血等症。外用为諸疮敷藥。

【用量】馬和牛 8 錢至 2 兩；羊和猪 3 錢至 5 錢；兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】伏龙肝辛，調中止血，反胃嘔吐，外敷消腫。

【附方】(1)治牛糞血方（賈相公牛經）。

灶中黃土 酒

以上同煎，候冷，灌服。

(2)治猪脫肛方（猪經大全）。

伏龙肝 鼈頭骨 五倍子

共为末摻之，先以紫苏熬水洗猪肛門。

孩儿茶（綱目）

【别名】烏爹泥、黑儿茶、棕儿茶、儿茶、方茶。

【主要产地】新加坡、印度、緬甸等地。

【药用部分】通常因来源和品质不同，可分为两种：即棕儿茶和黑儿茶。

棕儿茶：是茜草科植物儿茶的叶和幼枝，加水炼制而成的干燥膏样物质。为方形或长方形块，质脆多孔，呈淡灰棕色。

黑儿茶：是豆科常绿乔木仙儿茶的树脂，经炼制而成的块状物。呈不规则形的块状，质脆多孔，呈黑棕色，其品质较前者为次。

【炮制】微炒研末用。

【性味和归经】味苦澇，性微寒无毒。入肺经。

【应用】本品能清热，化痰，收敛，止血。主治泻痢、血痢；如涂敷诸疮，有收敛止血的功效。

【用量】馬和牛3錢至1两；羊和猪1錢至3錢；兔和鷄1分至6分。

【附歌】儿茶苦寒，清热化痰，外敷诸疮，收敛止血。

【配伍】配輕粉、龙骨、冰片等，外用治皮肤破烂、湿疮、久不生皮等症；配黃連、黃柏、青黛等，治口舌生疮；配高粱酒（兽医中药类編），治牛馬泻痢。

明矾（本草經） 附：枯矾

【别名】矾石、白矾。

【主要产地】山西、安徽、河北、湖北、浙江等地。

【原药形态】本品是坚硬的结晶块。如经火煨则成轻质的海绵

样塊，称为枯矾。

【炮制】研末生用；或火煨成枯矾，研成粉末用。

【性味和归經】味酸，性寒无毒。入肺、脾二經。

【应用】明矾能解毒，燥湿，斂腸，止血，杀虫。主治一切喉中痛、热痢、风痰、口舌生疮、目痛、鼻衄、流涎等症。

枯矾能斂腸止血，主作外用，可治恶疮、虫咬、脱肛、子宫脱出或为吹喉药。

【用量】馬和牛3至8錢；羊和猪1至2錢；兔和鷄3分至5分。

【附歌】明矾酸寒，燥湿斂腸，杀虫解毒，止血洗疮。

【配伍】配雄黄、黄连、连翘等，治烂疮；配食盐、金银花、甘草等，治牲畜誤食毒草。

【附方】(1)白矾脂散(蕃牧纂驗方)：治馬喉骨脹硬、低头难、鼻內膿出、喉內作声、水草慢。

猪脂 白矾

同研細，草飽灌之。

(2)姜凡散(安驥药方)：治磨打破梁背。

白矾 生姜燒成灰

上药同研，每貼疮，油調为度，疮湿，干擦。

(3)治誤吃毒草方(陝西)。

明矾 食盐 金银花 甘草

上药水煎，候温灌服。

(4)治粪門烂疮方(元亨疗馬集)。

明矾 雄黄 黄连 连翘 穿山甲

上药为細末，以黄丹、輕粉和丸，先用盐湯洗患处，以药末干抹

疮上,即可痊愈。

按:矾石色暗者不入药,以白而明者为佳;色白者称为白矾,光明者称为明矾。在民间多用明矾作饮水沉淀,使水彻底澄清。陈师古说:“矾石之用有四,吐利风热痰涎,取其酸苦涌泄也;治诸血痛、脱肛、阴挺、疮瘍,取其酸涩而收也;治痰饮、泄痢、崩带、风眼,取其收而燥湿也;治喉痹、中蛇、虫伤螫,取其解毒也。”故其用途甚广。枯矾多研末外用为防腐收涩药。

百草霜 (綱目)

【别名】灶烟墨、鍋底灰、鍋底煤。

【原药形态】本品是用杂草作燃料烧的爐灶鍋底和灶壁的烟灰。其質輕而色黑,且纖細如霜,如用煤作燃料而成的烟墨,不能代用。

【炮制】揀去杂质,水飞,布包入煎,或入丸散。

【性味和归經】味辛,性温无毒。入心、肺二經。

【应用】本品能止血,止泻,解毒。主治泄泻、下痢、粪血,或飲料中毒,并可逐胎血(元亨疗馬集)。外用可治疥癩、鼻衄、外伤出血等症。

【用量】馬和牛 1 两至 3 两;猪和羊 2 錢至 5 錢;兔和鷄 5 分至 1 錢。

【附歌】百草霜温,止血止泻,解毒欬疮,功效佳良。

【配伍】与食盐、桐油調合,治疥癩;配藕节、側柏叶等,可止血,止痢。

【附方】治疥方(养余月令)。

百草霜 食盐或盐漬 桐油

上藥調勻外涂。

五倍子（升宝）

【別名】百虫倉、佩子、文蛤、木附子。

【主要产地】四川、湖北、广东、广西、江西、浙江、山东、河北、甘肃、安徽、貴州等地。

【药用部分】本品是漆树科落叶小乔木，其叶部为蚜虫所刺伤，而在伤部逐渐膨大成囊状虫瘿，此虫瘿即供药用。系干燥品，呈长圆不等的瘿块，或似菱角，或分支作大小不一的裂瓣，长约6—7分至2寸余，粗约3—4分至1寸余，外面呈灰褐色或褐色，密被灰白色絹絲样的短绒毛，皮層厚，坚脆如角質；破碎面光亮，中空，常包藏灰白色的粉質和枯死的蚜虫，且有特异的臭气。

【炮制】采集后将寄生于内部的虫煮死，干燥后打碎用，或煨熟研成粉末（即称为“文蛤粉”）用。

【性味和归經】味酸，性平无毒。入肺、腎、大腸三經。

【应用】本品有瀉腸止瀉、斂肺降火、止血、化痰、止咳等功用。主治腹瀉、久痢脫肛、下血或尿血、肺虛咳嗽、消渴、腸虛泄瀉等。外用治衄血、潰疮、金疮、膿水不干等症。但对于肺火实盛者忌內用。

【用量】馬和牛3錢至1兩2錢；羊和猪1錢至3錢；兔和雞2分至5分。

【附歌】五倍子酸，收斂止血，冷痢要藥，痰咳亦佳。

【配伍】配五味子、訶子肉等，治痰湿氣而咳嗽；配地榆，治幼畜脫肛；配烏賊骨、枯矾等，外治創傷。

【附方】（1）加減文蛤散（甘肅），治牛肺癰症。

五倍子 紫苑 紫蘇 知母 貝母 黃芩 大黃 甘草

桔梗 明矾 白朮 菖蒲 白芷 瓜蒌 金銀花
共研为末，蜜、生姜为引，灌服。

(2)宿砂散(駝經)：治駝脫肛。

五倍子 白矾 密陀僧 木鼈子 龙骨 藁本
以上六味为末，水、葱同药一处煎，放温洗之。

百药煎(綱目)

【主要产地】我国各地均有制造。

【基本形态】本品是由五倍子与茶叶酿制而成的。一般为长约1寸2分，宽约7—8分，厚约3—4分的长方形块，外面呈暗棕色，粗糙而质脆，并包含着有许多淡色的植物纤维碎片，每块平均重约2钱左右。

【炮制】李时珍说：“用五倍子为粗末，每一斤以真茶一两，煎浓汁，入酵糟四两，捣烂拌和，器盛，置糠缸中罾之，待发起如发面状即成矣。捏作饼丸晒干。”

【性味和归经】味酸咸微甘，性平无毒。入肺、肾、大腸三经。

【应用】本品与五倍子相似，具有清肺化痰、止咳解热、生津止渴、收斂、止便血等功用。主治久痢脱肛、肺虚咳嗽、痰饮热渴、多汗、下血、口舌糜烂等症。

【用量】馬和牛3钱至1两2钱；羊和猪1钱至3钱；兔和鷄1分至5分。

【附歌】百药煎酸，清肺定咳，解热化痰，止痢收斂。

【配伍】配蒼朮、荆芥、姜半夏、大黃、滑石、蚕沙、白僵蚕(牛經)，治遍身皮战病；配黃芩、陈皮、甘草等，用于定咳化痰；配陈烏梅、木瓜等，治下痢脱肛。

蕎麥 (嘉祐)

【別名】烏麥、花蕎、甜蕎。

【主要產地】各地都有出產。

【藥用部分】本品是蓼科植物蕎麥的干燥果實。呈三稜形，外表光澤而色黑，磨成粉末時，稱為蕎麥面，干燥莖稱為蕎麥稈，都可作為藥用。

【炮制】蕎麥面炒用，或用開水浸泡攪成濃糊狀應用；蕎麥稈切碎煎浸用，或燒灰用。

【性味和歸經】味甘，性平(寒)無毒。入脾、胃、大腸三經。

【應用】本品能清熱止咳，開胃健脾，下氣利腸。主治肺熱咳嗽、腸胃虛弱，炒用治脾虛泄瀉等症。外用可治癰疽瘰癧、赤腫熱瘡、湯火灼傷等。

【用量】馬和牛4兩至8兩；羊和豬5錢至2兩；兔和雞1錢至2錢。

【附歌】蕎麥甘平，清熱止咳，開胃健脾，下氣止瀉。

【配伍】蕎麥：配茶葉末、生蜜等，治咳嗽上氣；配童便(民間單方)治勞傷肺熱咳嗽；配黃蜡，枯矾(甘肅)，治咳嗽流鼻涕。

【附方】治牛遍身生疥方(元亨疔馬集)。

蕎麥燒灰。

以蕎麥灰淋汁，硫黃少許相和，塗之可愈。

第二節 歛汗澇精葯

浮小麥 (綱目)

【別名】空穀子。

【主要产地】我国出产小麦的地区都有。

【药用部分】本品是禾本科植物小麦不饱满的麦粒。干燥后外表呈黄褐色，能浮在水面。

【炮制】把淘小麦时浮于水面的小麦捞出，晒干，即可供为药用。

【性味和归经】味甘咸，性凉无毒。入心经。

【应用】本品能退虚热，养心补气。主治劳热、自汗等症。

【用量】马2两至4两；猪4钱至5钱。

【附歌】浮小麦凉，能退虚热，养心补气，主治自汗。

【配伍】配牡蛎、黄耆、麻黄根等，可治自汗。

【附方】治牛马多汗症方（兽医中药类编）。

浮小麦 生黄耆 防风

上药煎水，候温灌服。

龙骨（本草经）

【主要产地】山西、四川、河南、广西、山东、河北等地。其他各地亦有出产。

【原药形态】本品是古代脊椎动物的骨骼化石。为类白色而不整齐的块状固体，外面常被复粉霜，质稍脆而硬，有红褐色的斑点；其折断面呈颗粒状，嚼之粘舌。

【炮制】打碎后生用或煨用；必须先煎，或酒浸水飞用。

【性味和归经】味甘澹，性平无毒。入肝、胆、心、肾四经。

【应用】本品能定神镇惊，固澹，收敛。主治惊狂、喘逆、尿中带血、自汗、精滑、泄痢、脱肛、肠风下血等症。外用能收疮口，生肌肉。

【用量】馬和牛 3 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 3 錢；兔和雞 分至 6 分。

【附歌】龙骨甘平，鎮惊定神，固瀉治痢，斂疮生肌。

【配伍】配赤石脂、冰片、樟腦、輕粉、爐甘石等，治鞍伤；配黃丹、白芨等，治馬生疮；配白石脂，治冷泄不止；配牡蠣、金櫻子、白蓮子、葱、酒(四川)，治牛体虛產后白帶。

牡蠣 (本草經)

【別名】牡蛤、蠣蛤。

【主要产地】我国沿海地区多产之。

【药用部分】本品是牡蠣科軟體动物牡蠣的貝壳。全形为卵圓形片壳，外面呈灰黃色而粗糙，內面呈乳白色而光滑，質甚坚硬，不易破碎。

【炮制】洗淨，打碎生用或煨熟研成粉(即称为“牡蠣粉”)，入药时宜先煎。

【性味和归經】味咸澇，性微寒无毒。入肝、胆、腎三經。

【应用】本品能澇腸止汗，軟堅化痰，并有滋阴的功效。主治多汗、白帶、精滑、咳嗽、痰积、衄血等症。

【用量】馬和牛 6 錢至 1 兩 2 錢；羊和豬 2 錢至 4 錢；兔和雞 4 分至 7 分。

【附歌】牡蠣咸寒，澇精止汗，軟堅化痰，衄血亦驗。

【配伍】配天南星、天仙子、砂仁、木鼈子(牡蠣散)，治馬袖口阴肿(外用)；配延胡索、炙香附、全当归、川芎、柴胡、白芨、白蘇、焦黃柏、天花粉、土茯苓、陳艾(牡蠣当归散，四川)，治牛子宮紅腫、阴道潰膿(內服)。

按：牡蠣能軟堅消積而不傷正氣，又能滋益肝腎而瀉熱利水，故為補中有通之藥。甄權說：“病虛而多熱者，宜同地黃、小草（遠志）用之。”無忌說：“牡蠣之咸，以消胸膈之滿，以泄水氣，使痞者消，硬者軟也。”

麻黃根（弘景）

【主要產地】本品主產於華北、西北一帶；其中以山西、河南、河北、內蒙等地產量較多，山西大同產的品質最佳。

【藥用部分】本品系麻黃科植物，其乾燥根供藥用。乾燥根呈彎曲不整，長約6—7寸，粗約5—6分，表面呈紅棕色，有明顯的縱溝，破碎面內部有多數縱行纖維，呈淡黃色，質甚堅硬。

【炮制】剪去須根，洗淨後，切斷，曬干用。

【性味和歸經】味甘，性平無毒。入心、肺二經。

【應用】本品有止汗的功用。主治氣虛、脾虛及血虛時的自汗。但有表邪者忌用。

【用量】馬5錢至1兩5錢；羊1錢至3錢。

【附歌】麻黃根甘，功能止汗，陽虛自汗，止之不难。

【配伍】配牡蠣、黃耆等，可治自汗。

五味子（本草經）

【別名】北五味子。

【主要產地】遼寧、吉林、內蒙、陝西、河北、山西、浙江、江西等地。

【藥用部分】本品屬木蘭科落葉藤本植物，入藥用其乾燥的果實，略呈球形，直徑1分半至2分多，外皮呈紫褐色而有光澤，有

不整齐的皺縮，內部藏有 1—2 个肾脏形而呈橙黄色的种子。此外尚有同科植物的果实，称为南五味子，也供药用。



图 87 北五味子

左、北五味子原植物；右、药用部分外形(果实及种子)。

【炮制】将果实洗净，蒸熟，晒干用或醋制用，或酒浸，炒焦用，忌铁器。

【性味和归经】味酸而咸，性温无毒。入肺、肾二经。

【应用】本品能益气生精，补虚滋阴；止泻，敛肺止喘。主治咳嗽喘急、气液耗散、精滑、久泻冷痢等症；公畜阳衰时，也可用之。若

馬肺中火邪逆上、胸膈脹滿时，多服則生虛熱，应注意使用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 2 分至 5 分。

【附歌】五味酸溫，益氣滋陰，歛肺定喘，止瀉瀉精。

【配伍】配麻黃、細辛、干姜等，可治有表邪的喘咳；配厚朴、青皮、牽牛子、官桂、砂仁，治馬脾胃寒不食草。

桑螵蛸（本草經）

【別名】螳螂窠。

【主要產地】產桑地區都有出產，以浙江、江蘇的產量較多。

【藥用部分】本品是螳螂產卵的卵鞘、結於桑樹上者，呈長卵形袋狀塊，其一端膨大而肥厚，另一端細小而薄，長約 5 分至 1 寸半，呈黃褐色，背面中央凸出一條縱稜，由多數薄片組成復瓦狀；質輕而韌，鞘內有并排的卵子，卵殼呈紅褐色。

【炮制】放蒸籠內蒸 40 分鐘左右，或火烘半小時至 1 小時，揀去雜質，炙用，或酒浸，焙用。

【性味和歸經】味甘咸，性平無毒。入肝、腎二經。

【應用】本品能瀉腸止瀉，益腎固精。主治小便頻數、精滑、陰萎、風症、虛勞自汗、久瀉冷痢等症。對於陰虛多火者禁用。

【用量】馬和牛 4 錢至 1 兩；羊和猪 1 錢至 3 錢；兔和鷄 2 分至 4 分。

【附歌】桑螵甘平，止瀉固精，益氣補陰，亦治風症。

【配伍】配豆蔻、砂仁等，可治冷痢。

【附方】(1) 螵蛸散（安驥藥方）：治馬患慢風及破傷風并諸風病。
桑螵蛸 天麻 全蠍 防風 蔓荊子 何首烏 羌活 獨活

烏蛇酒浸去皮壳 天南星炮 細辛去叶 沙參 高良姜 阿膠
炒燥 白殭蚕微炒 蟬蛻去土 藿香 旋復花 白附子(新羅
者) 川芎

上藥為細末，酒同調煎，放溫灌之，隔日再灌。

按：桑螵蛸生用能泄瀉，故用為固瀉藥時，必須蜜炙，才能收到功效。“別錄”謂：“凡使桑螵蛸，即桑枝上螳螂子也，采來蒸過火炙用。”桑螵蛸若配合龍骨應用，可治公畜精滑。

金櫻子（蜀本草）

【別名】刺梨子、山石榴、山鷄頭子。

【主要產地】廣東、廣西、四川、江西、河南、甘肅等地。

【藥用部分】本品系薔薇科蔓狀灌木，其果實供藥用。全體呈長圓形，大如指，其先端宿萼作喇叭口狀，類似安石榴，中部膨大，下部漸小，全長約5分至1寸，粗約3分至5分，外表呈黃褐色或赤褐色，散布有多數細刺，如剖開，內藏有多數淡黃色的瘦果（俗稱種子），外面附着淡黃色的細毛。

【炮制】將原藥擦去刺，對剖開去核去毛，曬干生用或蜜炙用。

【性味和歸經】味酸澆，性平無毒。入脾、肺、腎三經。

【應用】本品能澆精，固腸，收斂止血。主治脾虛泄痢、小便頻數等症。對於有實熱邪熱者忌用。

【用量】馬和牛6錢至1兩5錢；羊和豬2錢至3錢。

【附歌】金櫻子平，固腸澆精，脾虛下痢，收斂止血。

【配伍】配芡實、蓮子，治久痢不止。

【附方】（1）治子宮脫出方（湖北）。

金櫻子 蛇床子

上药煎水灌服(同时煎水冲洗更好)。

(2)治牛精滑方(浙江)。

金樱子 龙骨 牡蛎 芡实 莲米

共研末,葱、酒为引,加温酒灌服。

表 39 固澇药归纳简表

类别	药名	性 味 及 归 经	功 用	用 量 (钱)		
				马 牛	羊 猪	兔 鸡
澇 腸 止 瀉 藥	訶 子	苦酸澇温,入肺、大腸	澇腸止痢,調气温脾	5—12	1—2	0.2—0.5
	烏 梅	酸澇温,入肝、脾、肺	斂肺澇腸,止痢杀虫	5—10	1—2	0.2—0.5
	石榴皮	酸澇温,入肺、腎、大腸	澇腸止痢,驅虫固精	6—16	1—2	0.4—0.6
	肉豆蔻	辛温,入脾、胃、大腸	久瀉冷痢,化痰順气	5—10	1—2	0.2—0.5
	禹余糧	甘澇微寒,入胃、大腸	固澇下焦,瀉熱止痢	5—15	2—4	0.2—0.5
	赤石脂	甘咸温,入胃、大腸	固腸除濕,主治久痢	5—15	1—3	0.2—0.5
	伏龙肝	辛温,入脾、胃	調中止血,外敷消腫	8—20	3—5	0.5—1
	孩儿茶	苦澇微寒,入肺經	清熱化痰,收斂止血	3—10	1—3	0.1—0.6
	明 矾	酸寒,入肺、脾	燥濕斂腸,杀虫解毒	3—8	1—2	0.3—0.5
	百草霜	辛温,入心、肺	止瀉止血,解毒斂瘡	10—30	2—5	0.5—1
飲 汗 澇 精 藥	五倍子	酸平,入肺、腎、大腸	收斂止血,止咳止痢	3—10	1—3	0.2—0.5
	百藥煎	酸咸甘平,入肺、腎、大腸	清肺定咳,止痢收斂	3—12	1—3	0.1—0.5
	蒼 麥	甘平,入脾、胃、大腸	清熱止咳,消積寬胸	40—80	5—20	1—2
	浮小麦	甘咸凉,入心經	能退虛熱,養心補气	20—40 (馬)	4—5 (猪)	—
	龙 骨	甘澇平,入肝、胆、心、腎	鎮惊定神,固澇治痢	3—10	1—3	0.2—0.6
	牡 蠣	咸澇微寒,入肝、胆、腎	澇精止汗,軟堅化痰	6—12	2—4	0.4—0.7
	麻黄根	甘平,入心、肺	制止自汗	5—15 (馬)	1—3 (羊)	—
	五味子	酸咸温,入肺、腎	益氣滋阴,斂肺定喘	5—10	1—2	0.2—0.5
	桑螵蛸	甘咸平,入肝、腎	止瀉固精,益氣補阴	4—10	1—3	0.2—0.4
	金樱子	酸澇平,入脾、肺、腎	澇精固腸,收斂止血	6—15	2—3	—

第十六章

驅虫藥和杀虫藥

凡能驅除或杀灭家畜体内、外寄生虫的藥物，都称为驅虫藥和杀虫藥。

驅虫藥常用于家畜体内的寄生虫病，但內服时必须根据家畜體質的强弱、病情的緩急，采取急攻或緩驅。对于体虛脾弱的患畜，可采用先补后攻或攻补兼施的方法；用藥后并应調补脾胃，在一般情况下，以空腹服藥較為适宜。

杀虫藥常作为外用，但要注意其毒性，特別是要防止患畜的舐食，并应避免在体表广大部分涂藥。

在兽医治病用藥上，驅虫藥和杀虫藥常常不易区分，因之，列在一章里加以叙述。

槟榔（別录）

【別名】花槟榔、尖槟榔、大肚子、花大白、海南片。

【主要产地】詳大腹皮項下。

【藥用部分】本品是棕櫚科常綠乔木，入藥用其干燥成熟的种子。呈卵圓形或圓錐形，基部平截，較為膨大，頂端較小，长8分至

1 寸，直徑約 5 分至 7 分，外表面呈淡紅棕色或紅褐色，并有淺色的網紋，基部中央有一臍点，質坚硬，不易碎，橫切面有棕白相間的大理石样花紋。




图 88 枳 櫚

左、中、外形：1. 网紋，2. 臍点；右、横切面。

【炮制】碾碎用或以水浸泡 10 天左右，浸透后切成薄片阴干，生用。

【性味和归經】味苦辛溫，性温无毒。入胃、大腸二經。

【应用】本品能下气利水，去积，杀虫（主要是扁虫、蛭虫）。主治虫积、食滯、食欲不振、水肿脹滿等症。气虛下泻时忌服。

【用量】馬和牛 5 錢至 2 两；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 4 分至 1 錢。

【附歌】枳櫚辛温，破积杀虫，水肿脹滿，下气行水。

【配伍】配貫众、石榴皮、雷九、使君子、苦楝皮等，可驅除扁虫及蛭虫；配石榴皮、貫众、南瓜子（新牛馬經），治扁虫；配胡黃連、苦參、苦楝子、大黃、朴硝（中央衛生部研究院），治馬胃瘦虫。

【附方】(1) 枳櫚散（元亨疗馬集）：治牛患浮凉气。

枳櫚 紅豆 豆蔻 芍药 干姜 甘草 当归 砂仁 青皮
官桂 白芷 陈皮

上研為末，棗為引，水同煎放溫灌服。

(2)治馬瘦蟲方(山西)。

楝榔 使君子仁 牽牛子 鶴虱 大黃 朴硝 蒼朮 貫眾
共研末，加白糖，麻油為引，灌之。

對於老瘦氣虛者，劑量從輕。

按：楝榔為散結破滯、下泄殺蟲藥，它與大腹皮在功用上又稍有區別：楝榔體重而實，性烈味厚而沉，故主消積殺蟲，下泄利水；大腹皮性輕浮，故主下氣行水消滯。黃宮繡說：“大腹皮辛熱性溫，比之楝榔，大有不同，蓋楝榔性苦沉重，能泄有形之滯積，大腹皮其性輕浮，能散無形之積滯。”此乃二者的區別。

貫眾（本草經）

【別名】貫仲、管仲。

【主要產地】廣東、福建、浙江、江蘇等地，東北產的貫眾，實為亞洲綿馬。

【藥用部分】本品是水龍骨科多年生草本植物，入藥用其干燥根莖和葉柄基部。根莖近圓柱形，外被黑褐色葉柄殘基，先端和柄基的縫隙中常有紅棕色鱗片狀毛，葉柄殘基向前端斜生，稍彎曲，長約1寸左右，有稜綫；根莖橫切面呈綠褐色。

【炮制】剪去須根，水浸洗淨，切片陰干，或用鮮品。

【性味和歸經】味苦，性微寒有小毒。入肝、胃二經。

【應用】本品能殺蟲（主要是驅除扁蟲）解毒，清熱散瘀。主治蟲積，腹痛腹熱、諸瘡，并可治疥。

【用量】馬和牛6錢至2兩；羊和豬3錢至5錢；兔和雞5分至7分。



图 89 贯 众

左、贯众原植物； 右、药用部分外形：1. 叶柄残基，2. 鳞片，3. 横切面。

【附歌】贯众苦寒，杀虫解毒，清热散瘀，外治疥癩。

【配伍】配槟榔、雷丸、石榴皮等，可驱扁虫。

【附方】(1)贯仲散(元亨疗马集)：杀虫。

贯仲 鹤虱 花椒 臭橘 蕪荑 蛇床子

上药加水煎，去渣，将兽搏倒，摘去蜱虫，次以药汤，将袖口包皮翻过，带热洗之。

(2)贯众散(安骥药方)：治马肺毒疮或患肺痿、揩擦、毛头受塵。

贯众 白药子 枇杷叶 陈皮 青皮 马兜铃 紫苏子

何首烏 瓜蒌根 桑白皮 葶藶 牽牛子 款冬花 紫苑
白蒺藜 杏仁去皮尖

上藥为末,水、蜜同煎,放温,草后灌之。

使君子 (开宝)

【別名】留求子、四君子、君子肉、均子。

【主要产地】四川、福建、云南、貴州、广东、江西、广西等地。

【藥用部分】本品是使君子科常綠蔓性木本植物,入藥用其干



图 90 使君子

左、使君子原植物； 右、藥用部分外形及橫切面。

燥的果实。干燥果实表面呈黑褐色，系紡錘形，有五条縱稜，稜間陷凹；長約8分至1寸，直徑5分至6分，果皮堅硬而光滑，內含黃褐色種子一枚，種仁外表呈淡黃色，內部為類白色，富含油脂。

【炮制】連壳打碎用，或去壳取仁炒香用。

【性味和归經】味甘，性溫無毒。入脾、胃二經。

【應用】本品能殺虫（主要是驅蛭虫）健脾胃。主治蛭虫病或虫積腹痛；對於肚脹腹滿，也可應用。

【用量】馬和牛6錢至2兩；羊和豬2錢至4錢；兔和雞5分至1錢。

【附歌】使君子溫，殺虫健脾，虫積腹痛，功效顯著。

【配伍】配苦楝皮、檳榔、花椒等，可驅除蛭虫。配公丁香、朴硝、牙皂、巴豆霜（甘肅），治豬蛭虫；配檳榔、石榴皮、貫眾、蕪荑、牽牛子、木香、朴硝、甘草、陳小麥（山西），治馬瘦虫。

【附方】治雞蛭虫方（湖南）。

使君子 苦楝皮

上藥研末，做成黃豆大的丸子，灌服。

苦楝子（本草經） 附：苦楝根皮

【別名】金鈴子、川楝子。

【主要產地】我國南方各地都有，其中以四川萬縣、合川、雲陽產者為佳。

【藥用部分】本品是楝科落葉喬木苦楝的乾燥果實。根皮亦供藥用。

果實：系近球形而肥大，直徑約5分至8分，外表呈淡褐色或土褐色，皺縮不平，表面光澤，外果皮軟而薄，容易剝去，果肉為土




图91 苦楝

左、苦楝子原植物：1.苦楝子；右、苦楝根皮。

黃色，顆粒性，內藏5個褐色種子。

苦楝根皮：呈長條形不規則塊片，向內微卷，外表栓皮呈灰褐色，粗糙，有屈曲縱橫裂紋，內面呈黃白色或黃褐色，平坦而有撕裂的纖維條片，質脆，斷面為纖維性。

【炮制】果實乾燥後，生用或炒用。根皮去粗皮後，曬干後折碎煎用。

【性味和歸經】味苦，性寒有小毒。入肝、心包、小腸、膀胱四經。

【應用】本品能殺蟲，除濕熱，暖腰腎。主治蟲積（驅除蛔蟲、扁蟲等）、小腸冷氣等症。根皮煎汁，內服治蟲積；外用可治惡瘡疥癩，亦可作農藥用。對於脾胃虛寒者禁用。

【用量】苦楝子：馬和牛6錢至1兩6錢；羊和豬2錢至3錢。

苦楝根皮：馬和牛 1 两至 3 两；羊和猪 2 錢至 5 錢。兔和鷄 2 分至 6 分。

【附歌】苦楝苦寒，杀虫去积，小腸冷气，功效頗佳。

【配伍】配使君子、花椒等，驅蛔虫；配貫众、楝榔、鶴虱、雷丸等，驅腸虫；配茴香，当归等，治小腸冷气。

【附方】(1)苦楝散(师皇安驥集)：治馬小腸气。

苦楝 茴香 当归 沒药 延胡索 藁本 甘草

以上共为末，加葱、酒同煎放冷，草前灌服。

(2)金鈴散(安驥药方)：治馬口色青白、伤冷、腰胯痛或阴肿肚黄病。

苦楝子 沒药 茴香 葫蘆巴 杏仁去皮尖 乳香 陈橘皮
白芷 荆山稜 牵牛子 莪朮 血竭 車前子 紫苑 延胡
索 补骨脂 青橘皮 木通

上药为末，葱白煨过、热酒同調，空草灌之。

榧子 (別录)

【別名】榧实、玉山果、香榧。

【主要产地】浙西、江苏、江西、湖北、安徽、四川、福建等地。

【药用部分】本品是紫杉科常綠乔木榧的干燥成熟果实。呈长橢圓形，一端尖，一端鈍圓，长约 8 至 9 分，粗約 5—6 分，外表黃褐色，壳坚硬，有多数縱皺，內含有种仁一枚，外被包一層黑褐色种皮；种仁白色，富含油脂。

【炮制】去壳，生用或炒用。

【性味和归經】味甘澆，性平无毒。入肺、大腸二經。

【应用】本品能杀虫（驅除蛭虫），消积，潤腸。主治虫积。但內服能滑腸。脾虛瀉下的患者忌用。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 2 錢；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 2 分至 6 分。

【附歌】榧子甘平，功专杀虫，潤腸消积，脾虛禁用。

【配伍】配使君子、枳榔等可驅虫消积。

鶴虱（唐本草）

【主要产地】浙江、江苏、江西、安徽、湖南、湖北、河南等地。

【药用部分】本品是繖形花科植物的干燥果实。果实长约 1 分左右，邊緣有多数細长的白色刺，脊面中央有二条稜脊，亦生細长刺；腹面平直，有 2—3 条縱行綫，形状如虱。据“本草綱目”所載，鶴虱是天名精的果实。

【炮制】生用或炒用。

【性味和归經】味苦辛，性平有小毒。入大腸、肝二經。

【应用】本品能杀虫（驅蛭虫、蟯虫）。主治虫积腹痛。外用能治疥癩和諸疮。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩；羊和猪 1 錢至 2 錢；兔和鷄 4 分至 6 分。

【附歌】鶴虱苦平，专主杀虫，外治疥癩，蜂蜜为引。

【配伍】配枳榔、使君子等，治虫积腹痛；配苦楝皮、雷丸、枳榔、蕪荑、使君子、酥油（河北），治馬扁虫、瘦虫。

【附方】猪多虱症方（猪經大全）。

鶴虱 蛇床子

共为末，牛皮熬胶，煎水調擦。

雷丸 (本草經)

【别名】雷实、竹苓。

【主要产地】四川、湖北、湖南、安徽、浙江、福建、江西等地。

【药用部分】本品是多孔菌科雷丸的干燥菌体，多寄生于竹根。菌体呈不规则球形或块状，大小不定，一般直径7—8分，表面灰褐色或黑色，内部类白色，质坚硬。

【炮制】水浸透，切片晒干用，或研粉用。

【性味和归经】味苦，性寒有小毒。入胃、大腸二经。

【应用】本品能杀虫去积。主治虫积(扁虫)、胃中湿热等症。

【用量】馬和牛6錢至1两5錢；羊和猪2錢至4錢。

【附歌】雷丸苦寒，杀虫去积，胃中湿热，屡用有效。

【配伍】配贯众、槟榔、鹤虱、使君子等，治虫积症。

【附方】杀虫散(四川)：治猪各种虫病。

雷丸 榧子 使君子 苦楝皮 大风子 蛇床子 贯众

百部 厚朴 枳实 石榴皮

共为細末，放入飼料內，連喂二日。

臭椿皮 (唐本草) 附：椿根白皮

【别名】樗皮。

【主要产地】本品主产于山西、甘肃、河北、江苏、浙江、江西、湖南等地。

【药用部分】臭椿皮是樗树科落叶乔木樗树的根皮，亦称樗根皮。干燥品呈长形条片，厚約1—2分，外表呈土灰色，粗糙而有菱形皮孔，内面为土黄色，較平坦，有細密长圓形小孔，质坚硬，不易

斷；斷面呈纖維狀黃色，有臭氣。

椿根白皮是棟科落叶乔木椿樹的根皮，干燥品呈不定形碎皮，厚約半分至1分半，長約數寸，表面呈土黃色或土褐色，有深皺褶，形成凹凸鈍稜，內面平坦，呈黃白色；質堅而脆，易折斷，斷面為纖維狀帶顆粒性，呈橙黃色或黃白色。富有特殊氣味。

【炮制】括去粗皮晒干，生用，蜜炙或醋炙用。

【性味和歸經】味苦澀，性寒有小毒。入胃、大腸二經。

【應用】本品(包括兩種根)能消脹殺蟲，清熱燥濕，收澀固腸。主治蛔蟲肚脹、腸風下血、疥癩等症。

【用量】馬和牛5錢至2兩；羊和豬2錢至4錢。

【附歌】臭椿苦寒，殺蟲清熱，燥濕固腸，又擦疥癩。

【配伍】煎汁配油，治肚脹；粉末調油，治疥癩。

【附方】治牛肚脹病方(安徽)。

臭椿皮 元醋 食油 檳榔 萊菔子

將臭椿根皮、檳榔、萊菔子等煎水，再混合醋、油，一次灌服。

蕪荑(別錄)

【別名】蒞荑、蕪子。

【主要產地】山西、河南、河北、甘肅、廣東等地。

【藥用部分】本品是榆科落叶小乔木蕪荑的果仁。干燥品因加工而呈黑褐色或污灰色的扁平方塊，外表粗糙不平，質輕，往往夾有殘存之果皮和枝葉截片，富有特殊臭氣。

【炮制】果實去殼后，壓成四方形塊狀物，晒干用。

【性味和歸經】味辛苦，性溫無毒。入脾、胃二經。

【應用】本品能殺蟲消積，散風除濕。主治心腹冷積、腹內蟲

痛、腸冷泄瀉等症。但多服則发心热痛,应予注意。外用可治疥癩。

【用量】馬和牛 4 錢至 8 錢;羊和猪 1 錢至 3 錢。

【附歌】蕪荑辛温,杀虫治疥,散风除湿,都可采用。

【配伍】配枳榔、使君子、苦楝皮、鶴虱等,可治蟯虫症。

土茯苓 (綱目)

【別名】冷飯团、奇粮、山猪粪、木猪苓、仙遺粮。

【主要产地】江西、浙江、江苏、湖南、湖北、山东等地。

【药用部分】本品是百合科攀緣性植物的干燥根莖,呈弯曲扁圓柱形,长约 1 至 4 寸,或更长,粗約半寸至 1 寸,外表为赤褐色,




图 92 土茯苓

左、土茯苓原植物; 右、药用部分外形及横切面。

有結节，質堅而輕；橫切面呈类白色或粉紅色，为顆粒性。

【炮制】洗淨，晒干用，或切片晒干用。

【性味和归經】味甘淡，性平无毒。入肝、胃二經。

【应用】本品能杀虫、解毒、健脾胃、强筋骨、利小便、去风湿。主治恶疮癰毒、皮肤瘙痒、癰癤、拘攣骨痛、水肿咳嗽、泄泻。能解水銀、輕粉等毒。外用可治疥癩。

【用量】馬和牛 6 錢至 2 兩；羊和猪 4 錢至 6 錢；兔和鷄 1 錢至 2 錢。

【附歌】土茯苓平，杀虫解毒，消肿除湿，内外都用。

【配伍】配薏苡仁、金銀花、防风、木通、木瓜、白蘚皮、皂角子，能搜风解毒。

【附方】一枝箭湯(四川)：治牛各种黄症。

土茯苓 白芨 天花粉 皂角 黄柏 甲珠 金銀花 連翹
荆芥 陈皮 乳香 沒藥 知母 蒲公英 皂角刺

加蜂蜜为引，研末加开水候温灌服，一日两次。破潰者去甲珠、皂角刺。

大蒜 (綱目)

【别名】蒜头、葫、葷菜。

【主要产地】我国南北各省都有出产。

【药用部分】本品是百合科大蒜的鱗莖，呈扁球形，外皮白色或紫紅色，内有多数瓣，中央有一軸，瓣肉为白色，平滑光澤，碎之有濃烈臭气。

【炮制】剝去外皮，切碎或搗成蒜泥生用，一般以新鮮者为佳。

【性味和归經】味辛，性温有小毒。入肝、胃二經。

【应用】本品能健脾胃、温肾、杀虫、清热解毒。主治虫积、风湿冷气、泻痢腹痛、食滞臌胀、胞转等症。因有小毒，不可多用。

【用量】馬和牛 6 錢至 1 两；羊和猪 2 錢至 4 錢；兔和鷄 1 分至 5 分。

【附歌】大蒜辛温，杀虫解毒，消积治痢，疗牛肚脹。

【配伍】本品通常多单用，为了减弱其烈性，可和油同用，以治疗肚痛臌胀病。

【附方】(1)治鷄腹泻(下痢)方(兽医国药及处方)。

大蒜 牡蠣粉

上药混合后，一日喂 2—3 次。

(2)治鷄霍乱方(四川)。

大蒜 甘遂 芫花 大戟 大黄 明雄 明矾 甲珠 梔子
巴豆 桑螵蛸

共研为极細末，每日喂二次。

硫黃 (本草經)

【主要产地】山西、四川、湖南、云南等地。

【原药形态】本品为硫矿中的硫黃石，呈黄色或黄綠色塊状，有光澤，遇火則燃燒而发出臭气。一般以黄色的为佳，黄綠色的为次品。

【炮制】制成粉末，除去杂质，即可供药用。

【性味和归經】味酸，性温有毒。入肾、心包二經。

【应用】本品能杀虫，通便，壮骨骼，敷諸疮，温肾，补虚癆。主治疥癩，虚寒粪結，寒痰，并可作鷄、鴨、鵝的催肥药。因其有毒，不可多用；且禁用于屠宰及乳用家畜。忌与朴硝同用。

【用量】馬和牛 3 錢至 1 兩；羊和豬 1 錢至 2 錢；兔和雞 1 分至 3 分。

【附歌】硫黃酸溫，殺蟲通便，治疥敷瘡，喂禽催肥。

【配伍】配棉子油外搽，治疥癩，配大風子、輕粉（甘肅），治疥癩。

【附方】疥瘡方（元亨疔馬集）。

硫黃 花椒 三柰子

用鍋焙干，研成細末，用豬油調勻，洗患部后，搽藥，效果良好。

按：硫黃為治疥癩殺蟲要藥，因其有毒，一般在使用上，內服者較少，外用者較多。如中硫黃毒，可用黑鉛煎湯解之。

水銀（本草經）

【別名】水元、活寶。

【主要產地】貴州、四川、湖南、山西、陝西等地。

【原藥形態】本品是由汞礦中提煉制成的，為有銀色光輝、易流動的重質液體。在常溫時，容易分裂成為小球，應注意保管。

【炮制】研末時，應與硫黃以及桃仁、杏仁等含油物質同研。

【性味和歸經】味辛，性寒有毒。未載歸經。

【應用】本品主為外用、殺蟲。主治惡瘡疥癩、死胎、胆脹。本品能墮胎，對牛又容易引起中毒，應用時須注意。

【附歌】水銀辛寒，主治諸瘡，殺蟲除疥，外用為當。

【配伍】配硫黃、大風子、枯礬、胡桃肉，治疥癩。

雄黃（草本經）

【別名】雄精、石黃、明雄、塊雄、腰黃。

【主要产地】湖南、甘肃、云南、四川、贵州等地。

【原药形态】本品是砷矿中的结晶，系红黄色不透明的块。其赤如鸡冠的称雄精，品质最好；其色黄质轻的称腰黄，品质较次；其较腰黄色红，透明度较差的，称为雄黄；其色较暗的，称为雌黄，品质最次。

【炮制】揀去石块，研成细末。忌见火，否则毒性加强。

【性味和归经】味辛，性温有毒。入肝、胃二经。

【应用】本品能杀虫，解蛇虫毒，蚀癰疮。可治息肉、喉风、寸白虫、涎积癰瘤、蛇咬伤、疥癩等症。主作外用，内服必须小心，孕畜禁用。

【用量】马和牛2钱至5钱；羊和猪2分至5分。

【附歌】雄黄辛温，杀虫解毒，外蚀癰疮，妊娠忌服。

【配伍】配花椒、白芨、乌头、硫黄、白矾、芸苔子、官桂、大黄、白芥子(雄黄散)，敷马各种肿毒及筋骨胀大；配甘草、大黄、白僵蚕、薄荷、钩藤、明矾、荆芥、防风(甘肃)，治小驹四六风。

【附方】(1)雄黄散(元亨疗马集)：涂敷于马黄肿。

雄黄 白芨 白矾 龙骨 大黄

上共研为细末，并花水调匀，涂于肿处，如干再涂。

(2)治羊疥(齐民要术)。

用腊月猪油加雄黄涂上，即愈。

按：雄黄是疮疡虫螫外科常用的药物，其性能杀虫、解毒。因雄黄性热有毒，内服宜慎用，病愈时立即停止。外用蚀恶肉及杀虫时，因腐蚀力强，终不免侵蚀好肉，亦要慎重使用为是。

輕粉 (嘉祐)

【别名】膩粉、汞粉、扫粉。

【主要產地】湖南、廣東、四川等地。

【原藥形態】本品是由汞礦中水銀升煉而成的片狀白色固體，外表有光澤，以質輕者為佳。

【炮制】輕粉制法：用水銀 6 斤 4 兩、胆礬 3 斤半、食鹽 3 斤、紅土 10 大碗，先將胆礬、食鹽放於磁缸內，加水 3 斤，混合後，倒入水銀拌攪，然後加入紅土，拌成半濕半干的軟泥團，捏成 10 個饅頭形，放在加有砂泥的平底鍋中，加蓋，用黃土封口，再用炭 47 斤，加熱到相當時間，則泥土饅頭形上和鍋里呈現雪花狀多角形片，用鷄毛掃起，揀去雜質，即得輕粉。

【性味】味辛，性寒燥烈而有毒。

【應用】本品能殺蟲、滑腸、消積、逐水。外用治疥，止痒；內服可去積通便，消水腫。對牛羊毒性大，以不用為宜。

【用量】馬 5 分至 1 錢 5 分；豬 1 分至 2 分。

【附歌】輕粉辛寒，殺蟲去積，逐水消腫，牛羊慎用。

【配伍】配黃丹、乳香等，治疥癩。

蛇床子（本草經）

【別名】蛇粟、蛇牀。

【主要產地】廣東、廣西、江蘇、安徽等地。

【藥用部分】本品是繖形花科二年生草本植物，入藥用其干燥的果實。呈橢圓形，大小如芝麻，為淡褐色，系二分果合抱而成，表面有縱稜綫，中間有細縱紋綫。

【炮制】將果穗微晒，用手揉搓，使殼脫離，揚去雜質，晒干即成；一般用酒浸，炙用。

【性味和歸經】味辛苦，性溫有小毒。入腎、三焦二經。

【应用】本品能杀虫，壮阳益阴，疏风去湿。可治腰痛、尿频、骨节疼痛、阴部生疮、肾虚、疥癩等症。

【用量】马和牛2钱至6钱；羊和猪5分至2钱。

【附歌】蛇床子温，杀虫治疮，壮阳补肾，疏风去湿。

【配伍】配硫黄、狼毒、枯矾等，治疥癩；配五味子、菟丝子、蜂蜜，可治公畜阳痿。

藺茹（本經草）

【别名】草藺茹

【主要产地】山东、浙江、江西等地。

【药用部分】本品是大戟科多年生植物，入药用其干燥根。根为褐色横走，其内部呈白色。

【性味和归经】本品味辛，性寒有小毒。

【应用】本品能杀虫。主作外用，可治疥癩，或蚀恶肉。

【附歌】藺茹辛寒，杀虫治疥，并蚀恶肉，主作外用。

【配伍】配轻粉、臭椿皮等，治疥癩；配膩粉、藜蘆、皂角、桔梗、臭椿皮（涂疥方），治马干瘡。

馬齒莧（蜀本草）

【别名】五方草。

【主要产地】我国中部以南地区的园圃中都有。

【药用部分】本品是馬齒莧科一年生草本植物，入药用其全草。干燥的莖为圆柱形，微弯曲，有细纵皱，叶为黑褐色，呈长椭圆形，全缘而质厚，易碎裂。

【炮制】洗净后，用开水烫过，晒干，原药用。

【性味和归經】本品味酸，性寒無毒。入心、肝、脾三經。

【應用】本品能杀虫解毒，清熱散血。主治血痢、小便不利、虻虫；如搗汁外用可治惡瘡，其子能明目除翳。

【用量】馬和牛 1 兩至 4 兩；羊和猪 4 錢至 1 兩；兔和雞 5 分至 2 錢。新鮮者加倍量。

【附歌】馬齒莧寒，杀虫解毒，清熱止痢，外治惡瘡。

【配伍】通常以單用為多。

【附方】治馬打破脊梁方（元亨疔馬集）。

馬齒莧 石灰

上共搗為丸，陰干后再研為末，椒湯洗清患部，干貼用。

大风子（補遺）

【別名】大楓子、大丰子。

【主要產地】廣東、四川、福建及越南、印度等地。

【藥用部分】本品是椅科常綠喬木大风子的種子。全體為不整卵形或不正橢圓形，長約 1 至 5 分，其外殼硬，有鈍角，外面呈灰褐色，不易破裂；內藏有白色柔軟的種仁，富含油脂。

【炮制】捶破除去硬殼，取仁研碎，以紙壓去油，置瓶中密貯應用，外用不必去油。

【性味和归經】味辛，性熱有毒。未載归經。

【應用】本品能燥濕攻毒、杀虫。主治風癬疥癩諸瘡，且為外科瘡瘍要藥。因有毒能傷血，很少內服。

【用量】牛 2 錢至 6 錢；外用無定量。

【附歌】大风子熱，功能燥濕，攻毒杀虫，外治疥癩。

【配伍】配木鼈子、五倍子、硫黃、蛇床子、花椒等，塗擦疥癩；

配蒼耳子、刺蒺藜，可外用洗滌疥癩瘡痒。

【附方】(1)治馬疥癩方(河北)。

大风子 狼毒 棉子油

上药用棉子油炸后，涂抹患处。

(2)治羊疥癩方(山西)。

大风子 蛇床子 硫黄 木鼈子

上药共为末，加生姜汁，猪油捣在一起，装入白布袋内，烤热擦患处。如湿疥加水銀。

木鼈子 (开宝)

【别名】木必藤、木别子、土木鼈、漏蓝子。

【主要产地】广东、广西、云南、四川、西藏、湖南等地。

【药用部分】本品是葫蘆科多年生藤本植物木鼈的种子。为扁平类圆形，边缘有多数不整齐的突起，状如多角形，直径约1寸左右，厚约1至2分，呈灰褐色，有皱纹，其外种皮坚厚如鼈壳；种仁为类圆形，表面呈灰绿色，内部显赤褐色。

【炮制】去壳纸包，压去油用，或去壳，热水浸，炙用。

【性味】味苦微甘，性寒有毒。未载归经。

【应用】本品能散血热，消癰肿。主为外用治疗疮肿毒，槽结瘰癧；并有生肌、止腰痛等功效，内服宜慎。

【用量】馬和牛2錢至5錢。

【附歌】木鼈子寒，散血消肿，生肌止痛，主作外用。

【配伍】配血余、黄蜡、猪油、枇杷叶等外用，可生蹄；配穿山甲、黄柏，可治风疮；配白芨，外用治槽结瘰癧。

【附方】(1)木鼈散(元亨疗马集)：治马气毒，鼻孔准头破裂

風痧。

木鼈子 出衣粉(头等面粉) 穿山甲 黃柏

上藥研為細末，醋打面糊，熬成膏涂于鼻端，隔日再涂，三日愈。

(2) 茱萸散(元亨疔馬集)：治馬腰背緊硬，拽腰膀痛。

吳茱萸 木鼈子 蒼朮 花椒 萆薢 草烏 狗脊 芫花

上藥為末，加醋、面、大蒜等共搗碎，熬熟，貼于腰上，神效。

砒石(升寶)

【別名】砒霜、信石、人信、人言、紅砒、白砒。

【主要產地】江西、湖南、廣東等地。

【藥用部分】本品是砷礦中所含之砒石，有紅砒、白砒兩種。若再升華而精制之，則為透明如玻璃之塊，露置空氣中漸變為白色的粉末。

【炮制】內用者將原藥置鍋內炒，至鍋內見火後取起，以童便浸淬，候冷研細，再和豆腐拌炒，以豆腐炒焦為度，待冷後，用油布或油紙包裹，埋入土內，經2—3天後，挖出研細，貯瓶中應用。外用者將原藥研末用。

【性味和歸經】味辛酸，性大熱，有劇毒。未載歸經。

【應用】本品能祛痰，殺蟲，墮胎，蝕癰瘡腐肉，并有補血、助氣、活血、改善營養、強壯體質、潤澤皮膚等功效。主治癰癤瘰癧、腐疽腐肉。內服治吼喘、頑痰、血虧、心虛衰弱等症。有大毒，須慎用。孕畜忌用。

【用量】馬和牛1分至3分；羊和豬2厘至4厘。

【附歌】砒石大熱，蝕瘡腐肉，內服祛痰，補血助氣，因有大毒，須當慎用。

【配伍】配藜蘆、百草霜(砒霜散)，貼馬肺毒疮；配雄黃、雌黃、輕粉、礞砂(外用)；治陰毒瘰癧，配硫黃、輕粉、密陀僧，研末外敷，治干濕諸癬，經久不愈；單服最小量，有補血、催肥之效。

【附方】一点散(安驢藥方)：取馬癰子。

砒霜 紅娘子 巴豆

上藥三味共為末，用好醋調塗癰子上，三兩月自落。若口鼻上生疣子，則于上面用藥點一兩次。

按：砒霜大熱大毒，功能祛痰補血，助氣活血，殺蟲腐肉。內服微量，可以助氣血循環、養分吸收，故為養豬催肥藥之一。但砒石毒性很強，應用時劑量必須嚴格控制，否則有中毒危險。

松 針 叶

【別名】松針、松葉、松毛、馬尾松。

【主要產地】江西、廣東、廣西等地。

【藥用部分】本品是松柏科常綠喬木的針葉。呈針形，為深綠色，基部具有葉鞘。

【炮制】采後生用(新鮮者)。

【性味】味苦澀，性溫無毒。

【應用】本品能解毒，殺蟲，理氣，健脾，並能和解鬪羊花中毒；兼有利氣的功效。外用可治風疮、疥癩等症。

【用量】解毒：鮮松針葉：牛 2 兩至 8 兩；羊和豬 1 兩至 2 兩。

【附歌】松葉苦溫，解毒殺蟲，食積氣滯，疥癩亦功。

【配伍】配樟樹葉，煎湯洗，可治疥癩。

【附方】治牛鬪羊花中毒方(江西)。

松針葉(新鮮)

用黃泥水煎(黃泥一份、水十份,充分攪拌后,去其泥渣,用上
面的黃水),煎沸后,候溫灌服。

表 40 驅虫藥和殺虫藥歸納簡表

藥名	性 味 及 歸 經	功 用	用 量 (錢)		
			馬 牛	羊 猪	兔 鷄
枳 榔	苦辛溫,入胃、大腸	破積驅虫,下氣利水	5—20	2—4	0.4—1
貫 眾	苦微寒,入肝、胃	杀虫解毒,清熱散瘀	6—20	3—5	0.5—0.7
使君子	甘溫,入脾、胃	杀虫健脾,虫積腹痛	6—20	2—4	0.5—1
苦楝子	苦寒,入肝、心包、小腸、 膀胱	杀虫去積,暖腰溫腎	6—16	2—3	—
榧 子	甘溫平,入肺、大腸	杀虫消積,多量滑腸	5—12	2—4	0.2—0.6
鶴 虱	苦辛平,入大腸、肝	虫積腹痛,外治疥癩	5—10	1—2	0.4—0.6
雷 丸	苦寒,入胃、大腸	杀虫去積,胃中濕熱	6—15	2—4	—
臭椿皮	苦溫寒,入胃、大腸	杀虫消脹,燥濕固腸	5—20	2—4	—
蕪 荑	辛苦溫,入脾、胃	杀虫消積,散風除濕	4—8	1—3	—
土伏苓	甘淡平,入肝、胃	杀虫解毒,消腫除濕	6—20	4—6	1—2
犬 蒴	辛溫,入肝、胃、	杀虫解毒,消積治痢	6—10	2—4	0.1—0.5
硫 黃	酸溫,入腎、心包	杀虫通便,治疥瘡瘡	3—10	1—2	0.1—0.3
水 銀	辛寒	杀虫除疥,兼治諸瘡	—	—	—
雄 黃	辛溫,入肝、胃	杀虫解毒,外治腫毒	2—5	0.2—0.5	—
輕 粉	辛寒	杀虫治疥,消積通腸	0.5—1.5 (馬)	0.1—0.2 (猪)	—
蛇床子	辛苦溫,入腎、三焦	杀虫治疥,壯陽補腎	2—6	0.5—2	—
蘭 茹	辛寒	杀虫治疥,并蝕惡肉	—	—	—
馬齒莧	酸寒,入心、肝、脾	杀虫解毒,清熱治痢	10—40	4—10	0.5—2
大风子	辛熱	杀虫攻毒,風癬疥癩	2—6	—	—
木鼈子	苦寒	散血消腫,疔瘡腫毒	2—5	—	—
砒 石	辛酸熱	強壯補血,蝕疽杀虫	0.1—0.3	0.02—0.04	—
松針叶	苦溫	解毒治疥,理氣健脾	20—80 (新鮮的)	10—20 (新鮮的)	—

第十七章

涌 吐 药

凡能引发呕吐的药物，就称为涌吐药。

涌吐药多用于猪、犬、猫，它可使痰涎、毒物等涌出，以防痰涎壅塞、毒物中毒等。这类药物一般性猛烈而有毒性，且涌吐时容易伤胃，故应用时必须十分慎重。凡是胎前产后、气血虚弱、虚劳或有出血癰疾者，应严格禁用。

涌吐药多用于急症，要求药物的功效迅速而确实。吐后应使家畜充分休息，或给与缓和药，以促使胃机能恢复正常。

甜瓜蒂（本草经）

【别名】瓜丁、瓜蒂。

【主要产地】我国大多省份都有出产。

【药用部分】本品系葫芦科一年生藤本植物，入药用甜瓜的干燥瓜蒂。果柄有纵稜、微弯曲、黄褐色，形状不定，近果端稍大。

【炮制】阴干，研末用或切碎入煎剂。

【性味和归经】味苦，性寒有小毒。入胃经。

【应用】本品能吐热痰、食积、毒物。主治胸中痞逆上气、风痰、

热涎壅积等症。馬、牛多作外用及吹鼻用。孕畜禁用。

【用量】猪1錢至3錢。

【附歌】甜瓜蒂寒、涌吐痰滞，咳逆上气，本品主治。

【配伍】配細辛、皂角、谷精草、藜蘆、干姜、白芥子、薄荷、白胡椒、川芎(通关散，甘肃)吹鼻治冷痛。



图 93 甜 瓜

藜蘆 (本草經)

【別名】鹿葱、棕包兜。

【主要产地】我国各省皆有出产。其中以四川、河北、山西、陕西、福建、江西、江苏、安徽以及东北等地产量較多。

【药用部分】本品系百合科多年生草本植物，入药用其干燥根莖。根莖在根丛中，长6—7分，粗3—4分，上端残留叶柄基和赤褐色的棕毛状物，根莖下部四周簇生多数须根，呈灰褐色，微弯，容易折断；中心纖維質不易折断。

【炮制】洗净晒干，剥尽棕毛，切断研末用。

【性味和归經】味苦辛，性寒有毒。入肝、肺、胃三經。

【应用】本品能催吐解毒，杀虫。主治上膈风涎、鼻塞气郁、恶



图 94 藜 蘆

左、藜蘆原植物；右、药用部分外形：1.叶柄基，2.棕毛，3.根。

物停胃。外用可治疗疥癩恶疮。用时以水浸用或配丸药。不入煎药；忌酒。

根据“齐民要术”的记载，治疗羊疥的方法是：“取藜蘆根，咬咀

令破（即弄破碎的意思），以米泔浸之，以瓶盛，塞口，于灶边常令煖，数日醋香，便中用。以磚瓦刮疥令赤（若强硬痂厚者，亦可以湯洗之）。去痂，拭燥，以藥汁涂之。再上，愈。若多者，日別漸漸涂之，勿頓涂令徧，羊瘦不堪藥勢，便死矣。”由此可知祖国兽医早在六世紀以前，就已应用藜蘆来治疗疥癩。

【用量】猪 8 分至 2 錢。

【附歌】藜蘆辛寒，涌吐痰涎，解郁杀虫，外用治疥。

【配伍】配半夏、白芷、胡椒、瓜蒂、皂角、芸苔子、麝香（吹鼻散），治馬伤水起臥病。

胆矾（本草經）

【别名】石胆、綠矾。

【主要产地】主产于甘肃、山西、江西、广东、云南、陝西等地。

【原藥形态】本品在銅矿中自然生成，是藍色結晶性顆粒或粉末，易破碎。

【性味和归經】味酸澇辛，性寒有小毒。入胆經。

【应用】本品能涌吐杀虫。主治羊的虫积，当毒物还在胃中时，可作涌吐藥用，外用腐蝕疔疮死肌。

【用量】羊 2 分至 5 分。

【附歌】胆矾酸澇，涌吐毒物，治羊虫积、外治恶疮。

【附方】胆矾散（元亨疗馬集）：治馬舌疮。

胆矾 黃連 黃柏 孩儿茶

以上研罗为末，先用米泔水洗下口涎，竹筒吹藥舌上，即可治癰。

表 41 涌吐药归纳简表

药名	性味及归经	功 用	用 量(钱)		
			牛 馬	羊 猪	兔 鷄
甜瓜蒂	苦寒,入胃经	涌吐热痰,咳逆上气	——	1—3(猪)	——
藜 蘆	苦、辛、寒,入肝、肺、胃	涌吐解毒,解郁杀虫	——	0.8—2(猪)	——
胆 矾	酸澇、辛、寒,入胆经	外用腐蝕,治羊虫积	——	0.2—0.5(羊)	——

第十八章

催情藥和催乳藥

凡能促進家畜的性欲、強精壯陽、提高受胎率的藥物，就稱為催情藥。凡能促進母畜下乳或乳量增加的藥物，就稱為催乳藥。這兩類藥物既可用以治病，又可用以提高畜牧業生產。在祖國大躍進的新形勢下，其應用比較廣泛。從其應用的目的性來看，與前面各章藥物有所不同，故特設本章，以便選擇應用。

家畜的性欲衰弱，如公畜的陽萎、精滑、無力交配，母畜不發情或性欲不旺等，其原因很多，或因飼養管理失宜，或由某些疾病而引起。催情藥具有補氣血、暖腎臟，壯陽益精，增強性欲的功用，但不能獨善其功，必須結合改進飼養管理，並根據畜體的情況，適當配伍有關藥物，如體肥氣虧者應配以理氣藥，體弱血衰者應配以理血藥或補養藥等，才能達到用藥的目的。

母畜乳汁不下或乳量不多，常與飼養管理和某些疾病有密切的關係。催乳藥能通經行血，因而有下乳的功效。若乳汁不下，應配以益氣活血藥，同時應改進飼養管理。

本章藥物很多，如肉蓯蓉、補骨脂、菟絲子、海馬、穿山甲等，已在前面補養藥和行血藥中敘述過了。這裡再將比較常用的催情藥

和催乳药,分节叙述于下。

第一节 催情药

淫羊藿 (本草经)

【别名】三枝九叶草、仙灵脾、弃枝草。

【主要产地】湖南、陕西、湖北、江西、浙江、广西、广东等地。

【药用部分】本品是小蘗科多年生草本植物,入药用其干燥的莖叶。莖细小中空如管,微干缩,长约尺余,外表呈暗黄色而光滑,基部呈淡褐色,有自根头部生出的膜质鳞片状叶,断面显黄白色,节膨大,多为三分枝,叶边缘有细刺,呈长心脏形,显灰绿色或黄绿色,质脆易碎。(见彩图3)

【炮制】洗净晒干,切断生用。

【性味和归经】味辛,性温无毒。入肝、肾二经。

【应用】本品能补肝益肾,壮阳益精,祛风胜湿,坚强筋骨。主治公畜阳萎、阴莖刺痛、母畜不孕、小便不利、筋骨攣急等症。对于精滑阳虚者忌用。

【用量】马和牛5钱至1两;羊和猪1钱至3钱;兔1分至5分。

【附歌】淫羊藿辛,壮阳益精,阳萎阴亏,主治要药。

【配伍】配茴香、益智仁、巴戟天、补骨脂、胡蘆巴、肉蓯蓉、鎖阳、菟丝子、蒺藜、枸杞子,治公畜阳萎;配党参、白朮、續断、巴戟天、枯苓、甘草、大枣,能催母畜发情怀孕。

【附方】(1)催母畜发情方(农业科学快报)。

当归 川芎 淫羊藿 血母藤 甜酒糟 紅糖



彩色图版 3 淫羊藿

煎水喂牛。母牛分娩后 40 天服藥，經 7—10 天即可發情。

(2) 母猪催情方(浙江)。

当归 川芎 石楠叶 肉蓯蓉 玄参 淫羊藿

加清水，共煎二次，把藥汁混入少量的飼料中喂飼。

按：淫羊藿能補命門腎虛，故用以治公畜陽衰、性欲淡薄、母畜血虛不發情。李時珍說：“淫羊藿性溫不寒，能益精氣，乃陽明三焦命門藥也，真陽不足者宜之。”

陽起石（本草經）

【別名】羊起石、白石、石生、五精金。

【主要產地】西康、河北、山東、山西、內蒙及東北等地。

【原藥形態】本品是礦石類的似針狀石塊，為灰白色或灰綠褐色，有蠟樣光澤，易破碎，作細絲狀，摩于指頭間有脂肪樣感覺，以白色者為佳。

【炮制】原藥火燒后，水飛，晒干用之。

【性味和歸經】味咸，性微溫無毒。入腎經。

【應用】本品能補命門不足，壯陽益精。主治公畜陽萎不起、母畜陰衰不孕、下部虛冷、子腸結氣、白帶等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩。

【附歌】陽起石咸，主效催情，命門不足，壯陽益精。

【配伍】配淫羊藿、肉蓯蓉、丁香、廣木香、官桂，催母畜發情。

【附方】(1) 催母牛發情方(四川)。

丁香 廣木香 官桂 陽起石

上藥研碎用開水泡，生姜水為引，候溫連渣灌服。

(2) 催母畜(牛、馬)發情方(農業科學快報)。

①肉桂 熟地 淫羊藿 阳起石

上药煎水，候温灌之。

②杜仲 阳起石 茴香 当归 熟地 川芎

共为末，用热水冲开，待温灌服。

胡蘆巴（嘉祐）

【别名】苦豆、胡巴、蘆巴、蘆巴子、蘆肥子。

【主要产地】河南、山西、四川、安徽、浙江、甘肃等地。

【药用部分】本品是豆科一年生草本植物，入药用其干燥的种子。呈不整菱形，扁平，外面为灰黄色或淡黄褐色，两面中间有一



图 95 胡蘆巴

左、胡蘆巴原植物； 右、药用部分外形：1. 浅沟。

条淺沟，長約1分，厚約半分，种皮极薄，平滑，質堅硬，內面显黃色，有特异的芳香氣味。

【炮制】將原藥用水淘洗淨，酒浸一夜，蒸用或炒用。

【性味和归經】味苦，性溫無毒。入肝、腎二經。

【应用】本品能補命門，壯元陽，除寒濕，暖腰腎。主治公畜陽萎、交配早泄、精滑、腎脏虛冷、腹脇脹滿、外腎浮腫等症。

【用量】馬和牛5錢至1兩5錢；羊和猪1錢至2錢；兔1分至5分。

【附歌】胡蘆巴溫，滋補命門，腎脏虛冷，精滑奏功。

【配伍】配當歸、紅花、補骨脂、杜仲、茴香、苦楝子、升麻、甘草、青鹽（河南），治馬腎氣疝脹；配茴香、益智仁、巴戟天、肉蓯蓉、淫羊藿、鎖陽、菟絲子、蒺藜、枸杞子，治公畜陽萎。

【附方】治馬寒癱方（安徽）。

胡蘆巴 茴香炒 萆澄茄 巴戟天 甜瓜子 乳香 杜仲
天麻 半夏 何首烏 沒藥
共研末，鮮生姜為引，熬水候溫沖服。

蛤蚧（開寶）

【別名】蛤蟹、仙蟾。

【主要产地】广东、广西、云南、貴州等地。

【藥用部分】本品是蛤蚧屬兩栖脊椎動物，入藥用其干燥尸体。其形如壁虎而大，雄的皮粗口大，身小尾短，雌的皮細口尖，身大尾小。头部骨骼形状明显，略呈三角形，眼凹陷。身軀呈橢圓形，自头至尾長約7—8寸，背部有灰藍色的鱗片，脫落后露出褐色皮膚，頸头部及腹部帶黃灰色，中間脊椎骨及兩側肋骨微呈稜脊形。

突起，四肢及尾部多皺縮，五趾卷曲，具吸盤。成對入藥。

【炮制】將活蛤蚧打死後，投入熱水中，煮片刻，以能除去鱗片為度，即取出剖開腹部，除去內臟、頭足及鱗片（勿斷其尾），然後將竹片交叉撐開其腹，放在炭火上焙干，研碎用。

【性味和歸經】味咸，性溫有小毒。入肺、腎二經。

【應用】本品能補肺溫腎，壯陽添精，益元氣，定虛喘。主治公畜陽萎精衰、勞損虛喘、肺癰衄血、久咳上氣，小便淋瀝等症。凡痰壅喘咳時忌用。

【用量】馬和牛 1 對至 3 對。

【附歌】蛤蚧咸溫，壯陽添精，勞損虛喘，補虛益陰。

【配伍】配天門冬、麥門冬、馬兜鈴、白朮子、枇杷葉、梔子、防己、天花粉、沒藥、蘇子、知母、貝母、秦艽、百合、升麻（蛤蚧散），治馬肺勞鼻濕，四肢虛腫。

【附方】催情方（四川）。

蛤蚧 香附 蜜炙 肉蓯蓉 公丁香 當歸 川芎 熟地 白芍 枸杞子

共為末，開水沖，候溫灌服。

按：蛤蚧咸溫，功補肺腎，益元氣，壯陽添精，故用以治公畜陽萎精衰、勞損虛喘、肺癰衄血等症。時珍說：“此物補肺氣，定喘止渴，功同人參。”

紫河車（拾遺）

【別名】人胞、胞衣。

【藥用形態】本品是胎兒出生時的胞衣，乾燥後入藥。呈灰黃色，直徑約 3 寸至 5 寸，厚約 5 至 6 分，表面平坦光滑，中間有呈黑

褐色而于固的臍帶。里面由不規則、网状交錯的纖維組織構成，質堅韌，有特异的腥臭。

【炮制】將新鮮胞衣用水漂清，放鍋內煮至浮于水面，然後放在無煙炭火上烘至起泡、質酥為止，研末用。

【性味和歸經】味甘咸，性溫無毒。入肝、腎二經。

【應用】本品能添精助氣，益血扶虛。主治陽萎、精滑、氣血虛損、羸瘦缺乳、不孕空懷等症。

【用量】馬和牛 5 錢至 1 兩 5 錢；羊和豬 1 錢至 2 錢；兔 3 分至 5 分。

【附歌】紫河車溫，大補元氣，催情下乳，陽萎有力。

【配伍】配生薑、砂糖（河北），治產後受寒。

【附方】催情方（四川）：用于牛豬不孕。

紫河車 淫羊藿 肉蓯蓉 巴戟天 菟絲子 女貞子 公丁香
香 官桂 黃精 黨參 當歸 黃耆蜜炙
共研為細末，白酒為引，開水沖，候溫灌服。

第二节 催乳藥

王不留行（別錄）

【別名】留行子、禁宮花、金盞銀台。

【主要產地】我國各地均產，以河南、河北、江蘇產量較多。

【藥用部分】本品是石竹科一年生或二年生草本植物，入藥用其干燥的種子。種子為細小球形，外表呈灰黑色或紫褐色，有時為淡黃色而雜有黑色的斑紋，表面光滑，種臍呈綫形，為灰白色，質地堅硬，斷面顯黃白色。



图 96 王不留行

左、王不留行原植物； 右、药用部分外形：1.种脐，2.黑色斑纹。

【炮制】清水洗，炒用或生用。

【性味和归经】味甘苦，性平无毒。入肝、胃二经。

【应用】本品能下乳汁，催生，通经行血，消肿止痛，除风痹，利小便。主治乳汁稀少、难产、乳癰疮、鼻衄等症。

【用量】马和牛 6 钱至 1 两 5 钱；羊和猪 2 钱至 4 钱。

【附歌】王不留行，味甘性平，通行血脉，催乳亦灵。

【配伍】配麦门冬、瞿麦、穿山甲、黄耆、当归，治乳汁量少或无乳；配桑白皮、花椒、黄芩、干姜、厚朴、芍药，治金疮；配通草、穿山甲、白朮、白芍、黄耆、党参、当归，治猪乳汁不通或乳少症。

【附方】(1)催乳方(甘肃)：治母猪乳汁不通或乳汁减少。

王不留行 穿山甲炮 當歸 天花粉 通草 瞿麥 青皮
柴胡 白芷 赤芍藥 連翹 甘草

上藥為末，混合飼料內喂之。

(2)治母猪产后体衰缺乳或乳汁不通方(甘肃)。

王不留行 黃耆 當歸 白芍 穿山甲炮 木通 黨參 鹿角
霜 通草 天花粉 黑芝麻 甘草

上藥為末，黃酒為引，混入飼料內喂之。

(3)治馬牛泌乳很少、乳房萎縮、皮膚形成褶皺方(陝西)。

當歸身 黃耆 通草 王不留行 陳皮 黨參 茯苓 白芷
漏蘆 穿山甲炮 甘草

上藥共研末，開水沖，加黃酒為引，灌服。

按：王不留行其性走而不守，功能通經行血。因乳汁與血液有關，血滯不行則乳汁減少或停止，若得王不留行活血之力，乳汁則隨血行而增加，故為母畜催乳常用之藥。

乳藤（綱目拾遺）

【別名】羊乳、奶樹、奶母、乳汁藤、奶黨參、奶婆娘、代乳娘、猪婆奶。

【主要產地】我國南方各地均有出產。

【藥用部分】本品是桔梗科多年生蔓性草本植物，入藥用其新鮮根。根呈紡錘形或圓錐形，形如黨參而肥大，一般長約3至5寸，粗約5—6分至1寸余，外表呈灰褐色或淡灰色，常有粗大的橫皺環節，類似螺旋，具有少數微細須根及殘留的根痕，并散布如癰癤狀的斑疹突起，質松軟，易折斷，新鮮時橫斷面能滲出濃厚的白色粘液，狀似乳汁，乳汁干后，內顯黃白色，帶纖維性，中有小孔排列

如菊花样花纹，微有特异气味。（見彩图 4）

【炮制】挖采后，洗净泥土及摘去须根，将新鲜者切片入煎。若晒干留用，其功效较新鲜者为弱。如采集后，置地面，复盖河沙，保藏待用亦可。

【性味和归经】味甘，性平无毒。未载归经。

【应用】本品能补血益气，生津液，下乳汁。主治缺乳或乳汁减少、气血虚弱、烦渴等症。

【用量】新鲜品：马和牛 4 两至 10 两；羊和猪 1 两至 4 两。

【附歌】乳藤味甘，补血益气，止渴生津，下乳当用。

【配伍】配地骨皮、五味子、柏子仁、酸枣仁、干地黄，能补益虚损。

按：乳藤的新鲜根茎内，含有丰富的白色胶质粘液，这种胶汁养分很高，特别是对于母畜缺乳症或乳汁减少，可以奏效。南方各地群众，大都采用本品来饲喂产后母猪，得以催乳。但使用新鲜者效果较好，干涸的根茎则效果很低。

鰕（别录）

【别名】虾公、斑节鰕、米虾。

【主要产地】我国江湖池泽中均有出产。

【基本形态】本品是节肢甲壳类、胸甲类、十脚类、长尾类动物鰕的新鲜躯体。分头、胸、腹三部，背甲呈圆筒状，色青黑，薄而透明，前端有长棘突出，触角（俗称为须）二对甚长，后端有环节，两侧有游泳器，称为橈足；剥去外壳，其肉呈灰白色而透明，有腥气。

【炮制】一般将原药捣烂用。

【性味和归经】味甘，性温有小毒。未载归经。



彩色图版 4 乳藤

【应用】 本品能下乳汁，补胃气，疗风痰，壮阳，托疮疽癰毒。
主治缺乳或乳汁减少、疮疽、风痰等症。

【用量】 新鮮品：馬和牛 10 两至 1 斤；羊和猪 3 两至 8 两。

【附歌】 鰕味甘温，能补胃气，祛痰托疮，催乳有利。

【配伍】 配糯米酒(江西)，治母猪乳汁不下。

表 42 催情藥和催乳藥归納簡表

类别	藥 名	性、味 和 归 經	功 用	用 量 (錢)		
				馬 牛	羊 猪	兔
催 情 藥	淫羊藿	辛温，入肝、腎	补肝益腎，壮阳补精	5—10	1—3	0.1—0.5
	阳起石	咸微温，入腎經	壮阳补精，主作催情	5—10	—	—
	胡蘆巴	苦温，入肝、腎	壮阳暖腎，阳萎精滑	5—15	1—2	0.1—0.5
	蛤 蚧	咸温，入肺、腎	壮阳益精，补肺温腎	1—3对	—	—
	紫河車	甘咸温，入肝、腎	扶虚益精，催乳催情	5—15	1—2	0.3—0.5
催 乳 藥	王不留行	甘苦平，入肝、胃	通行血脉，下乳催生	6—15	2—4	—
	乳 藤	甘平	补血益气，下奶当用	40—100 (新鮮品)	10—40 (新鮮品)	—
	鰕	甘温	补胃壮阳，下乳托疮	100—160 (新鮮品)	30—80 (新鮮品)	—

藥名索引

此索引基本上是按照简化字的划数和起笔次序(、一丨丿)排列的

二 画

(一)

丁香

351

人参

420

八角莲

155

八角茴香

353

(丿)

三 画

(一)

大腹皮

230

山楂(山查)

282

大黄

195

山豆根

137

大戟

204

山药

425

大蒜

491

山茱萸

454

大血藤

386

山慈姑

140

大枣

430

川芎

295

大风子

497

土茯苓

490

干姜

349

女贞子

453

干地黄

157

(丨)

(丿)

四 画

(、)	火麻仁	200	木賊草	406
			木鼈子	498
(一)			巴豆	198
			巴戟天	439
	天竹黃	393	王不留行	513
	天花粉	253	元明粉	197
	天南星	245		
	天仙子	399		
	天麻	397	水蛭	313
	天門冬	258	水銀	493
	五倍子	469		
	五味子	474		
	五加皮	372	丹參	297
	五灵脂	301	牛黃	337
	木香	273	牛蒡子	187
	木通	216	牛膝	304
	木瓜	365	升麻	184

五 画

(、)			甘遂	205
			石榴皮	461
	玄參	119	石膏	123
			石灰	330
	半边蓮	150	石斛	449
	半夏	243	石決明	409
(一)				
	龙骨	472		
	龙胆草	132	白豆蔻	276
	龙齿	394	白前	241
	甘草	428	白果	241

白芥子	247	白芨	322
白芷	180	白朮	426
白药子	142	白芍	450
白头翁	160	白茅根(附白茅花)	163
白扁豆	364	瓜蒌(附瓜蒌仁)	251
白花蛇	374	生姜	181
白薇	154	生地黄	157
白鲜皮	384	仙鹤草	322
白僵蚕	403		

六 画

(一)

(1)

冰片	342	艾叶	354
灯芯草	229	当归	443
刘寄奴	314	肉豆蔻	462
		肉桂	344
		肉蓯蓉	431

(一)

(1)

百药煎	470	血余	328
百草霜	468	血竭	310
百部	238	伏龙肝	465
地肤子	226	延胡索	294
地骨皮	159	自然铜	315
地榆	326	全蝎	402
朴硝	197	决明子	410

七 画

(一)

(一)

沉香	276	没药	302
沙参	260	防己	221

防风	172		
杏仁	254	(1)	
忍冬藤	143	貝母	255
杜仲	432	吳茱萸	350
赤小豆	231		
赤石脂	464	(1)	
赤芍药	299	谷芽	284
辛夷	178	谷精草	407
麦芽	283	牡蛎	473
車前子(附車前草)	214	牡丹皮	158
豆豉	189	何首烏	447
阳起石	509	伸筋草	385
麦門冬	259	皂角(附皂角刺)	338

八 画

		刺蒺藜	416
(1)		阿胶	448
羌活	370	板藍根	151
夜明砂	416		
补骨脂	436	(1)	
官桂	344	芸苔子	311
		苏子	248
(一)		苏木	314
附子	347	昆布	263
青皮	271	芫花	207
青蒿	367	明矾	466
青黛	150	虎骨	441
青箱子	413	花椒	358
青木香	274	陈皮	272
远志	391		
枇杷叶	262	(1)	
松針叶	500	参三七	321

知母	117	乳藤	515
使君子	483	金銀花	143
乳香	303	金櫻子	477

九 画

(一)

穿山甲	316	柏子仁	389
炮姜	349	孩儿茶	466
姜黄	291	枯矾	466
前胡	237		

(1)

(一)

苦楝子(附苦楝根皮)	484
苦参	137

(1)

砂仁	270		
砒石	499	威灵仙	381
枸杞子	452	香附	280
枳壳和枳实	267	胆矾	505
郁李仁	201	香薷	363
郁金	293	禹余粮	463
胡黄连	136	独活	370
胡桐淚	149	紅花	306
胡蘆巴	510	紅麴	320
厚朴	269	食盐	164
胡麻仁	455	扁豆衣	364

十 画

(一)

		海金砂	228
		海藻	263
浮小麦	471	海桐皮	383
神麴	285	海馬	442
酒	319	高良姜	355
酒麴	286	益母草	309

益智仁	437	柴胡	188
(一)		茵陈蒿	134
桑白皮	250	茶叶	126
桑螵蛸	476	茯苓	218
桑叶	191	茯神	393
桔梗	234	茴香	353
桂枝	176	草豆蔻	356
桂心	344	骨碎补	438
夏枯草	124	党参	421
桃仁	308	茜草	325
秦艽	378	茺蔚子	309
秦皮	413	(/)	

(1)		烏賊骨	327
荆山稜	289	烏头	379
荆芥	170	烏蛇	375
馬齿莧	496	烏梅	459
馬兜鈴	240	烏药	278
馬鞭草	318	臭椿皮	488

十 一 画

(、)		商陆	212
牵牛子	209	(一)	
淡竹叶	230	槟榔	479
麻油	202	通草	223
麻黄	169	梔子	121
麻黄根	474	犀角	156
旋复花	243	蓮翹	145
淫羊藿	508	硃砂	395
密蒙花	411	(1)	

曼陀罗	242		
貫众	481	(ノ)	
蚯蚓	139	猪苓	220
蛇蛻	404	猪胆	203
蛇床子	495	甜瓜蒂	502
莨菪	290	細辛	177
野菊花	190	側柏叶	324

十 二 画

	(ノ)		(ノ)
訶子	458	菊花	190
		葶藶	382
	(一)	蛤蚧	511
		萊菔子	249
黃連	127	菖蒲	335
黃芩	129	萊豆	153
黃柏	131	紫苑	249
黃蘗子	141	紫苏	174
黃耆	423	紫草	161
酥油	202	紫參	152
硫黃	492	紫河車	512
雄黃	493		
椒目	358		(ノ)
款冬花	236	番泻叶	199
琥珀	396	鈎藤	398

十 三 画

	(ノ)	礞砂	264
滑石	224	椿根白皮	483
	(一)		(ノ)
雷丸	488	蜂蜜	203
		蜈蚣	400

葶藶子	211	葱白	179
菡萏	227	薏絲子	440
葛根	182		

十四画

(ノ)		(1)	
漏蘆	148	蒲公英	147
(一)		蒲黃	300
梔子	486	蒼朮	376
槐角	162	蒼耳子	387
槐花	162	(ノ)	
酸棗仁	390	熊胆	415
輕粉	494		

十五画

(ノ)		醋	320
熟地	445	(1)	
(一)		萆澄茄	359
樟腦(附樟叶)	341	萆撥	352
		萆荊子	186

十六画

(ノ)		(1)	
澤兰	312	蕪荑	486
澤泻	219	蕎麥	471
		薏仁	412

十 七 画

	(1)	薏苡仁	225
薤白		薄荷	186
		278	

十 八 画

	(1)	藜蘆	503
藁本		瞿麦	227
藏红花		蝉蜕	192
		380	
		306	

十 九 画

	(1)	蟾酥	339
蔹茹		藕节	329
		鯪	516
		496	

二 十 画

	(1)	蘆薈	199
藿香		蘆根	125
		363	

二 十 一 画

	(1)		(1)
鶴虱		續隨子	210
麝香		續斷	434
		鷄內金	286
		487	
		333	

兽医中药学主要参考文献

書名	編著者	出版社	年 月
元亨疗馬集	喻本元等	中華書局	1957
中兽医診療經驗第一集	高 国 景	农业出版社	1958
中兽医診療經驗第二集	裴 耀 卿	农业出版社	1958
中兽医診療經驗第三集	郑 少 山	农业出版社	1959
兽医常用中药	刘 寿 山	畜牧兽医圖書	1956
神农本草經	顧 覲 光 重 輯	人民卫生	1956
司牧安驥集	李 石	中華書局	1957
痊臧通玄論	卞 管	甘肅人民	1959
齐民要术今釋	石 声 汉 校 釋	科学出版社	1958
农政全書	徐 光 啓	中華書局	1956
疗馬集	周 海 蓬	农业出版社	1959
养耕集	江 西 省 农 业 厅 所 中 国 兽 医 实 驗	江 苏 人 民	1959
畜牧藥驗方、安驥藥方	王 愈 等	江 苏 人 民	1958
新牛馬經	金 重 冶	农业出版社	1958
本草綱目	李 时 珍	人民卫生	1957
本草綱目拾遺	赵 学 敏	商务印書館	1954
兽医中药类編	程 衷 逸	农业出版社	1958
药性字典	吳 克 潜	大众書局	1933
中国药學大辞典	陈 存 仁	人民卫生	1957
中国药用植物志	裴 鑑 等	人民卫生	1958

書 名	編 著 者	出 版 社	年 月
中藥學	南京中医學院等	人 民 卫 生	1959
中藥學概論	南 京 中 医 学 院	人 民 卫 生	1958
中医学概論	南 京 中 医 学 院	人 民 卫 生	1958
实用中藥學	熊 梦	江 西 人 民	1958
植物名实图考	吳 其 濬	商 务 印 書 館	1957
現代实用中藥	叶 橘 泉	上 海 卫 生	1956
实用中医藥理學	胡 光 慈	錦 章 書 局	1956
本草从新	吳 儀 洛	广 益 書 店	1953
雷公炮制藥性解、珍珠 囊补遺藥性賦	李东垣、李士材	上 海 卫 生	1956
兽医中藥學	汪西中兽医实驗所	江 苏 人 民	1959
中兽医进修班中藥与內 科講義	甘 肃 畜 牧 厅	—	1957
中兽医进修班講義	甘 肃 畜 牧 厅	—	1958
湖南藥材	湖 南 藥 材 公 司	—	1958
广西中兽医藥用植物	陈 立 卿	科 学 出 版 社	1959
藥用植物及生藥學	山 东 医 学 院	人 民 卫 生	1956
中国植物图鑑	賈 祖 璋 等	中 华 書 局	1954
广东兽医藥用植物及其 疗效	梁 宝 汉 等	华 南 农 科 所	1958
兽医国藥及处方	郑 藻 杰	畜 牧 兽 医 图 書	1958
中兽医藥物及其处方講 义	河 北 中 兽 医 学 校	—	1958
中兽医进修教材	山 西 农 业 建 設 厅	—	1958
授时通考	弘 晝 等 編	中 华 書 局	1956
养余月令	戴 羲 輯	中 华 書 局	1956
生藥學	李 承 祐	中 国 科 学 图 書 仪 器 公 司	1952
中华人民共和国藥典	中 央 卫 生 部	商 务 印 書 館	1953
中藥成藥配制經驗介紹	輕 工 业 部	—	1956
藥用植物及生藥學	徐 国 鈞 等	人 民 卫 生	1954
中藥的藥理与应用	朱 彦	人 民 卫 生	1957
本草备要	汪 昂	广 益 書 局	1950

書 名	編 著 者	出 版 社	年 月
黃帝內經素問	唐 王 冰	商务印書館	1954
中医学基础簡釋	杉 原 德 行	人 民 卫 生	1957
江西民間兽医診療及处 方汇编	江西中兽医实验所	江 西 人 民	1958
安徽中兽医药方汇编	安徽畜牧兽医处	安 徽 人 民	1958
中兽医驗方汇编	农业部畜牧兽医局	农业出版社	1958
中兽医驗方汇编	河北省农业厅	河 北 人 民	1958
五十年疗畜积方	朱 盘 銘	河 南 人 民	1958
兽医中药处方汇编	陕西省农业厅	陕 西 人 民	1955
陕西省中兽医治疗經驗 汇集	陕西省农业厅	陕 西 人 民	1957
浙江中兽医处方	浙江省农业厅	浙 江 人 民	1958
貴州省民間兽医驗方	貴州省兽医实验室	貴 州 人 民	1959
民間兽医驗方	黑龙江省农业厅	黑 龙 江 人 民	1958
山西省榆次区兽医进修 班驗方汇集	山西省榆次兽医站	敦化印刷厂	1958
河南旧兽医臨床药方汇 集	河 南 农 业 厅	河 南 人 民	1954
民間兽医通訊 (1至10 期)	江 西 省 畜 牧 兽 医 协 会	江 西 人 民	1957—1959
中兽医学专题資料及研 究报告等一、二集	中国畜牧兽医学会	农业出版社	1958
全国农业展覽会資料	全 农 会 編	农业出版社	1957—1958
广州植物志	侯 寬 昭 等	科学出版社	1956
中国畜牧兽医杂志	中国畜牧兽医学会	科学出版社	1950—1956
畜牧与兽医	畜牧与兽医双月刊 編輯委员会	江 苏 人 民 出 版 社	1949—1959. 3期
中国兽医学杂志	中国畜牧兽医学会	种 学 出 版 社	1957—1959.5
中国畜牧学杂志	中国畜牧兽医学会	科学出版社	1957—1959.5
上海畜牧兽医通訊	中国畜牧兽医学会 上 海 分 会	科 学 技 术 出 版 社	創刊—1959. 2期
黑龙江畜牧兽医通訊	黑龙江畜牧兽医編 輯 委 員 会	黑 龙 江 省 科 技 协 会	1958—1959.5
广西农业通訊	广 西 省 农 业 厅	同 前	1956—1953

書 名	編 著 者	出 版 社	年 月
广西农业	广 西 农 业 厅 同	前	1959.5月止
生物学通报	中国动物植物学会	科学出版社	1956—1959.5
农业科学通訊	中国农业科学院	同	前 1958—1959
农业科学情况快报	中国农业科学院	同	前 1958—1959
农业技术	农 业 杂 志 社 同	前	1958—1959
农业知識	农 业 杂 志 社 同	前	1958—1959
中药通报	中 国 药 学 会	人 民 卫 生	1957—1958
药学报	中 国 药 学 会	人 民 卫 生	1958—1959

兽医中药学

中国农业科学院中兽医研究所編

*

农业出版社出版

(北京西总布胡同7号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第106号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

外文印刷厂印刷

*


850×1168毫米 1/32 • 16 $\frac{5}{8}$ 印张 • 環線4頁 • 插頁4頁 • 371,000字

1959年11月第1版

1960年2月北京第2次印刷

印数: 1,001—9,000 精裝定价: (9)2.85元

統一書号: 16144.782 59.11京型







S0019546

壹玖陸零年 叁月 拾 伍日

6016312

62.3

144

3:

3月14日 9:22
3年2月2日

62.3
144
3:

6016312

注 意

- 1 借書到期請即送還。
- 2 請勿在書上批改圈點，折角。
- 3 借去圖書如有污損遺失等情形須照價賠償。

